

COMMENTARII
DE REBUS
IN
SCIENTIA NATVRALI
ET
MEDICINA
GESTIS.



VOLVMINIS XXXII. PARS IV.

LIPSIAE, MDCCXC.

APVD IOH. FRIDERICVM GLEDITSCH.

Venduntur etiam

Londini apud Pr. Elmsly, Edinburgi apud Elph. Balfour, Lugd. Bat. ap.
Fratres Luchtmann, Parisiis apud Barroi Iunior. Venetiis apud Io. Bapt.
Pasquali, Mediolani apud Ios. Galeazzi, Augustae Taurinor. apud Gui-
bert et Orgeas, Florentiae apud Ios. Molini, Holmiae apud M.
Swederum, Lisbonnae apud M. Borell et Socios, Lausan-
nae apud I. H. Pott.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

4

George F. Johnson
1901

1901

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

I.

Giornale per servire alla storia ragionata della
medicina di questo secolo, Tom. III. Venet.
1786. pagg. 504.

i. e.

Diarium inseruiens historiae ratiocinanti medi-
cinae huius seculi, Tom. III.

Praeter varios a nobis iam recensitos, aliosque bre-
viter tantum indicatos libros in hoc tomo se-
quentes recensentur libri:

I. ALEX. MONRO *obss. de structura et functioni- p. 1.*
bus systematis nervosi, Edinb. 1783. in fol. c. 47. tabb.
aen. Anglic. script. In capitibus XXVIII. loquitur
de circulatione sanguinis in cerebro, de membranis p. 6.
cerebri et cerebelli in genere, de reciproca ventri- p. 9.
culorum cerebri communione, de vasis lymphaticis
cerebri, infundibuli, et glandulae pituitariae de ci-
neritia et medullari cerebri substantia, de nervorum p. 12.
vi et existentia a cerebro non dependente, de stru- p. 41.
ctura medullae spinalis, de colore et textura nervo- p. 44.
rum piaae matris, de fibris transuersis et spiralibus p. 46.
nervorum, de diuerso nexu nervorum, inprimis de p. 81.
plexibus, de externo inuolucro truncorum nerveo-
rum et funiculorum, eos componentium, de structu-
ra gangliorum nerveorum, de corpusculis sphaeroi-
deis omnes nervos, paucis exceptis, in piscis Gadi p. 83.
speciebus circumdantibus, de olfactorio, retina, au- p. 84.
ditorio, aliisque in specie, de nervorum structura p. 89.
microscopiis illustrata, de vi nervorum, de nervis p. 128.
sensus et motus instrumentis, de nutrimento ad par- p. 129.
tes non per nervos, sed per arterias delato, de sen- p. 131.
satione duplici, vel cum vel sine conscientia, de fibris

- P. 133.** muscularibus, organis sui generis, non a nervis productis, de modo et causis actionis muscularis. Profert singulares opiniones, hinc inde ab auctore diarii
- T. III.** refutatas. Ex iconibus laudantur repraesentationes
- IV.** foraminis ovalis, per quod ventriculi laterales communiceant; cineritiae substantiae in medio et cruribus cerebri et cerebelli, sub ventriculis, in protuberantia annulari, et medulla oblongata, in medullarem productae, in qua desierint vasa ad medullarem a pia
- Tab. X.** matre missa; ligamenti denticulati; plexus brachialis; nervi mediani e vagina sua perfecte explicati; XVII. retis ab olfactorio in pituitaria facti; plexus axillaris inferioris ramis ante transitum in gingivam
- XXIV.** formati; distributionis mollis auditorii per labyrinthum: prae ceteris admiratu digna praedicatur tab.
- XXX.** XXXI. pulposum ad cochleam progredientem funiculum, ex multis minoribus medullaribus radiatim undique in membrana laminae spiralis dispersis, elegantissimum plexum formantibus compositum, triginta et sex vicibus naturali maiorem offerens.
- p. 16.** 2. IO. GARDINER *obss. de oeconomia animali et de causis, et cura morborum, Edinb. 1784. Anglic. script. in ind. ad med. thesor. relat.* Nouem sectionibus disputatur de principio vitali, de nervis, sympathiis, et
- p. 48.** stimulis, de effectibus caloris et frigoris, de febribus,
- p. 55.** catarrho, febre catarrhali vel continua communi,
- p. 16.** cholera, febre biliosa et intermittente. Inter singulares opiniones has retulisse sufficiat, quod principium vitale sit fluidum subtilissimum substantiae solidae nervorum inhaerens, non a sanguine secretum:
- P. 49.** vera vero febrium causa proxima stimulus nervi ventriculi a mucos glandularum eius mutato applicatus.
- P. 23.** 3. IO. HEINNORHL *de usu externo arsenici in cura cancerorum externorum. Regiom. 1785. 8. Germanice. script.* Non arsenicum proprie dictum, sed calcem

calcem arsenicalem sulphuri iunctam seu auripigmentum, si acriores stimuli haud pertimescendi; sin ma- p. 27.
ior stimulorum metus, sandaracham (*realgar*) saepe
adhuc cum sulphure miscendam, esse adhibendam.

4. *Epistola* D. IO. BAPT. BORSIERI, *archiatr.*
archid. Mediol. ad D. FRANC. AGLIETTI, Italice
script. Quae cum diarii auctore communicata qua- p. 28.
tuor continet casus practicos a lithot. et ocular. med.
Mediol. D. DOMIN. VECELLI descriptos. I. Mona- p. 29.
chus, dysuriam sat dolorosam passus, et urinam albi-
dam non foetidam cum sedimento albo farinaceo
mittens, ob calculi metum accessit ad VECELLVM;
paulo post disquisitionem febre, dolore in pollice p. 30.
pedis, et insequente gangraena et sphacelo cruris
correptus est, amputatio necessaria fuit, interea vri- p. 31.
na limpida sine incommodo missa, plaga vero ampu-
tationis sanata rediit dysuria, licet leuior, cum priori
urinae sedimento. Octodecim mensibus post phthisis
pulmonalis orta insanabilis. II. Capucinus, cui nouitio p. 32.
durante sitin aqua pro lubitu extinguere non licuit,
per decem annos difficulter et cum ardore pungentis-
simisque in perinaeo doloribus, etiam urina missa du-
rantibus, lotium excreuit, non raro etiam cathetere vti
coactus, frustra que varios consulens medicos tandem
accessit VECELLVM. Qui ex sedimento urinae albi- p. 33.
do filamentoso et purulento vlcus suspicatus diluen-
tia, demulcentia, et balnea commendauit; iis nil
iuuantibus, MOSCATO consentiente, per incisuram ve-
ficae in perinaeo factam quinque vel sex septimana-
rum spatio apertam emollientia, deinde detergenti-
bus coniuncta, iniecit, hisque ischuriam, et necessi-
tatem cathetere vtendi plane remouit, reliqua sym-
ptomata tantum ex parte mitigauit, a quibus aeger,
septem sequentibus annis variis remediis frustra vsus,
tandem liberatus est, per triennium omni mane pau- p. 34.
ca intra minuta quinquaginta vncias aquae virginis

montis Ortonis in Paduano bibendo. III. Puer octennis, nullo praesente calculo, dysuria, ischuria et stranguria diu vexatus operatione lithotomiae simili; et
 p. 35. IV. puella a quinto anno urinam frequenter et parce mittens, et per vndeuginti annos remediis incassum vtens, viro nupta sponte sanata est.

5. *Physica specialis et generalis in tentaminibus aliis analyticis, aliis elementaribus, auctore CAROL. BARLETTI, Prof. phys. exper. et gener. in reg. l. univ.*

p. 36. *Pav. Pav. 1785. 8. Ital. script.* Tom. I. de calore et principiis thermologiae; calorem absolutum, specificum, sensibilem, et latentem ex varia fluidi universalis cum particulis terrestribus coniunctione explicari; lucem vocari momentaneum excessum caloris absoluti, e. s. p. Tom. II. de meteoris et meteorologia. Fulgetra aestate frequentia vere esse reflexa fulgura tempestatum longius remotarum. De nouis methodis, observationes meteorologicas, hucusque inutiles, vtiliores reddendi. Ad duplicem electricitatem illustrandam duo assumenda esse fluida. Ictu fulminis aërem dephlogisticatum habitum suum aëreum perdere, et metalla fundi. Tom. III. de aëre, aërologia, luce, et optica. Infectionem aëris non a principio aëri atmosphaerico accedente, sed ab aëre dephlogistico ex atmosphaerico abeunte oriri.

p. 38. Tom. IV. de physica generali. P. 1. Vim particularum materialium tenuitati ipsarum adaequatam esse; inter fossilia et organica corpora summam existere analogiam, quae euidentius innotesceret, si principium, quod omnia corpora iungit, eorumque mutuum influxum efficit, cognitum esset; diuisionem corporum in aërea, vel sublimia, aquea vel sub-

p. 39. marina, subterranea etc. velut aptiorem, diuersam

p. 359. eorum naturam melius esse explicaturam. P. 2. astronomica est, legesque attractionis, et phaenomena terrestria a coelestium corporum influxu pendentia,

tia, inprimis fluxum et refluxum maris perlustrat.
P. 3. de vera ratione physicam colendi, quam in cui- p. 360.
tanda diuinatione causarum omnium phaenomeno-
rum, quam methodum metaphysicam vocat, strenua-
que mathematica methodo, theoria vero ex exemplis
illuſtranda ponit. Tomorum trium priorum pars
prima tantum prodiit.

6. *Tentamen obseruationum et experimentorum de* p. 58.
facultatibus medicis aquae per artem gazosae et martia-
lis factae. Vtin. 1785. Italice script. Auctor D. BORTO- p. 59.
LO CHRISTIANOPOLI, a prof. Vtin. BERNABITA
multum huius aquae obtinuit, eamque aegris in po-
tu, balneis, vel iniectionibus datam in hepatis lienis-
que obstructionibus, ictero, segnitie alui, vehemen-
tissimis ventriculi et musculorum doloribus, oede-
mate, chlorosi, menſtruis suppressis, fluore albo, vl-
ceribus et distensione tendinum et ligamentorum
articulorum vtilem expertus est.

7. *Commentatio* P. 10. BAPT. DE SANMARTINO p. 77.
Caput. de rubigine (nebbia) vegetabilium. Vicent. 1785.
Italice script. Esse obstructionem vasorum perspira-
tionis insensibili inferuentium, a mixtione exhalatio- p. 78.
num et vaporum, glutinis ad instar in superficie con-
densatorum obortam, plantae robur reddendo
auertendam.

8. D. MARAT *de usu electricitatis in medicina. Pa-*
ris. 1784. Gall. script. Contra Abb. BERTHOLONVM
electricitatem in producendis et sanandis morbis
minus efficacem, eamque tantum in tumoribus ex-
ternis non dolentibus, eruptionibus cutaneis, rheu-
matismis, doloribus vagis, paralyſi, hemiplegia, lan- p. 79.
guore et incremento infantum imminuto, vtilem, in
abscessibus a causa virulenta noxiam censet.

9. VOULONNE *de charactere febrium malignarum,*
*Gall. script. *) Eas esse febres auctas, in quibus natura*

O o 4

vires

*) Praemio ornata 1785. ab acad. Diuionensi: cf. com-
ment. nostr. Vol XXV. pag. 556. et XXIX. pag. 167.

- p. 80. vires energiae principii morboſi accommodatas non euoluit, aut propter nimiam illam energiam, aut ob organorum naturae debilitatem. Illas viuas, has lentas vocari poſſe.
- p. 91. 10. *Continuatio diſquiſitionum diuerſorum puncto- rum phyſiologiae, pathologiae et therapiae, e quibus ap- parent relationes morborum internorum cum legibus irritabilitatis; auctore FABRO, Pariſ. 1784. 8. Gallice ſcript. in indice falſo tantum ad med. theor. relat. Tra- dito proſpectu oeconomiae animalis inprimis ſecun- dum theoriam BORDEUI, ſententiam ſuam de irrita-*
- p. 93. bilitate, in priori opere iam expoſitam, ad morbos
- p. 136. internos, medicamentorumque actionem, et in alio
- p. 138. libello, *diſquiſitiones de calore animali tradente, etiam ad hunc explicandum applicat.*
- p. 114. 11. *Epistoſa D. FRANC. ZULATTI ad D. 10.*
- p. 115. BAPT. MARZARI *de nonnullis tetani ſpeciebus; italice ſcripta. Approbatur idea MARZARI de tetano ana- logo rheumatismo inflammatorio, diſſeritur de teta- no gaſtrico et putrido, in quibus opium, caſtoreum et ſimilia nocua; reprehenduntur medici V. C. TRN- KA et SAUVAGES, cauſas, adeoque et ſpecies tetani non rite diſtinguentes; enarrantur quatuor caſus*
- p. 116. tetani rheumatico-inflammatorii ad comprobendam laeſionem neruorum a perſpiratione ſuppreſſa or- tam, vtilitatem methodi antiphlogiſticae, noxam ve- ro antipſmodicae et calefacientis; demonſtratur
- p. 151. huius tetani prae ceteris frequentia ex cauſae fre- quentia, regionibus, annique temporibus, quibus en-
- p. 155. demius, et criſi eius; exponuntur cauſae tetani ga- ſtrici, illique medendi methodus, moſcho ſimul in
- p. 184. infantum vſum commendato; comprobatur exiſten- tia et cura tetani putridi enarratis hitoriis morbo-
- p. 185. rum, exempli tetani ex abſceſſibus a metaſtaſi febris putridae in cerebro ortis, frequentia tetani inter in- colas zonae torridae; oſtenditur, exanthema eryſi- pelato-

pelatosum et miliare tetanos saepe pariens, reuocatumque eos tollens, putridae esse indolis, demonstratur noxa opii, vtilitas moschi et ipecacuanhae p. 187.
refracta dosi propinandae in tetano putrido; laudatur denique epistola MARZARI nuper recensita. p. 189.

12. *Examen aequum opinionum physicorum de theoria et praxi magnetismi animalis. Italice script.* Recensentur variorum veterum de magnetismo hoc sententiae; idea de fluido vniuersali, vt causa reciproci influxus astrorum, corporum terrestrium, immo et atomorum materiae minimorum, iam multum probabilior facta, illustratur phaenomenis lucis, electricitatis, et caloris; demonstratur vt constanter verum, fluidum illi phaenomena haec producenti analogum in corpore humano circulari, et aut principiorum terrestrium fibras constituentium actioni resistendo, aut eam liberam relinquendo causam esse praecipuorum oeconomiae animalis phaenomenorum; ostenditur, leges influxus astrorum in alia corpora, et vicissim mediante illo fluido peracti, naturam huius fluidi, modum illud condensandi, rarefaciendi, et pro lubitu dirigendi nemini plane esse cognitum, non autem damnandos esse, qui in reliquis cauti sensim decipi se passi sunt; exponuntur variorum recentiorum iudicia; fuse doctrina MESMERI, a Thoureto recte cum illa MAXWELLII comparata, vna cum societatis Parisinae et BONNETI de ea iudiciis, et varia exempla fraudem magnetistarum illustrantia; contenditur denique, principium illud ex vno corpore in aliud, ex vna particula in aliam transiens, variaque phaenomena gignens esse materiam aetheream, quae a neruis attrahi et distribui, alio stimulo ex corpore extrahi, a circulantibus humoribus iterum absorberi videatur, et esse vel simplicem, vel coniunctam forte cum alio elemento, quod eam modificet, caloremque animale pariat. p. 121.
p. 122.
p. 123.
p. 124.
p. 128.
p. 161.
p. 163.
p. 164.
p. 170.

- P. 189. 13. MICH. VNDERWOOD *Tr. de ulceribus crurum.*
 -151. *Paris. 1784. 8. Ex Anglico translatus in Gallicum*
 a LEFEBURE DE VILLEBRUNE et cum CHAM-
 PEAUX et CAMPERI scriptis comparatus, relata simul
 ELSII in curandis his vlceribus methodo.
- P. 158. 14. *Analysis chemica carbonis fossilis de Arzigna-*
no cum naturalis, tum purificati, qua innocentia usus
eiusdem probatur, opus posthumum ANT. BASSEGGIO,
- P. 159. *Venet. 1786. 8. Italice script.* In omni libra naturalis
 vnciam vnā et duodecim grana olei variae consisten-
 tiae odorisque empyreumatici, quatuor vncias et duo-
 decim grana mucī (*flemma*) paucique acidi volatilis, illi,
 quod succinum exhibet, analogi, sex vncias, septem
 drachmas et quinquaginta quatuorque grana substan-
 tiae carbonaceae, in qua vna drachma et viginti septem-
 que grana terrae argillaceae, sex vero grana gypseae,
 tantum perparum acidi sulphurei volatilis continen-
 tis, reperta fuisse, carbonemque nil alcali volatilis te-
 nentem, Suecico et Anglico adhuc praefarendum esse.
15. D. BRUSLE *Epistola ad auctores diaritency-*
 P. 160. *clopaedici Bouillonensis 1786. Gallice scripta.* Contra
 GARDANEVM contendit, colicam nauium, velut bilio-
 sam, et cortice chinae sanandam, ordinarie non a pi-
 cturis prouenire.
- P. 172. 16. *Anonymus de morbis neruorum, quos vulgo*
 -183. *vapores et conuulsiones vocant.* Sunt aphorismi, maiori
 209. - adhuc edendo operi de vaporibus praemissi, a Diarii
 215. auctore in Italicum sermonem ex Gallico translati.
- P. 190. 17. BARTHOL. PATUNAE, *protomed. Gradisc.*
comment. de crinonibus. Goriz. 1785. 8. Italice script.
 Comedones fuisse hucusque in Italia incognitos, ob-
 seruatos ab auctore in filia nationis iudaicae, ab infirma
 matre nata et decimum ad vsque mensem misera;
- P. 191. MARCO POLACCO, medico Palmae nouae, in puella
 triginta et duorum mensium, iam vltra annum ema-
 ciata, colore liuido, cineritiis alui deiectionibus, aquo-
 fis

fis vrinis, appetitu voraci, hepate tumido et duro,
 pulsibus semper febrilibus, callosis tuberculis, cru-
 stisque pruriginosis, modo desquamatis, modo de-
 nuo orientibus, in dimidia inferiorique corporis par-
 te in ea animaduertendis. SENNERTVM crinones
 male cum dracunculis, venaque medinensi Arabum
 confudisse, alios varie errasse, solos VALENTINVM,
 VALLISNERIVM, SAUVAGESIVM, ET TMÜLLERVVM,
 quem et in cura auctor sequitur, rite iudicasse. Cri- p. 192.
 nonum lanuginosorum triangularium caput, corpore
 latius, duos pilos tertiam lineae partem longos, duas
 antennas formantes, ante se ferens, corpus dimidiam
 lineam longum, oblongum, in medio nigrum pun-
 ctum habens, in angulo acuto iunctum cum cauda
 quadruplo longiori, sex lanæ ad instar subtilibus,
 duasque lineas longis, mobilibusque, quibus median-
 tibus vermibus in habitaculum suum redeat, in
 cute se figente, ab auctore observatum nudo et ar-
 mato oculo depictum traditur. Esse crinonem non
 inter vermes, sed cum dysentericis et exulcerantibus
 ad aptera LINNAEI, referendum nomine acari crino-
 nis, infantum pedibus longissimis setaceis, anticis
 duobus brevioribus, cauda longissima, dispersa, seta-
 cea. Differitur postea de sede crinonum, de aetate, p. 193.
 in qua observantur, de eorum ortu et effectibus, de
 signo eorum diagnostico, de variis morbi ab iis pro-
 ducti stadiis, quae omnia maxime ex BASSIGNOTI
 mente explicantur. Tandem de cura ad modum p. 194.
 ET TMÜLLERI, commendatur tamen post factam
 crinonum extractionem lotio corporis aqua ex qua-
 tuor mercurii sublimati granis in duabus aquae de-
 stillatae libris solutis duabusque mellis vnciis confe-
 cta; balnea frigidiuscula, frictio manu et lacte cali-
 do omni mane suscipienda, neglectio fasciarum, libe- p. 195.
 rum infantum motum ad crinones expellendos ne-
 cessarium impediendum.

18. *Experimenta ad decompositionem aquae in aërem facta auctore D. FERD. GIORGI, Florent.*
- p. 196. 1785. 8. *Ital. script.* Calore moderato aquae ebullientis aquam in aërem illo atmosphaerae aliquantum puriorem, odore empyreumatico praeditum mutata fuisse, inflammabilem vero maiori caloris gradu adhibito apparuisse, nec adeo aquae essentialem esse; verae contra aquae elementa esse aërem dephlogisticatum, et phlogisticatum; hancque theoriam in combustionibus subterraneis, et ortu dephlogisticati aëris explicando multum valere. Contra quae asserta auctor diarii enunciata Academicorum Parisinorum de hac re defendit.
- p. 201. 19. A. C. LORRY *tentamen medicum de praecipuis morborum mutationibus et conuersionibus, edidit post auctoris fata I. N. HALLE', Paris. 1784. 12. Gall. script.* Sunt libri tres partes. P. I. de epigenesi, sect.
- p. 241. I. quae a morbo primario, et quidem cap. 1. a vitio
- p. 244. virium, cap. 2. a vitio humorum, cap. 3. a causis accidentalibus, videlicet medicamentis, rebusque sex
- p. 248. non naturalibus pendet. Sect. 2. de epigenesibus a causis cum morbo primario neutiquam connexis,
- p. 251. vel cap. 1. a fomite praeeistente, vel cap. 2. ab iis, quae morbo superueniunt, nempe mutato spiritu rectore animali vel vapore expansili quorundam no-
- p. 252. strorum humorum; vel cap. 3. a mutationibus corporis per operationes chirurgicas productis. P. II. de
- p. 281. metaptosis proprie ita dictis, aut ortis a volatili et fugace materiae morbosae natura, quod fiat vel
- p. 283. materia morbosae per se multiplicata, vel eius naturae vires imminuente aut destruente, vel quadam corporis parte ita vitiose comparata, ut materiam morbosam facile resorbeat, vel deprauatis nostris humoribus ab occasionalibus et accidentalibus causis, facile ad effectus morbosos hinc et illinc producendos
- p. 284. determinandis; aut enatis ab agentium externorum,
- mate-

materiam morbosam licet fixam seu grauem ad alias partes reuellentium, influxu. P.III. dep. 285. metastasibus vel iis metaptosis, in quibus modificatio ab ipso malo diuersa non, vt in illis proprie dictis, ab aucta vi causae morbosae, sed a viribus naturae se malo opponentibus dependet. Finem impo. p. 287. nit caput de complicatione morborum.

20. D. PAUL PINELLI *Diff. med. de principio pestis urbis Spalatri etc. Venet. 1785. recens. a D. IAC. PANZANI.* PANZANI optat, vt signa certa et perspicua verae indolis pestis a quodam determinantur, litem inter PINELLVM, pestem Spalatri anno 1784. p. 217. grassantem ante duodecimum Martii diem non exortam esse, contendentem, aliumque inter medicum, initium eius iam anno ineunte statuentem, ortam p. 218. dirimere non audet; summa tamen modestia et eruditione docet, in quibusdam vndecim illorum ante dictum Martii diem mortuorum cadaueribus phaenomena contagii sat suspecta occurrisse; axioma PINELLI, pestem sine eruptionibus homines ante bi- p. 221. duum iugulare, cum experientia, pestes lente incedere, nec statim in principio timorem iniicere, luculenter demonstrante, neutiquam consentire; febrem p. 224. quatrduanam in naue Rouignensi merces ex Bosnia ferente viginti et duorum dierum spatio quatuor aegros mense Ianuario anni 1784. quo et famulus nosocomii Spalatrensis, antea eiusmodi mercaturam faciens, sat magnis bubonibus inguinalibus affectus fuit, verosimiliter primus Spalatri infectorum habendus, enecantem non fuisse putridam verminosam, sed verae pestilentialem; subitam peste infectorum mortem non ab ipso contagio, irritabilitatem musculosam, sensibilitatemque nervosam vna delente, multisque aliis pendere causis; miasma pestiferum consistere in parte liquidorum magis elaborata, magisque phlogisto, inter quod et alcali animale

male summa affinitas, succedente tempore saturatum efficacius fieri; aestiuo calore et hyberno frigore summo pestem mitiorem ideo reddi, quod illo alcali, velut miasmatis pestiferi essentia, dispergatur et attenuetur, hoc vero phlogiston, velut miasmatis menstruum, dissipetur, indeque alcali illud praecipitetur; respondere denique PINELLIANAM pestis definitionem non omni ex parte experientiae.

P. 235. 21. P. FRANC. SCATI *compendium educationis physicae et moralis ad reddendos filiolos sanos, robustos, durabiles, et honestos. Gorit. 1784. 8. Ital. script.* Quid grauiditatis tempore, et primis pueritiae annis peragendum, rite praecipit, extricationem cochlearis sanguinis ex vmbilico sanorum commendat, leuem cunarum agitationem permittit, valde vero damnat fascias, thoraces, portatum infantum in brachiis, eorum ambulationem in curriculis, maxime insitionem

P. 236. variolarum, velut fontem multarum epidemiarum variolosarum, putans, variolas, quarum semen in partibus aërem componentibus non contineatur, facile exstingui posse, si ea, quae in aliis morbis contagiosis, cautio strenue adhiberetur.

22. IO. ANT. ADAMI *Diff. med. de oleo caieput. Gotting. et Argent. 1783.* Historia olei, methodus ipsum extrahendi et purificandi, vtilitasque exponuntur, omnibus aliis oleis aromaticis praefertur, et teste STROHMAYERO exemplum feminae a parentibus rheumatismo saepe vexatis natae, ab odontalgia et stranguria rheumatica solo hoc oleo liberatae narratur.

P. 253. 23. *Disquisitio de natura et usu succi gastrici in medicina et chirurgia.* Praeter Iurini et Toggiae *)
 256. experimenta recensetur hic potissimum CARMINATI
 P. 257. libellus, qui Cap. I. vsum succi externum in vlceribus, gangraena et cancro, quatuordecim exemplis
 P. 258. illu-

*) vid. Comment. nostr. Vol. XXVIII. p. 602. sqq.

illustrat. Adhibuit vero succum ex coruis atris, cornicibus cinereis frugilegis, aequae carnibus et vegetabilibus pastis, strigibus bubonibus, ardeis gruibus, falconibus palumbariis, carniuororum succum maiorem quidem pruritum facere, celerius tamen sanare: mensis enim spatium, fonticulo tamen et internis de- p. 259
nique etiam adhibitis, in sexagenaria vlcus a causa interna enatum viginti et sex per annos iam durans sanatum fuisse; succum pecorum in tribus casibus in- p. 260.
utilem fuisse; illum e falconibus petitum teste et p. 261.
SPALLANZANIO in carie ossium reliquis praestare. p. 262.
Cap. II. de usu succi interno in doloribus chronicis, contusionibus, tumoribus lymphaticis, inflammatoriis, p. 263.
scrophulosis, itemque hydrocele spuria. Succum bo-
um, vitulorum, pecorum in his morbis resoluendi vir-
tute pollere; sic et in tumoribus duris venereis glandularum inguinalium, calloque extremitatum succum carniuororum et omniuororum celeriter profuisse; tentandum esse in rheumatismo chronico, arthritide, paralyti; tantum utendum esse succo sanorum anima- p. 264.
lium, in quibus digestio omni ex parte absoluta fuerit; SPALLANZANIVM ex quinque cornicibus paucos intra dies tredecim, triginta et sex vero uncias succi ex duobus prioribus pecorum per biduum ieiunorum ventriculis obtinuisse. Cap. III. de usu succi interno in morbis ventriculi, febribus gastricis et intermittentibus. Primum esse in his morbis adhibitum a D. MONGIARDINI. In vlcere ventriculi succum p. 265.
carniuororum, aqua dilutum, et dosi duarum trium-
ve drachmarum vel minori exhibitum, semper dolores auxisse; eundem in febribus gastricis nocivum p. 266.
fieri posse, quum excretiones intestinorum retardet et imminuat. In reliquis sentit ut IVRINVS. Cap. p. 288.
IV. de examine chemico via humida et Cap. V. via sicca facto. Examinauit succum decem ardearum gruum, et sex nycticoracum, quinquaginta et duarum strigum

strigum flammeorum, octoque passerinarum, et quatuor falconum buteonum, multorum animalium frugiuorum, herbiuorum non ruminantium, et ruminantium, nec non omniuorum, inter quos homines. Ex quo examine praeter ea, quae a SENEBIERIO *) iam enarrata, apparuit, succum cuniculorum cum illo frugiuorum, eum porcorum, et vitulorum lactantium nondumque herbis vescentium cum illo carniuorum conuenisse, eum animalium carnes et vegetabilia aequa quantitate edentium semper spumofum et neutrum, statim autem, iis sola carne ad edendum data, in acidum mutatum fuisse, omnes succos gastricos proprie vere neutros esse et ex tribus principiis componi, aqua in humano copiosissima, in ruminantibus parcissima, pauxillo salis marini et substantia animali, reliqua vero eorum principia deberi alimentis, velut acidum, sal ammoniacum, et resinam carnibus, et in vitulis lacti. Cap. VI. de vi septica vel antiseptica succi gastrici. Confirmantur SENEBIERII observationes, et docetur, antisepticam virtutem pendere a sale marino, quod, si eius sufficiens adsit dosis, maiorem humidi partem attrahendo id efficiat, e contra vero, si exigua tantum dosis, corruptionem acceleret, et septicum fiat; alcalescentem ruminantium succum gastricum a vegetabilibus iam putrescentibus ortum esse; sal ammoniacale in succo carniuorum vitulorumque lactantium reperiundum in ulceribus sanandis etiam profuisse; succum gastricum mediocriter acidum drachmas duas carnis recentis vitulinae cum vncia vna aquae fontanae, et granis quinque salis communis (tot enim grana in vncia vna succi gastrici auium carniuorum contenta fuisse) in lagena bene obtesta gradu ignis trigesimo thermometri Reaumuriani per sedecim horas digerendo parari posse; hunc

arte

*) Vid. Comm. nostr. Vol. XXVIII. p. 605.

arte paratum noua carne addita denuo digestum qualitate, et vti in vulneribus sanandis expertum, effectu plane similem esse liquori gastrico carniuororum; eundem, si irritatio cauenda, minori salis dosi addita, parandum esse, acidum enim ex carnibus sine hoc sale p. 300. extrahi posse; ex carnibus reuerberio ignis sine aqua subiectis paucorum minutorum spatio acidum euolvi, et tum statim vulneribus esse imponendas, saepe vero renouandas; mineralium cum liquoribus ventriculi et intestinorum commixtionem negari non posse, licet sulphur, cinnabaris, aethiops mineralis, antimonium crudum, et diaphoreticum ablutum, calx ferri, floresque zinci, ab adhibitis variis liquoribus gastricis, maxime humano, dissoluti non fuerint.

24. D. GVIL. WITHERINGII, *med. nosoc. Bir-* p. 272.
mingham. libellus de digitali purpurea, eiusque usu in
medicina, cum nonnullis animaduersionibus practicis de
hydrope et aliis morbis. Birmingham. 1785. 8. Anglice
script. Planta secundum LINNAEVM descripta, se- p. 273.
cundum CVRTISIVM depicta, variique auctores de
eius usu adducti sunt; ex centum sexaginta et tribus
propriis, multisque aliorum obseruationibus, maxi-
mam partem fauorabilibus, efficitur, digitalem pol-
lere constantissima vi diuretica, omnibus diureticis
quoad effectum placidamque actionem praestare, in
hydrope vero paralyti, visceribus debilibus, aliisque
morbis accedente, lenire tantum, locumque dare re-
mediis primarium morbum tollentibus, tantamque
vim in motum cordis habere, vt pulsus intra minu- p. 274.
tum ad triginta et quinque ictus reducere valeat.
Folia reliquis partibus etiam vtilibus praestare; pul-
veris eorum vnum vel tria grana bis de die adultis
aut per se, aut aromaticis, vel in pilulis saponi et gum-
mi ammoniaco admixta, debilibus quatuor tantum
grana quotidie esse propinanda. Et in infuso, nec
non robustis ad triginta vsque grana quotidie dari
Tom. XXXII. Pars IV. Pp posse.

- p. 275. posse. In usu eius, usque dum effectus vel in renes, vel in primas vias, vel in pulsum se prodatur, tantum continuando satis bibendum hydropicisque fasciam applicandam esse. Robustos fibra, et pulsu tenso, cute calida praeditos venae sectione, purgantibus et squilliticis antea esse praeparandos. In saccatis hydropibus, et ubi structura partium, vel fluidi consistentia laesa, perparum, in complicatis ab humore ob paralyfin vasorum et structuram partium continentium et contentarum laesam non resorpto pendentibus tantum palliative, in iis vero a paralyfi vasorum, his tonum reddendo multum efficere digitalem, in aliis paralyseos speciebus forte efficacem.

25. *Epitome nonnullorum aliorum experimentorum de decompositione aquae in aërem respirabilem publicatorum diebus 5. 6. 7. April. 1786. a D. FERD. GIORGI. Italice script. Sunt facta, ut certior redderetur de aëre ex aqua vere euoluto.*

- p. 313. 26. D. ANDR. DOUGLAS *Obss. de casu extraordinario rupti uteri. Lond. 1785. 8. Angl. script. Foetus ex abdominis cauo, in quod, utero non procul a nexu cum vagina inferiora et anteriora versus transuersim lacerato, paucis horis post iterum constricto, una cum placenta illapsus erat, feliciter extractus, et aegra tricenaria mensis unius cum dimidio spatio plane restituta fuit, symptomata vero eam angustia ab irritatione viscerum abdominalium a foetu facta oborta sunt.*

27. BAUME *expositio operationum et productorum cursus chemici, noua edit. in lingua Italica, aucta variis notis medicis, chemicis et pharmaceuticis a D. IO. MARMAZZI, med. ord. nosoc. mai. Mediol. qui adiunxit breuem expositionem omnium praecipuorum fontium mineralium Italiae, T. 2. Mediol. 1785. 8. Notarum*

- p. 318. nonnullae, quae post BAUMII librum editum nouiter detectae sunt, exponunt, plurimae succincte medicam variarum praeparationum, v. g. mercurialium, ferri, anti-

antimonii, camphorae, lactis, facultatem illustrant. Expositio fontium Italiae ex aliis libris ita hausta est, ut horum errores emendati, et plenaria illorum fontium, quoad qualitatem et usum, cognitio principiis recentiorum accommodata fuerit. p. 319.

28. *Epitome experimentorum de decompositione aquae, auctore FEL. FONTANA, Florent. 1785. Italice script.* Non comprobatam esse censet aquae in dephlogisticatum et inflammabilem aërem decompositionem, putatque in experimentis academiae Parisinae aerem inflammabilem esse productum a phlogisto ferri vni aquae parti vnito, dum altera se ante cum ferro phlogisto destituito et in crystallos reducto coniunxerit. Quod si non fiat, nunquam inflammabilem, sed atmosphaericum illo laboratorii peiorem obtineri, et ex tubis ipsis ab aqua in vapores expansa expelli. De quo INGENHOVSIVM et LORGNAM literis certior fecit. p. 320.

29. *Examen mali rubri Cayennensis, vel elephantiasis institutum ab iis, quibus soc. reg. med. Paris. hoc demandavit publicique iuris factum iubente Rege. Paris. 1785. Gall. script.* Morbi huius, quem et lepram vocant, symptomata secundum SCHILLINGIVM, causa proxima ad mentem LORRY, complicatio cum aliis morbis, variaeque eum curandi methodi exponuntur. p. 333.

30. *De sanguine et de sanguineis concretionibus per anatomen indagatis et pro causis morborum habitis quaestiones medicae, auctore IOS. PASTA, Bergam. protophys. etc. Bergam. ap. Locatell. 1786. 8. mai.* Ad mentem GVARINONI et ANDR. PASTAE auctor contendit sanguinem grauitate sua specifica in locis pro situ moribundorum maxime decliuibus colligi; collectiones istas vero varia cadauerum pertractatione, compressione quorundam vasorum, intumescencia abdominis diaphragma et cor cum vasis sursum premente quandoque mutari posse; nunquam au- p. 341. p. 339.

- tem eas pro morborum causa, sed pro mortis effectu
- p. 342. habendas esse; morbos capitis potius ex peruersa fibrarum cerebri et neruorum actione explicandos
- p. 344. esse; se nunquam a ligatura arteriarum, velut cruralis, quam viginti demum diebus post ligaturam factam supra eam incidere, polypos oriri, nec ex incisis venis frustra polyposa exeuntia animaduertisse, LANCISIO igitur et PETITO neutiquam assentientem
- p. 346. dum esse, nec LEEUWENHOEKIO, qui in vasis viuorum insectorum globulos sanguinis tantum discernere non potuerit; discriminis inter veros spuriosque polypos characteres a MORGAGNIO assumptos esse insufficientes; viri huius et HALLERI de polypis in aneurysmatibus opiniones plane esse reiiciendas, polyposque nunquam in vasis viui animalis generari.
- p. 349. 31. EDVARD. ALANSONI *methodus membra amputandi, ex Angl. in Gall. translata a LASSO, Prof. chir. Paris. 1784.* 12. Praecipua huius methodi sunt: reiicit lorum, quo cutis valentius adstringi solet, velut spasmos, vehementioremque febrem pariens; iubet musculos usque ad os ita oblique discindi, ut acies cultri, oblique sub integumentis tres quatuorue digitos transversos altius, quam incisione circulari vel perpendiculari fiat, ad os perveniat; praecipit, ut cute musculisque arte coniunctis vulneris longitudinalis angulosque alterum superiorem, alterum inferiorem habentis labia accurate conglutinentur, et ut truncatum os nonnisi duos tresue digitos super lecti superficiem teneatur; polliceturque, ita
- p. 351. in truncato osse fieri circulationem validiorem et celeriore, imminui periculum exfoliationis, accelerari cicatricem, (quae semel in amputato crure vndeiginti dierum spatio enata;) febrem vel esse nullam vel exiguam, suppurationem esse parcissimam, impediri spasmos in aliis methodis a corporibus labia vulneris interpositis productos, ut et truncatum

os ad ligneum v. c. pedem ferendum aptius reddi. Quae ad incommoda a peruerso aëre orta auer-
tenda fieri debeant, et quod suppuratione largiori
debiliores frequenter extra lectum, fortiores in situ p. 352.
horizontali tenendi sint, etiam docetur.

32. *Meditationes et coniecturae de substantiis ve-* p. 361.
getabilibus et animalibus, quoad partim formant corpo-
ra organica, partim decompositioni obnoxiae sunt Ba p. 364.

sin aëris inflammabilis commune esse vegetabilium
et animalium principium; in his sensim magis ab
aëre puro separari, alcalique volatili ab eadem basi
per quandam fixi seu phlogificati aëris partem ligata
formari; eandem basin, acido nitroso digestam, teste p. 365.

BERTHOLLETO et SAVANO, largiri acidum sacchari
in animalibus oleo singulari coniunctum; acidum
hoc quasi intermedium esse inter acidum tartari aë-
ris dephlogificati minus, et acetum radicale, eius-
dem aëris plus continens; basin aëris inflammabilis p. 369.

verum esse principium radicale omnium acidorum,
pro diuersa illius puritate vel tenuitate variorum,
basin vero dephlogificati aëris principium acidifi-
cans; vtramque basin cum fluido electrico tria con- p. 402.
stituire corporum elementa. Esse porro basin aëris p. 409.

inflammabilis verum principium vitale, fluido ele-
ctrico ex arteriis constrictis in eam abeunte expan-
sile redditum. Basi eadem ab omnibus heteroge- p. 461.

neis, inprimis a basi aëris dephlogificati, separata,
nouiterque vel cum suis elementaribus partibus, vel
cum vapore electrico, vel cum alio quodam princi-
pio coniuncta oriri phosphorum, ex cuius cum aëre
dephlogificato vnione enascatur acidum phospho-
ricum in vrina et humore perspirabili manifestum.

In lite de acido calculorum, et alcali volatili topho- p. 463.
rum arthriticorum dirimenda nil certi quidem sta- p. 464.
tuendum esse, asserendum tamen, materiam podagri-
cam accedere ad naturam calcaream cum substantia

- animali, in phosphorum facile transeunte, commix-
p. 465. tam. Igitur acidum phosphoricum in iis, qui arthri-
tidi et rheumatismis obnoxii, nonnisi post vehemen-
tes paroxysmos animaduersum, ex intima particula-
rum phosphoricae materiae, in istis aegris vere abun-
dantis, inter se cohaesione explicandum esse. Idem
denique acidum verosimiliter multum facere ad ca-
tarrhos, pleuritidem, febres, et morbos neruorum.
- p. 370. 33. *Analysis cremoris tartari solubilis* BERGII,
epistola ad Ill. D. MATTH. CALVI, med. Venet. Paduae
p. 371. *script. ab A. D. G. cui CALVI eam demandauerat.*
Tradita cremorem solubilem parandi methodo ex
p. 373. commentariis Edinburgensibus boracisque et cre-
p. 374. moris tartari simplicis partibus constituentibus de-
scriptis, varios suos processus chemicos distincte ex-
p. 417. ponit, ex quibus patet, contineri in cremore solubili
ex quatuor libris cremoris simplicis et vna boracis
parato salis crystallini floccosi, ex quinque partibus
tartari mineralis, et tribus tartari calcarei compositi,
quatuordecim drachmas, cremoris tartari simplicis
libram vnā et duas vncias, et materiam quandam
salino-gummosam, quam tremoris tartari simplicis
libra vna duaeque drachmae, tartari vero solubilis
WILLISII, acidi boracis, et tartari solubilis mineralis
ana quinque vnciae, tres drachmae cum scrupulo
p. 416. vno constituent, et quae ex tartaro sedatiuo, et sale
vegetabili sedatiuo composita, tartaro minerali solu-
bili cum acido boracis modificata, nominari posset
p. 417. tartarus solubilis mineralis sedatiuus; harum parti-
cularum tamen proportionem pro varia cremoris
tartari aciditate, eademque et alcalina varia boracis
natura differre, perdi in parando cremore solubili
p. 420. decem circiter vncias; acidum cremoris illudque
boracis vtique mutari in tertium ab utroque illo di-
p. 422. versum; cremoris solubilis in aqua maiorem mino-
remue solubilitatem a maiori minoriue tartari calca-
rei

rei in eo reperiundi quantitate pendere, necesse igitur esse, ad hunc, quantum fieri possit, separandum, p. 410. ut liquor ex cremore et borace ebulliendo paratus in loco frigidiusculo, usque dum pellicula appareat, euaporet, ad perfectam densitatem refrigeretur, quintupla aquae ebullientis quantitas denuo infundatur, nouaque euaporatio fiat, usque dum pulvis sextam totius ponderis partem aequans remaneat. Docet p. 424. etiam Italos, inprimis tenella fibra praeditos, vim cremoris solubilis refrigerantem, antisepticam et diureticam a minori dosi experiri, eodem vero valde purgari, et nauseam, vomitumque pati, cum ob acidi salinique saporis dissonantiam, tum ob vehementem p. 424. tartari sedatiui, velut praecipui ingredientium, aciditatem; exponit igitur, quae ad falsedinem abscondendam, aciditatemque mitiorem reddendam addenda sint.

34. *Observationes et disquisitiones medicae societatis medicae Londinensis, Vol. VI. Lond. 1784. 8.* Elogia FOTHERGILLII, SOLANDRI, HUNTERI, quorum morte editio huius voluminis retardata fuerit. GIR. WRIGHT *historia sanguinis in pericardium effusi*. Militis magna pondera ferendo in supinum p. 382. lapsi vena caua intra auriculam pollicis longitudine rupta, pericardium cum venis maioribus sanguine coagulato valide extensum, cor vero corrugatum fuit. IOH. MASON *de duobus hydropicis, moderato opii usu feliciter sanatis*. IO. HALL *de aneurysmate aortae, et carotidis sinistrae, intra tracheam rupto cum icon*. *Historia morbi* HOLDERI a RICESTR. BROWN p. 383. CHESTONO *descripta*, in Vol. VI. diarii medici Londinensis tertia parte vberius exposita. Mortuus est anno aetatis quinquagesimo, a vigesimo secundo, quo ictero, calculi biliarii magni excretionem sublato, laboravit, multis biliosis per os et anum euacuationibus, cum dolore coniunctis obnoxius, quatuorque per annos

- P. 354. ante mortem primo tantum, cum iret, postremo etiam in omni corporis, praeter horizontalem, situ percepit molestant in pectore sub sternum sensationem, sensum vehementiorem, totum tandem pectus occupantem, sibilo velut aquae currentis, ab adstantibus etiam animaduertendo, carotide vero pressa per aliquid quod tempus supprimendo, se manifestantem, quandoque, et interdum remittentem. Cordis solito longioris et acutioris auricula dextra dilatata et inflammata fuit, ventriculi, quorum dextri parietes firmitate et colore destituti ac transparentes, loco sanguinis multum aëris, etiam interstitia chordarum tendinearum replentis, sinister et multum pinguedinis, continuerunt; utriusque ventriculi superioribus laevis adhaesit, duasque caui tertias occupavit concretio flava et densa, quae tamen in sinistro minor, P. 388. obscurior et mollior, quatuor pollices in cavam superiorem, unum in inferiorem, unum cum dimidio in aortam protensa, in vasisque magis lymphae coagulatae similis. MATTH. DOBSON, IOH. HUNTER, P. 433. et HAYGARTH de efficacia mercurii in hydrocephalo interno. IO. FOTHERGILL de cura epilepsiae et venae sectione in apoplexia. Causam epilepsiae praecipue in distensione ventriculi, eiusque et intestinorum repletionem ponit, valerianaeque, castorei, similiumque medicamentorum salutarem effectum ab aegrorum appetitu iis imminuto derivat. Venae sectionem damnat in apoplexia, quem morbum magis saburrae intestinorum adscribit, docetque, et P. 435. exemplo comprobat, apoplexiam saepe oriri a capite obiectorum retropositorum videndorum gratia solo sine reliquo corpore retrorsum verso, carotidibus nempe tum plus sanguinis versus caput pellentibus, iugularibus vero minus reuehentibus. TH. GERY P. 436. CULLVM de tumore cystico aquoso, posteriori vesicae parti, totique recto adhaerente, letalem urinae suppressionem

tionem producente. IO. FOTHERGILL *de cephalaea*, p. 437.
 quam auctor diarii a SAUVAGESIO vomitus cepha-
 lalgici nomine insignitam esse ait; in sedentariis di- p. 438.
 aetam negligentibus, et alui segnitie laborantibus
 animaduertendam. DAV. MACBRIDE *ad FOTHER-* p. 466.
GILLVM de angina pectoris. Per tres annos aegram p. 467.
 male habuit, diaeta, alterantibus, et duobus fonticu-
 lis in femoribus applicatis feliciter tandem curata
 est. Ostenditur etiam, cur Hiberni prae Anglis ra- p. 468.
 rius hoc morbo afficiantur, spasmusque cordis causa
 immediati paroxysmi habetur. Addit auctor diarii
 MALCOLMII MAEQUEENII observationes de hoc p. 469.
 morbo ex quinto diarii medici Londinensis volumine.
 Podagra irregularis causa morbi fuit, qua regulari p. 470.
 facta hic cessauit. Hoc et alio casu analogia inter
 hunc morbum, et asthma flatulentum vel spasmodi-
 cum, aromaticorumque et stimulantium in eo prae
 cauteriis in femoribus vtilitas demonstratur. Auctor p. 471.
 diarii fomentorum aromaticorum calidissime regioni
 ventriculi applicatorum, et aetheris vitriolici interne
 adhibiti vsum in dolore regionis sterni, et constricto-
 rio antibrachii a podagra irregulari subito sopiendo
 confirmat. I. A. SEGUIERA *de impotentia deglutien-* p. 472.
di spasmodica unguento mercuriali curata. GVIL.
 WRIGHT *de utilitate balnei frigidi in trismo.* Omni p. 473.
 bi-vel quadrihorio dua vel tria aquae vascula aegris
 infusa sunt, in quatuor tamen opium simul pro-
 pinatum. A. DOUGLAS *de tussi singulari.* Aquae
 Luciae, naribus applicatae vsus solus profuit.
 S. MITCHELL *de incontinentia urinae usu specilli flexi-* p. 474.
lis curata. Fluxit vrina per vaginam, quae post par-
 tum forcipe adiuuandum suppurata prope vesicae
 collum cum vrethra communionem habuit; specil-
 lum in vrethram per tres septimanas immissum fuit.
 Curam hanc corpore vesicae laeso non valere, mo-
 nito et exemplo HUNTERI confirmatur. MATTH. p. 475.

BOBSON *ad* FOTHERGILLVM *de commodis resuscitati*
ptyalismi in curandis variis symptomatibus anomalis

P. 476. *ad modum* SYLVESTRI. IO. SMITH, MARS. WALL,

IO. LANGFORD *ad* HUNTERVM *de praeternaturali*
affectione cerebri. Concretio ossea, dimidio pacto
maior et solido (*scellino*) crassior, inaequalis, falci et
sinui longitudinali sinistri lateris adhaesit, substan-
tiamque cerebri, eiusque matres e spina superiore
transuersali occipitis secum coniunxit. Vehemens

P. 477. *in caput ictus causa visa est.* IO. FOTHERGILL *de*
diarrhoea habituali a certa acrimonia irritante humo-
rum pendente, et cum magna debilitate ac irritabilitate in-
testinorum coniuncta, paruis ipecacuanhae dosibus sanan-

P. 478. *da.* LLOYD *de tumore flatulento capitis aperto et*
curato. A lapsu ab equo sensim natus fuit, sibilum
in aure sinistra, vertiginem, nauseam, torporem ar-
tuum, praecipue superiorum. produxit, et duodecim
mensibus elapsis apertus nil nisi aërem reddidit, cra-
nio tamen in tota tumoris extensione carie exeso,
fauoque simili. BRUMWELL *de periculosis effectibus*

P. 479. *ab esu baccarum maturarum belladonnae.* IO. HOF-
MANN *de iisdem in cane pecuario et symptomatibus iis*
hydrophobiae similibus a duabus camphorae drachmis
in vertigo. SAM. CROKING *de calamo scriptorio*
duodecim pollices longo, ex oesophago, in quem illapsus,
feliciter extracto. GEO. PEARSON *de morbo dextri*

P. 480. *renis.* Fuit hinc durus et densus, illinc mollis et
cedens, cellulis fluido viscoso et materia pultacea
plenis insignis in variosque lobos conuolutionibus
intestinorum impositos diuisus, et circiter septende-
cim librarum pondus habuit. Aegri, pueri quin-
quennis, incommoda modo vermibus, modo asciti
vesiculari, adscripta sunt; semelque et paracentesis

P. 482 *tentata.* ALEX. MONRO *et* CAROL. WEBSTER *de*
simili morbo renis sinistri libras quinquaginta et
quinque pondere aequantis. GEO. PEARSON. *de opii*
utili-

utilitate in retentione urinae periculosa. A gonorrhoea et inflammatione vrethrae oborta fuit, et omni quadrihorio vnum extracti thebaici granum propinatum. GEO. LUCAS *de cataracta.* Damnatur extra p. 433.
Etio, laudatur depressio acu rotunda, nondum dimidiam drachmam ponderante, quatuor pollices cum dimidio longa. GVIL. HUNTER *de incertitudine indiciorum infanticidii;* inprimis illius ex pulmonum p. 485.
examine capti: censet praeterea, paucissimas foetum suum consulto enecare. GVIL. HUNTER *tres casus* p. 486.
vitiosae cordis conformationis. In puero, tredecim tantum dies viuentē, in quo motus cordis violentus distincte videndus, cauitas ventriculi sinistri vix sensibilis, et arteria pulmonaris in ortu suo imperuia, solido funiculo similis fuit, sanguisque ex cauis per foramen ouale et ventriculum sinistrum in aortam, et ex hac, canali arterioso mediante, exigua sanguinis pars in ramum sinistram arteriae pulmonalis transiit. In puero tredecenni, saepe cordis quasi p. 487.
oppressioni obnoxio, arteria pulmonalis in ortu suo ita constricta, vt vix minimum specillum inferri potuerit, septumque cordis in huius basi perforatum fuit. Similis septi perforatio, transmissioni pennae anserinae maioris locum cedens, in semestri puero obseruata est. GVIL. HUNTER *de dolore ventriculi* p. 488.
cum frequente et violento vomitu, magnaue debilitate p. 489.
et macie. Curata sunt haec incommoda parcioribus lactis dosibus exhibitis. GVIL. HEY *de similis* p. 490.
diaetae salutari effectu in vomitu obstinato. TH. WHATELY *de morte apparente a deglutita dimidia uncia opii.* Intra duodecim horas quinquaginta grana tartari emetici prius, quam in vitam reuocatus fuerit, data, nilque opii in vomitu reiectis animaduersum est. IO. FOTHERGILL *de morbo epidemico Londini* p. 491.
exeunte anno 1775. obseruato. Fuit analogus morbo, quem Russicum vocant. MORRIS *de letali morbo*
stoma-

stomachi HENR. WATSONI. Fuit perpetuus vomitus productus a multis tuberculis intra pylorum constitutis, transitum in duodenum impredientibus.

P. 392. 35. BERTRAND DE LA GRESIE *de cura herpetum c. obss. de efficacia extracti dulcamarae in iis. Gall.*

P. 393. *script. Paris. 1784. 12.* Datur a sex granis sensim ad drachmam usque, prodest etiam in aliis cutaneis morbis, rheumatismisque frigidis et inueteratis, ut et herba externe, ut resoluens.

P. 394. 36. RETZII *Obss. de natura, causis, symptomatibus et cura morborum epidemicorum quotannis Rupifortii regnantium et subinde in maiori parte prouinciarum Galliae occurrentium. Gall. script. Paris. 1784.* Sententia auctoris de paludibus Rupifortium circumdantibus non pro causa epidemiae habendis ab auctore diarii refutatur, iudicio S. MART. COM. DE BRIOUZE de hoc libro simul allato.

37. FRANC. PLACE *de vera diabetis causa in defectu assimilationis quaerenda. Gotting. 1784.* Omnes aliae theoriae excluduntur.

P. 397. 38. FRANC. BURTIN *diff. circa quaestionem, quanam vegetabilia indigena in humilibus regionibus diuersorum vitae usum respectu exoticis substitui possint, an. 1783. ab academia scientiarum et literarum Bruxellensi praemio ornata. Gall. script. Brux. 1784. 8. pagg. 187.* Vegetabilia substituenda ordine alphabetico ad systema LINNAEI proponuntur. Gummi arabico radix althaeae, cortici Chinae in febribus intermittentibus cortex durus lignosus perfici substituitur, cortice Chinae ille salicis superior iudicatur, et cortex internas nucis diuisiones formans ut potentissimum antisepticum in gangraena commendatur.

P. 399. 39. LE ROUGE *de herniosis. Gall. script. Paris. 1784. 12. pag. 35.* Commendatur ad hernias, non autem magna habituales et antiquas, sine fascia retinendas, emplastrum ex farinae Valloniae, resinae-
que

que siccae pini ana vnciis duabus, vitrioli martis calcinati vna seuque dimidia.

40. CHANDLER *de diuersis theoriis et curis apoplexiae et paralysis. Angl. script. Lond. 1784.* Cum CVLLENO consentit, putat tamen, stimulantia in paralysis non ita raro necessaria esse. p. 400.

41. FULLER *de cura submersorum et suffocatorum in uniuersum. Angl. script. Lond. 1784.* In submersis scintillas extrahendas, et ex animali viuo in corpus pro mortuo habitum sanguinem transfundendum esse ratur.

42. *Obss. de usu medico lacertarum, epist. FR. TREVISANI ad I. B. MARZARI. Italice script. Castelfranco 1786.* Vltiora cum lacertis instituit experimenta 1. in femina illa cancro faciei affecta, de qua nuper ad ZVLIANVM scripsit, quae quotidie vnam viridem lacertam (*ramarri*) sine nausea primum cum leuamine sumsit, tandem tamen cancro vltius progrediente obiit; 2. in viro tricenario mercurialibus nunquam vso, qui duas magnas lacertas quotidie deglutiuit, primum vrinae et salivae fluxu copioso iis promotis, nocturnisque doloribus exostosisque fugatis, cubitique mobilitate reddita, tum vero, tres licet lacertae datae, cubitoque mercurius inunctus fuerit, nullo insigni commodo animaduerso. 3. in femina lue venerea et tandem cancro faciei affecta, cui vna magna, vel duae paruae (*lacertole*) lacertae cum saturato infuso guaiaci quotidie datae nil leuaminis nisi nocturnorum dolorum imminutionem, attulerunt, et in qua et alia nunc facit experimenta cum arsenico, propediem publicanda. Quaerit igitur, num lacertae Amatitanae vere specifica illa virtute polleant, an vulnera iis curata vere cancrofa fuerint. Additae sunt obseruationes IO. BAPT. PALLETTAE in nosocomio Mediolanensi factae ex P. VI. Vol. VIII. opusculorum Mediolanensium. Ex quibus p. 429.

bus patet, lacertas vulgares licet vni aegro quotidie tandem viginti et quinque datae fuerint, in cancro faciei et vteri nil praestitisse, sudorem, vrinam et saliuam, non tamen in omnibus pari modo, vehementius mouisse, in pulsu autem et canali intestinorum nullam mutationem produxisse; easdem in vlceribus scrophulosis pectoris et colli, vti et oleum earum ad modum *scvlteri* paratum in illis pedis p. 430. sanandis multum valuisse. Auctor diarii sua experientia docet, lacertas in cancro et scirrho nihil, in lue venerea aliquid tantum leuaminis attulisse.

43. THOM. WHITE *tractatus de strumis vel scrophulis. Angl. script. Lond. 1784. 8.* Negat, esse haereditarias, causas earum ex abusu rerum sex non naturalium repetit, variam earum sedem exponit. ex p. 431. terne fomenta ex aqua calida, interne mercurium p. 432. dulcem, cui tamen, si infantes eo vti nolint, vnguentum mercuriale substituendum, et alia mercurialia ac saturnina externa commendat.

p. 438. 44. *Delectus opusculorum medicorum antehac in Germaniae diuersis academiis editorum, quae in auditorum commodum collegit, et cum notis hinc inde aucta recudi curauit D. IO. PETR. FRANK. med. clin. in reg.*

p. 439. *Acad. Ticin. prof. Vol. I. Ticini 1785. 8.* Continet GATTENHOFII de hypochondriasi; SCHOENMEZELII an sectio anatomica cadaueribus autochiria suspectis; WIENHOLTII de inflammationibus viscerum hypochondriacorum occultis; SCHAERLICHII de vsu opii in febribus intermittentibus, MVNCHII de belladonna efficace in rabie canina remedio, editorisque, qui in epistola addita Italos ad politiam suam medicam locupletandam inuitat, de laruis morborum biliosis commentationes.

45. *Thesaurus medicus Edinburgensis nouus, siue dissertationum in academia Edinensi ad rem medicam pertinentium ab anno 1759. ad 1785. delectus, ab illa soc.*

loc. reg. med. Edinb. habitus. T. 2. Edinb. et Lond.
 1785. 8. Primum tomum, dissertationes ab 1728.
 ad 1758. continentem GVIL. SMELLIE in 2. Voll.
 anno 1779. ediderat. Tomi huius duo volumina p. 440.
 triginta et sex complectuntur dissertationes.

46. *Cistalgia helminthica, observatio D. PANZANI*; p. 441.
 quinquagenarius doloribus in regione vesicae cen-
 tro ossis sacri respondente, cum constrictione funiculi
 spermatici et testiculi dextri, quandoque et strangu-
 ria coniunctis, ultra sex menses cruciatus, in quo per
 tres annos et diutius varios in regione renum dolo-
 res perpeffo, saepeque sabula per vrethram excer-
 nente suspicio calculi renalis enata, ideoque cathe- p. 442.
 ter non applicatus fuit, noctu statim ab omnibus
 suis malis liberatus est, excretis per vrethram vna
 cum vrina sanguinolenta vermibus duobus duos pol- p. 443.
 lices longis, in maiori sua diametro vnam lineam
 aequantibus, colore rubicundis, ex annulis circulari-
 bus tunica membranacea cuius fibrae longitudinales
 erant, mediante connexis, compositis, oculis carenti-
 bus, in extremorum acutorum vno lamella lenticulari
 cornea, et sub hac cauo rotundo, pro ore habendo, in-
 structis, adhuc viuis, quodammodo lumbricis intesti-
 norum similibus. Ab his enim forte ideo tantum p. 457.
 diuersos fuisse, quod ex pariete vesicae interiori im-
 mutabile quoddam alimentum, sanguinem nempe,
 lenticulari illa lamina mediante se affigendo et su-
 gendo acceperint. Referendos eos etiam esse ad con- p. 446.
 genitos, quippe qui ab aduentitiis, in solis intesti- p. 454.
 nis reperiundis, probe distinguendi, in corpore ani- p. 455.
 mali ex germinibus, in hoc ratione non certo cogni-
 ta illatis, calore et humiditate euoluantur. Germi-
 num vero talium extra corpus animale existentiam p. 456.
 vermium animalium cum terrestribus similitudine, p. 452.
 vti et hypotheseos de germinibus disseminatis veri-
 tatem variis in regno animali obseruatis phaenome-
 nis

- p. 450. nis, maxime vero multiplicatione eo frequentiori, quo minus gaudeant animalia organis essentialibus, v. c. oculis, cerebro, corde, genitalibus, valde comprobari. Vermes denique viarum vrinariarum, vti variis adductis obseruationibus, alias etiam vermium sedes illustrantibus patet, non frequenter quidem, non tamen adeo raro occurrere; eorum tamen diagnosis incertam, curationem fere nullam esse; a mercurio enim in vesicam iniiciendo parum esse expectandum, quum lumbrici intestinales in mercurio per biduum viui et agiles permanferint, omniaque anthelminthica ideo, quod vermes indolis animalis participes se reddant, facile oeconomiam animalem laedant.
- p. 446. p. 457. p. 459. p. 458.
- p. 498. 47. *Epistola* OMOBON. PISONI p. p. in uniu. Pad. de usu medico lacertarum (dei ramarri e partic. delle lucerte) ad D. HIER. FESTARI, et insert. diario encyclop. Vicent. Recensitis de lacertarum in scrophulis usu SCVLTETI, SAXONIAE et PREVOTII sententiis
- p. 499. narrat, se eas in cancro mammae frustra adhibuisse, easdem in femina septem iam annos syphilitica leuamen aliquod attulisse, hanc vero male obedientem obiisse, iudicatque lacertas, quarum vis ab ipsarum alcali volatili forte repetenda, in cancro noxias, ab Americanis forte non in hoc, sed in vlceribus superficialibus, a Gallis *chancres* dictis, vtilis esse repertas.
- p. 500. Addita est obseruatio FR. LVDOV. BALDINI de femina in scabie haereditaria psoriciis frustra vsa, anno aetatis vigesimo sexto, initi vero matrimonii tertio, horrenda adhuc lepra affecta; ab ea vero chronicaque scabie usu viginti et quinque lacertarum (*ramarri*) et saturati infusi dulcamarae, sero copiosum sudorem et vrinam proliciente, menstruorumque fluxum diu suppressum reuocante, tandem liberata.

II.

D. CAROLI GEORG. THEOD. KORTVM, medici Tremoniensis, commentarius de vitio scrofuloso, quique inde pendent morbis secundariis, qui nuper illustris societatis regiae medicorum, quae Parisiis est, plausum tulit. Tomus primus. Lemgouiae, MDCCLXXIX. 8. 390. pag.

Nostris temporibus quod imprimis apud Gallos Anglosque vehementer increbuit, vitium scrofulosum, a recentioribus, ad id magis attentis, quidem egregie illustratum est, multumque praestitum, tam in scrofulosorum affectuum natura declaranda, quam medela feliciori et faciliori reperiunda. Attamen nullus hactenus auctorum scrofulosi morbi eiusque specierum, utcumque valde frequentium fidelem et accuratam historiam dedit, quaeque optima de scrofularum natura, causis et curatione prostant observata, in plurimis auctorum scriptis dispersa latent: hinc sane haec colligendi, in ordinem quendam redigendi atque digerendi labor, quo optime functus est Cl. Auctor, non inutilis putandus est.

Libris, qui de scrofuloso morbo seorsim tractant, enarratis, operis sui rationem copiosiore exponit Noster, in quo conscribendo iam ante quaestionem a medicorum Parisinorum societate propositam versatus fuerat, deinde succincta morborum acutorum cum diuturnis comparatione praemissa, causas morborum chronicorum generaliores, secundum quas p. 27. in classes generaliores distribui possint morbi diuturni, proponit. Hae causae sunt 1) *debilitas*, siue potius laxitas partium solidarum, quam solam subintel-
ligit, 2) *functionum viscerum chylum praeparantium vitiosa actio*, 3) *spissitudo et tenacitas humorum vel*
Tom. XXXII. Pars IV. Qq atra-

atrabiliaria, vel pituitosa, 4) *excretiones imminutae vel suppressae*, 5) *spasmus*, 6) *humorum acrimonia*. Has quidem causas ad morborum diuturnorum origines multum conferre nemo facile negauerit, optandum tamen fuisset, vt ordines earum melius exactiusque Celmus Auctor definiuisset: sic excretiones imminutae vel suppressae causam quidem per se constituunt morborum chronicorum, natura verum sua ab aliis causis enarratis dependent, adeoque in causarum numerum inferri non merentur, quum ipsae harum causarum effectus sint.

p. 33. His omnibus praemissis prima sectione morbi notio, *variae appellationes, distinctio ab aliis, diuisiones* traduntur. Scrofulae sunt Nostro glandularum praecipue conglobatarum, indurationes et intumescitiae chronicae ex singulari lymphae systematisque lymphatici vitio pullulantes, et peculiari vt plurimum habitus externi vitio comitatae.

p. 43. Cum bronchocele scrofulae saepius confusae sunt, et causa, quae effecit, vt in ipsas scrofulas minus attenti fuerint mederi, in hac confusione sita est. Bronchocele, cuius essentia in glandulae thyroideae induratione, caeteris colli glandulis sanis, consistit, cachexiam, scrofulis iunctam, nunquam iunctam habet indeque bronchocele, siue struma proprie dicta ad tumorum, scrofulae vero ad cachexiarum classem recte referuntur. Ipse tamen tumor glandulae thyroideae etiam a materia scrofulosa produci potest. Cum tumoribus cysticis scrofulae non raro confusae sunt, neque semper a scirrhis satis distinctae. Ipsaeque haec distinctio a scirrhis satis subinde difficilis est; vterque enim morbus glandulas induratas habet: in scrofulosa tamen glandularum duritie, dyscrasia scrofulosa distinctionis characterem exhibet.

Rem hoc modo optime expediendam esse putat Noster. Struma glandulae thyroideae induratio est, sique

sique a scrofulosa acrimonia haec induratio profici-
scitur, scrofulosae strumae nomine insignienda est:
bronchoceles nomen, incongruum ad genus desi-
gnandum, soli prolapsui tunicae internae asperae
arteriaetribuendum est.

Sectio II. *scrofularum symptomata* complectitur. P. 53.
Donec immunes a tumoribus glandulae lymphaticae
externae manent, nullum scrofulosum vitium accu-
sari debet. Ipsae glandulae vero si scrofulosae
fiunt, tumores non magnos exhibent, sique mole cre-
scunt, id aut a pluribus glandulis conglutinatiss inter
se et eodem morbo affectis pendet, aut tumor falso
pro scrofulis venditus steatomatis, aut aliam naturam
habet. Parua habent lentaque initia, inde distin-
guendae a catarrhali glandularum tumore, qui in
pueris frequenter obtinet. Figuram inaequalem,
irregularem habent, indeque a peritis solo fere tactu
cognoscendae.

Sedem scrofulis omnes glandulae praebent. In p. 69.
mesenterio quidem frequentes sunt, non tamen ge-
neratim statuendum est, ubi glandulae in collo indu-
ratae apparent, ibi semper quoque mesenterium iis-
dem affectum esse: examine enim etiam curatiore
instituto in aegris, qui collum scrofulosum habent,
non raro nulla labes in imo abdomine detegitur. Si
vero morbus ad magnum gradum prouectus est, me-
senterium semper eo affectum reperitur. In pueris
quoque mesenterium frequentius a scrofulis affici so-
let, quam in adultioribus. Reliqua omnia abdominis
viscera glandulosa scrofulis patent. Cerebrum adeo
occupare scrofulosam materiam auctores pronuncia-
runt, in eoque induratione producta epilepsiam
inducere.

Sedem morbi, ut iam diximus, propriam lymphaticum systema constituit primumque semper in glandulas conglobatas decubitus facere solet venenum

scrofulosum: si vero inualuit malum, aliae quoque glandulae aliaque loca a morbo occupantur. Articulis inprimis et articulorum capsulis morbus infestus est.

p. 89.

Vt scrofulae generentur, vitium corpori inhaereat necesse est, quod lympham inspisset, glandulas obstruat. Id, cachexiae scrofulosae nomine insignitum, ex concursu plurimorum symptomatum cognoscitur. Sunt autem haec symptomata vel effectus vitii scrofulosi, corpori iam inhaerentis, vel consistunt in qualitatibus quibusdam corporis, quae indicant, id ad scrofulas concipiendas primum esse. Ad priores pertinet collum breue, frons curta et angusta, tempora pressa, amplae largaeque maxillae, caput grande, color faciei amoene roseus, facies inflata paululum et quasi oedematosa, labium, praesertim superius, tumidum, tumore ad inferiorem septi et alarum narium partem extenso, mucus e naribus copiose profluens eas erodens, oculi magni, splendentes, pulchri, si ophthalmia nondum affecti sunt, lacrymosi contra et suo nitore orbat, circulo liuido circumdati, si scrofulae mesenterium occupant; pupilla dilatata, quae probat vitium sedem suam in abdomine potissimum habere; abdomen tumidum, tensum atque durum, duritie inaequali viscerum scrofulosa saepe per tactum cognoscenda; extremitatum macies, extenuatio; pectoris ariditas; vegeta mens, viuendum ingenium, iudicium firmum; ciborum, praesertim farinaceorum, crassorum, solidiorum desiderium, digestio debilitata, salivae copiosior ad os affluxus.

p. 115.

Sequuntur, ob acrimoniam lymphae inhaerentem, defluxiones, erosiones, exulcerationes, ophthalmiae, aurium fluxus, morbi cutanei varii, gingivae in montium incolis contrahuntur et indurescunt; dentes in scrofulis mesentericis, vel rhachitidi adiunctis vitian-

vitiantur; constitutio debilis et laxa, respiratio difficilis fit, pulsus parvus et mollis deprehenditur, cupiditasque ad venerem, ad contrectandas naturales partes nascitur praematura.

Formae autem, sub quibus scrofulae incedunt, p. 120. duae sunt. Prima, scrofulam proprie dictam constituens, distinguitur plena facie, colorata, oculis magnis, viuidis, pupilla ampliata, laxo corporis habitu, corpore pleno, cute glabra, intellectu et iudicio valentioribus, abdomine vix valde turgente, labii superioris tumore, glandulis externis tumidis, ad inflammationem, supurationem pronis. Haec forma Nothro ea est, qua scrofulosum venenum summam suam maturitatem acquisivit, qua in pueros per haereditatem propagari valet. Altera forma, quam scrofulam mesentericam Cl. Auctor dicit, haec est: habitus cachecticus est, tumidulus, oculi languidi, tristis animus, seria amans. Colli glandulae parum tument, et si tument, frigidus, vix ad inflammationes pronus tumor est. Venter contra plurimum tumet, pectore et articulis emaciatis. In atrophiam et tabem mesentericam transitus facilis est. Vtraque forma ab eodem veneno pendet, corpora locaque diuersa occupante. In mesenterica tamen materies ad internas glandulas magis defixa haeret, et cachexiae scrofulosae signa minus clara sunt.

Permultos pueros, inprimis quos aut capitis tinea vexat, aut qui ad eam prони sunt, non raro quoque qui caput mundum habent, a leuioribus diaetae vitiis, occupat tumor glandularum colli, submaxillarium (parotidis quoque) facile iterum disparens et non raro tinea copiosiore capitis solui solitus. Hos tumores Cl. Auctor ad scrofularum spuriarum genus refert et ab eadem materia, quae scrofulas producit, sed minus perfecta, deriuat, quod quidem subinde non vero semper locum habere putamus: saepissime

enim hi tumores, a solo lymphae difficiliore motu nati, euanescent, absque vlllo cachexiae scrofulosae signo, et absque vlla scrofulosa aegritudine sequentibus. Eodem plane modo pueros non raro morbus glandulosus parotidum et glandularum submaxillarium occupat, non scrofulosus, quem praeter BURSERIVM DE KANILFELD nemo recentiorum descripsit. Saxones *den Ziegenpeter* vocant.

p. 173. Febris, quae scrofulas comitatur, catarrhalis subinde est, a glandularum vero inflammatione inflammatoria, a suppuratione suppuratoria. Si malum multum progressum est et cacochymia scrofulosa totum corpus occupat, febris hectica scrofulosa nascitur.

p. 148. Gradus, quos morbus percurrere consuevit, hi sunt: Si lymphaticae quaedam glandulae ad latera colli, pone aures, caet. pueris intumescunt, mobiles, molles, non tumentes, cum dispositionis scrofulosae signis, primus morbi gradus est. Si tumidae colli glandulae numerosiores, concatenatae fiunt et mole ac duritie augentur, alter gradus est. In hoc abdomen laborare incipit et habitus scrofulosus manifestus est. Tertius gradus est, si irritamentum scrofulosum in actum citatur, dolentibus tumoribus, inflammatis atque exulceratis. Inflammatorio quodam statu vniversum lymphaticum systema laborare videtur: febricula corpus detinet. Quartus est, si ossa exulcerantur, si cancri scrofulosi nascuntur caet.

Dissipantur scrofulae, solidis corporis partibus maiorem vim pubertatis tempore acquirentibus: si vero malum diu partibus inhaesit, sensim acrius factum solida irritat, inflammat, exulcerat. Si inflammari incipiunt scrofulae, aegri leues puncturas in interioribus tumorum partibus sentiunt: tumores grandiores mox facti superficiei fortius adhaerescunt, rubent

rubent inflammanturque cum dolore exiguo. Pus mox in ichorem conuertitur: hinc ulcerum difficilis sanatio, tumoris imperfecta liquatio. Foeda ulcera, si consolidantur, foedas cicatrices relinquunt. Partes inflammatae non raro gangraenescunt.

Quoad vitae periodum, quam occupant, scrofulae p. 163. medias tenent inter infantum ac puerorum morbos. Connatarum scrofularum exempla, si vnquam extiterunt, rarissima sunt. Scrofulae post annum vitae xli ortae quoque valde rarae sunt. Feminarum corpora crebrius, quam virorum occupant, quoniam laxiora, delicatiora, tumoribus pleniora sunt. In feminarum corpore post menstruam purgationem superatam scrofularum venenum demum esse euolutum subinde obseruatum est. Caeterum idem morbus porcis, equis, simiis, leonibus frequens est. (frequentissimus est canum generi, inprimis canibus minoribus, delicatulis. Nec multi ex canium venaticorum genere ab hoc morbo immunes reperiuntur.)

Sectione III. de scrofularum indole et causis agit. p. 173. Causam propiorem scrofularum alii hanc, alii illam accusarunt. Lymphae vitium in scrofulis manifeste adest, idque in tenacitate illius nimia et acrimonia consistit. Docet acrimoniam hanc adesse tumorum in initio frigidorum sensim nascens inflammatio, ulceratio maligna, acres destillationes, morbi cutanei, ossium. Stagnatio lymphae diuturna in carnis glandularum huic acrimoniae fauere inprimis videtur. Porro in scrofulis adest colluies lymphatica, solidarum partium debilitas laxitasque, partium solidarum vniuersi corporis, praecipue systematis lymphatici, atonia.

Rationes, quibus ducti medici vitium scrofulosum pro syphilidis sobole habuere, nunc copiose exponuntur. Existere multam inter vitium hoc et syphilidem analogiam non negatur: neque negari

potest ex Nostri mente, pueros venereis parentibus progenitos scrofulosis affectibus frequenter infestari. Medendi etiam methodus utrique morbo fere eadem coniecturae de originibus non dissimilibus non repugnat. Sed scrofulae morbis venereis longe antiquiores sunt et HIPPOCRATI iam notae, quibusdam ex Latino-barbaris notissimae fuerunt, et ubi etiam antiquitatem scrofularum inde quis suspectam reddere velit, quod cum rhachitide plurimam similitudinem habeant, haec vero ipsa adeo venerea lue recentior sit, inde dubia scrofularum antiquitas sane reddi non potest. Forte constitutio recens exorta scrofulosum morbum, adiuncta ei, ita mutavit, ut aliam formam nactus etiam alia symptomata eoque modo rhachitidem, novum morbum, exhibuerit. Probat etiam morbum scrofulosum a venereo diuersum esse, quod hic ditiores, voluptatibus omnibus deditos, occupet, ille vero pauperes, sordidos, malo victu vtentes.

Alii acidum lympham coagulans accusarunt. Et p. 203 sane causae praegressae permultae, quae scrofularum originibus admodum fauent, multaque in ipsius morbi decursu praesentia phaenomena tale acidum subesse suadent, inprimis rhachiticus morbus, scrofuloso persimilis, in quo acidi vestigia manifesta sunt. Glutinosum quoque, quod in lymphâ scrofulosorum, praepollet, acido habitaculum dare commodum potest. Verum si etiam acidi praesentia in scrofulosis morbis negari nequit, hoc tamen acidum scrofulas non proxime inducit, requiritur enim ad eas systematis lymphatici particularis quaedam diathesis, vix non semper ex haereditate mala, cui fere constanter colluies acido-viscida in pueris iungi solet.

Miasma morbosum quum denotet materiam morbidam, quae in aliis subiectis sui similem morbum producere valeat, neque generari possit, nisi ex sui generis morbo, hoc sensu difficile est statuere peculiare

liare scrofulosum miasma: si vero materias morbidas, quae specificae indolis sunt et in aliis subiectis morbum sui similem procreare valent, saepe tamen absque contagio in corpore ipso generari possunt, miasmata vocamus, hoc sane sensu scrofulas suum miasma habere certum est. Contagiosas esse scrofulas negarunt alii, alii affirmarunt: esse vero certis sub conditionibus contagiosas certum est. Insitione quidem materie ex ulcere scrofuloso in sanum corpus propagata scrofulae productae non sunt, ipseque Cl. Auctor hanc insitionem absque ullo effectu tentavit; verum si summam suam vim nacta est materia et ad summum gradum suum quasi exaltata, utique morbum sui generis in aliis producere valet. Quod vero quum alii quoque morbi faciant, firmior conclusio est, requiri ad scrofulas peculiarem systematis lymphatici dispositionem, quae peculiarem humorum discrasiam, cacochymiam, acrimoniam inducat.

Multiplicis indolis scrofulas esse quidam statuerunt: hinc curiose inuestigat Noster, num vere senserint. Recte monet, hos auctores humorum statum tantum respexisse morboque causas diuersas propiores dedisse, cum diuerso modo alteratos humores in morbo esse conspicerent: specificum vero characterem scrofulosi morbi a solidorum constitutione repetendum scrofulasque vnus indolis tantum statuentes esse, distinguendas a spuriiis, quae in fugituo glandularum tumore consistant, et a complicatis, in quibus, ob aliorum morborum concursum, ipse morbus varia forma incedat. p. 221.

Scrofularum nunc variae diuisiones enarrantur. p. 235.
Optime Noster scrofulas in veras et spurias, seu symptomáticas diuidit. Spuriae duplicis generis sunt: aut enim scrofulosum vitium cum alia quacunque morbosa causa complicatum est, aut aliae causae, absque ullo vitii scrofulosi vestigio, tumores glandu-

larum scrofulosis similes inducunt. Priores sub scrofularum complicatarum nomine comprehenduntur commode: posteriores nomen scrofularum non merentur.

Phaenomena quidem ostendunt, plurimam similitudinem inter rhachitidem et scrofulas intercedere, attamen in eo rhachitis a scrofulis constanter differt, quod illa ossa emolliat atque iuniorem aetatem, a sexto mense usque ad alterum aetatis annum, affligat. Hinc causa proxima utriusque morbi etiam aliquo modo discrepet necesse est. Achores, crusta lactea repressa, scrofulas non raro excitat: iidem morbi, si scrofulosis superueniunt, scrofulas non raro solvunt. Multa alia phaenomena docent his morbis omnibus causam esse proximam fere eandem, quae tantum per particulares circumstantias determinetur, ut has morborum non species natura diuersas, sed varietates constituat.

p. 246. Scrofulosis corporibus variolae non vehementer inimicae sunt, plurimi potius scrofulosi variolas, maligna etiam existente epidemia, optime superant. Frigidum forsan laxumque corpus scrofulosum vix ad graues a miasmate varioloso febres concipiendas idoneum est, neque virus variolosum valde multiplicare valet. Caeterum observationem notatu dignissimam memorat Cl. Auctor hac occasione, ubi de veneni variolosi cum scrofulis coniunctione tractat, nempe constare exemplis omnibus, phthisi spontanea non occupari hos, quorum faciem variolae, foueis in iis relictis profundioribus, foedauerant, sed hos tantum, quibus benigniores variolae cutem illibatam reliquerant. Ex hac observatione autumat effici, per variolas maligniores aliquid in pulmonibus, quod futuram ad phthisin dispositionem praefocet, fieri, forsan superficialem suppurationem, quae materiam phthisicos generationi olim idoneam exsoluat atque
exter-

exterminet. Hisque praemissis per exempla probat, artificiales variolas cutem quidem ut plurimum non laedere, verum non raro vitium internum in pulmonibus prouocare, quod inualefcens sensim pulmones iis corrumpat, quorum faciem variolae non dehoneftauerant. Inprimis si scrofulosis arte variolae inferuntur, metus non vanus est, ne scrofulosa dispositio magis euoluatur, pulmonibus olim infensa. Hinc forsan ratio elucet, cur in populosis vrbibus, in quibus inoculatio ex longo tempore in vfu fuit, mortalitas ne hilum quidem fuerit imminuta.

Scrofulosus morbus saepissime post variolas obseruatur et quidem non morbo mox superato, sed tempore aliquo interposito, et nunquam fere, nisi in pueris, qui scrofulosa cachexia iam antea laborauerant, ad quam euoluendam et in actum maiorem concitandam febris variolosa contulerat.

Scrofulosis his expositis, et alii glandularum tumores enarrantur, qui febre morbillosa, scarlatina, acutis febribus aliis atque intermittentibus, nec non catarrhalibus morbis superuenire solent, deinde glandularum tumores a causa sanguinea, metastasi lactis, abundantia lymphae. A mensibus suppressis aequae ac cessantibus glandularum tumores obseruati sunt: generatim scrofulosa cachexia decedit, si menses fluere incipiunt, augetur vero, si fluor mensium aut emanet, aut intercipitur. Grauidis non raro glandulae intumescunt, nec non iis, qui haemorrhoides suppressas habent. Lac, quod exitum molitur, mammas glandulasque alias non raro turgescit. Si semen secerni incipit, non raro quoque glandularum tumores ingruunt.

Veneri glandularum tumores pendent aut a sy. p. 269. philide cum scrofuloso morbo complicata, aut a scrofulis cum venerea labe complicatis, aut ab irritatione veneri veneni tumores in glandulis inducente.

Arthri-

Arthritica materies non raro glandularum tumores facit. Idem post rheumatismos, in plica Polonica, albo fluore, morbis cutaneis, lepra, elephantiasi deprehendi solent. In phthisi laborantibus interdum scrofulosa materies, quae pulmones occupauerat, exteriora cum salute aegri petit. Suppressa dysenteria, suppressi pedum sudores, suppressae excretiones quaecunque aliae glandularum tumorem pariunt. Hic vero auctorem a scopo suo aberrasse et non tantum scrofulosos, sed alios quoque glandularum tumores, scrofularum spuriarum nomine ab eo insignitos, enarrasse, facile apparet.

p. 279. Aetas puerilis, temperamentum humidum, phlegmaticum, corporis constitutio infirma, debilis, dispositionem ad scrofulas faciunt. Quo debiliores pueri sunt, eo magis scrofulis obnoxii sunt, siue connata fuerit debilitas, siue ex praegresso morbo, diaeta caet. nata. Haereditaria quoque dispositio ad scrofulas producendas multum valet, darique hanc ad scrofulas dispositionem, innumera exempla docent. Sed etsi copiosissimae scrofulae per haereditatem nascuntur, tamen et, praeter eam, a suis causis nasci solent, indeque pauperibus et fordido vitae genere utentibus frequentissimae sunt. Scrofulae tamen, quas supra descripsimus, proprie dictae, fere semper haereditariae sunt, scrofulae e contra mesentericae in pauperibus frequenter occurrunt a suis causis natae.

p. 294. Ad disponentes porro scrofularum causas pertinet aetas parentum iuuenilis, labes parentum venerea, parentes valetudinarii, exhausti, imbecilles, lac in aegro corpore praeparatum caet. Ingesta in procatarteticis causis attentionem merentur plurimam: in iis enim princeps scrofularum causa sita est. Farinacea non fermentata, eadem si per fermentationem acorem quendam nata sunt, alimenta glutinosa, solani

lani tuberosi radices crebro ingestae, butyracea, leguminosa, verbo omnia, quae chylum viscidum, sub-acidae naturae, difficulter mobilem, acrem generare possunt, scrofulis etiam generandis idonea sunt. Purgantium, absorbentium, adstringentium medicamentorum abusus, venena, praesertim saturnina et stiptica alia eundem morbum ingenerant. Aër impurus, paludosus, moleculis putridis, relaxantibus remixtus, frigidus humidusque simul, aër tuguriorum et omnia generatim, quae ad immunditiam referri possunt, inter innumeras fere alias causas, quae copiose et cum plurima doctrina exponuntur, in scrofulis producendis validissime agunt.

Sectio IV. *prognosin scrofularum* exhibet. Primum p. 337. probatur, *morbum scrofulosum non leuem, sed grauem et periculosum saepe esse.* Periculi maxima pars ab aegritudinum secundariarum agmine pendet, quod a scrofulis inducitur. Eaeque oriuntur vel vitio scrofuloso has illasue partes corporis, inprimis nobiliora viscera occupante, vel a tumoribus solo mechanico effectū, pressione, situ, mole, copia humorum motum et partium functionem perturbantibus. Hinc nullum chronicorum morborum genus existit, quod non aliquando a scrofulis inductum fuisse obseruatum fuerit.

Prognosis a magnitudine, vehementia, sede, diverso statu, duratione tumorum repetenda est. Diu et per totam vitam gestari possunt, si blandam naturam habent. Maiores et quae multas corporis partes, inprimis nobiliores obsident, aegrius curantur: si cystici tumores simul adsunt, iam adoleuisse malum cogitandum est. Si mesenterium simul afficitur, semper malum: pessimum vero, si in scrofula proprie dicta mesenterium afficitur, quoniam mesenterium facillime suppuratur.

P. 359. Partis secundae sectio prima *generalia circa scrofularum medelam, nec non de cura scrofularum praeparatoria* praecepta continet. Difficilem scrofularum curationem esse, plurima medicamenta ad eas incassum esse tentata, et raro euentum curationis expectationi respondere, omnes adserunt. Causas huius difficultatis nunc enarrat Noster. Et primum quidem notat scrofulas, quae difficillimae sunt curatu, ex vitio corporis per haereditatem translato proficisci: deinde morbum scrofulosum sua habere initia, progressum, coctionem, crises, finem monet, neque licere morbum in ipso suo decursu intercipere, sed expectare, donec ipse sat coctus sit. Id quoque diuturnitatem auget, quod spe sanationis medentes saepe decipiat, glandulaeque, quae resolutae videbantur, mox iterum intumescant. Specifica praeterea ad hunc morbum medicina deest, neque facile dabitur, quum non acrimoniam tantum corrigere, verum etiam solidorum statum et lymphaticum systema mutare debeat. — Ipsa vis vitalis medicamento- rum vsum in hoc morbo non adiuuat, quoniam debilitata est: secundarii scrofularum effectus primariis saepe perniciosiores sunt et curatu difficiliores, et hae difficiles curationes in pueris peragendaesunt, qui medicamenta vix lubenter sumunt et protractum eorum vsum vix tolerant.

P. 373. Medicinis variis expositis superstitiosis, quae ad scrofulosas affectiones commendatae sunt, inprimis autem famosa strumarum curatione per tactum, olim ab Angliae et Galliae regibus peragi solita, *indicationes in cura scrofulosorum* obseruandae traduntur. Hae sequentes sunt: 1) causae materiales, quae lympham spissarunt, morbique euolutionem promouerunt, tollendae sunt; 2) spissa, coagulata, infarcta soluenda sunt; 3) acrimonia humoribus, praesertim lymphae inhaerens, corrigenda est; 4) ro-

4) roborantibus corpori atque systemati lymphatico prospiciendum est.

Prima indicatio maxime per euacuantia medicamenta perficitur, repetenda quoque, si opus est, per anthelminthica, si vermes adsunt, per antacida, si acidum peccat, per venaesecutionem, si, quod raro obtinet, plethora adest, aut si dispositio inflammatoria vrget. Reliquis indicationibus praeclare satisfaciunt resolutentia roborantibus nupta, hac tamen cum cautione, vt, si fortius obstructions vrgent, deobstruentia inprimis adhibeantur. Si colli tumores soli atque solitarii resistant, spongia vsta iuuat. Acidum semper alcalina postulat. Stadiorum diligens in curatione obseruatio necessaria est: reprimere vero tumores ad curationem nunquam conuenit.

III.

Beytraege zur ausübenden Arzneywissenschaft, von D. LEBERECHE FRIEDRICH BENIAMIN LENTIN, Königl. und Churfürstl. Hofmedicus und Stadtphysikus zu Lüneburg. Leipzig. 1789. 8. 416 pagg.

i. e.

Symbolae ad medicinam practicam.

Alteram hoc titulo exhibet Clnus et inter practicos in Germania medicos aestimatissimus Auctor editionem libri, qui anno MDCCLXXXIII. in eruditorum bibliopolio titulo: *Beobachtungen der epidemischen und einiger sporadischen Krankheiten am Oberharze* *) prodierat, et longe quidem auctiorem, multas enim morborum historias multaque obseruata alia addidit medicis scitu vtilia partim, partim iucunda.

Capi-

*) *ibid.* Comment. nostr. Tom. XXVI. Part. III. p. 417.

p. 163. Capiti de hydrope, quod prior editio iam continebat, *observationes circa accuratiorem hydropis diiudicationem* additae sunt. Primum per exempla probatur, hydropem oriri sui generis, si urinae secretio intercepta est. Cuticula, hoc hydrope anasarca vrinoso persistente, in vesiculas eleuatur, solaque diuretica methodo adhibita morbus curatur. — Dolores aegri in musculis et tendinibus si sentiunt, bonum est. Dolor enim a vi vitali pendet, quam fibrae sensim recuperant. In aegri cadauere post hydropem asciten mortui, euacuatis breui ante mortem aquis omnibus, abdomen iam ante mortem enormiter iterum tumidum et post mortem incisum aquas nullas emisit. Omentum aquis summopere dilatatum, intestina inter se et cum mesenterio in informem massam coalita, glandulas induratas, sanguinem dissolutum, lymphaticos humores coagulatos, cadauer exhibuit.

p. 186. Grauidarum hydrops, post puerperium demum sanabilis, hoc peculiare habet, vt post puerperium lac aquis effusis misceatur. Tumor hinc crurum albidus est. Causam habet perspirationem suppressam, qua aucta hydrops ipse certe cauetur.

p. 193. *Morborum annis MDCCCLXXXIV, V, VI et VII. Lüneburgi obseruatorum historia.* Toto anno MDCCCLXXXIV morbi putridi grassabantur, variolaeque intercurrerant epidemicae, ob putredinem ipsis adiunctam summe mortiferae. Hieme anni sequentis constitutio in biliosam et inflammatoriam mutata est.

Scarlatina febris, quae hyeme anni MDCCCLXXXVI grassabatur, primis epidemiae temporibus iam initio morbi anginam adiunctam habebat, procedente hac fauces minus adfectae erant. Febris morbo adiuncta ad gastricas pertinebat leuabaturque emetica et purgantibus medicinis datis. Tumorem cutis leuco-

leucophlegmaticum balnea tepida, febre superata adhibita, optime praecauerunt.

Cardialgia frequens Luneburgensium morbus, p. 214. ut plurimum ab acido in ventriculo haerente, a nimia illius sensibilitate, a nervosis papillis denudatis oriunda, et a metastasi materiarum morbidarum praesertim rheumaticae et arthriticae, pendet. Curatio huius morbi non procedit, nisi diaeta studiose observata, inprimis si acidum in ventriculo haeret, ubi cibi ex mucilaginosorum genere, tenerae carnes oleraque tenera optime conveniunt. Pulvis ex sulphuris lacte et magnesia calcinata, interposita medicina ex quassiae tinctura cum vino Maluatico parata, tincturae tartari mixta, optime convenit. Si ventriculi interior superficies muco eam obducenti caret, mucilaginosa cum regimine perspirationem promovente conveniunt. Butyrum cacao, recens expressum, ad drachmae pondus bis vel ter per diem datum, interposita, ad acidum corrigendum, salis tartari solutione, optime convenit. Si vero fibrae ventriculi naturali suo muco destitutae sensim occallescent, in cicutae usu unicum praesidium est.

Rheumatica materia causam cardialgiae frequentissimam constituens depellitur, irritamento in locis a rheumatismo antea vexatis excitato dataque medicina ex aconiti extracto, sulphuris lacte et magnesia calcinata: si vero malum magis inueteratum est, ex mercurio dulci cum camphora. Arthritica materies, quae ad ventriculum decubuit, variis medicinis, ex discutientium, resolventium et antispasmodicarum classe depellenda est. Sudores pedum habituales suppressi capitis et pectoris non raro acutos morbos crebro, et cardialgiam subinde inducentes, reuocantur adplicatis praeter pedum balnea, panno cerato viridi atque pedibus in vesicas urinarias bouillas immisissis, adhibito simul regimine diaphoretico. Scabiei

et herpetum acrimonia cardialgiam etiam non raro parit.

p. 236. Paedarthrocacen Noster saepe vidit, in digitis praesertim. Abscessus, tumore diuturno praegresso sensim natus, saniem subrubram, intermixtis ossium particulis, demittit, non curandus, nisi regimen exactum obseruetur. Scabies, quae puero hoc morbo vexato superuenerat, cariem feliciter depulit. Scabiei insitionem hinc hoc morbo affectis Noster suadet, tandemque monet salis communis acidum ad scabiem inueteratam et herpetem magis valere, quam vitrioli spiritum.

p. 240. De aphthis puerorum commentationem suam, quam praemio proxime accessisse iudicauerat medicorum societas Parisina, Celmus Auctor in hoc libro publici iuris fecit. Nascuntur aphthae in pueris ab aëre impuro et exhalationibus variis contaminato, euacuantium usu neglecto, balneis praesertim atque oris expurgatione neglectis, lacteque coagulato in ore haerente idque acrimonia sua afficiente. Contagiosae sunt, propaganturque, si pueri vbera sugunt, ex quibus aphthis affecti antea alimentum suum acceperant. Causa vero, quae efficit, ut aphthae nascantur, perspiratio intercepta est, quae in oris cauum hiantia vasa exhalantia petit, haec erodit, cuticulam in vesiculas eleuat papulasque format, quae peculiare aphtharum nomen acceperunt. Meconium non expurgatum aliam aphtharum causam constituit.

p. 249. Prophylaxin efficacissimam contra hunc morbum haec methodus praestat: cutis recens natorum diligenter a sordibus purganda est: quo facto medicamentum sordes per superiora et inferiora expurgans dandum est, quod ex syrapi de manna tribus partibus et syrapi de iacea parte componitur. Os diligenter aqua cum vino, aut aceto remixta abstergendum et summa mundities obseruanda est. Benignarum

gnarum aphtharum curatio his absoluitur: sani ab aegris segregandi sunt. Vbi vero prima aphtharum vestigia apparent, corporis superficies aliusque diligenter expurgandae sunt. Ori interno ope penicilli applicandum est medicamentum, quod ex succi semperuiui maioris drachmis duabus, aquae plantaginis vnciiis duabus et boracis Venetae scrupulo componitur. Idque, specifici instar, non finit, vt morbus ingrauescat, sed absoluto suo per nouem dies decursu, sponte et absque periculo cum alui profluuiio desinat, cuius vis et acrimonia inuoluentibus cum abstergentibus et roborantibus medicamentis remixtis temperanda est. Ad renes simul humores crebrius ducendi sunt, medicina externe adhibita, quae ex oleo terebinthinae et vitello ouorum paratur. Nutricum lac aqua calcis viuae quotidie ad vncias quatuor hausta optime corrigitur.

Aphthae, quae per febrem remittentem praegressam fiunt febremque sic dictam aphthosam efficiunt, febrem nec imperfecte iudicant, nec periculum minuunt, adeoque signum ominosi status humorum exhibent. Post euacuationes institutas intestinalis tubi, boracis et antiscorbuticorum leniorum vsus plurimum praestat. Si nigrae papulae sunt putridaeque, aeger moritur.

De spina dorsalis incuruatione et gibberositate. p. 259.
Vterque morbus sanabilis est, si in ipsis suis initiis cognoscitur. Causae vtriusque morbi sunt, quae carnes ossaque mollia, tenera reddunt: deinde quae efficiunt, vt pueri semper in eadem corporis positura permaneant. Spinae dorsalis incuruationem optime curant situs corporis crebro mutatus. Multum etiam iuuat corpus saepe suspensum habere eoque modo efficere sensim, vt recta spina euadat.

Gibberositatem futuram eminentia leuior, doloris expers atque inflammationis in dorsali spina in-

Rr a

dicat.

dicat. Cadauer gibberosi Clmus Auctor infecuit. Lumbares vertebrae longe crassiores, quam in naturali statu, periosteum ab osse ipso fere separatum, aqua maceratum, reliquae lumborum vertebrae, cum spinali medulla corruptae erant. Ultima dorsalis vertebra sana erat, non tamen primae vertebrae lumbari incumbens, sed cum his vertebris angulum valde acutum efficiens. Paralysis inferiorum articulorum, qua gibbi crebro tentantur, cardialgia, intestinorum dolores a pressione spinalis medullae repetendi sunt. Mitigantur haec symptomata, aquarum colluie ex his partibus per fonticulos, magis vero per profundam inustionem, quam eum in finem suafit POUTEAU, Vir quondam Clmus, expurgata, ipsaeque vertebrae, loco suo motae, exhaustis aquis non raro in debitum situm rediguntur. Eadem inustione satis profunda atque repetita fungum articulorum Noster sanauit.

p. 275. *De cancro faciei et narium.* Methodus BERNARDI (pulvis vlceri imponitur paratus ex combustis calceorum soleis et arsenico, deinde ad separationem marginum callosorum et ad vlcus expurgandum vnguentum adhibetur, cui arsenicum immixtum est, cancerum in facie bis sanauit.

p. 277. Virgo tumorem praegrandem in vniuerso sinistro pectore habebat, post indurationem, quam in vltimae verae costae regione primum perceperat, sensim natum. Causam ignorabat, clauiculam tantum illi, prius quam indurationem percepisset, post vim externam quandam illatam, leuiter doluisse aiebat. Curatio steatomatis nulla possibilis erat aegraque tabe confecta interiit. Inciso cadauere tumor massam, sanguine florido remixtam, cerebrum mollitie referentem exhibuit. Sanguinis fontes sub clauicula esse mox perspectum est, qua caute a scapula sternoque separata causa tumoris ipsius apparuit, vena scilicet sub-

subclauia ipso loco, quo chyliferus ductus ipsi inferitur, scissa, chylum cum sanguine in cellulofam pectoris telam demiserat.

Angina polypofa ex respiratione, inprimis ex tus- p. 301.
fis singulari sonitu non difficulter a medico cognoscenda, primo tantum morbi die sanari patiens, si vlla plethorae indicia adsunt, hirudinibus loco ipsi applicandis, deinde medicamentis sanguinis et lymphae coagula resoluentibus curanda est. Vesicatorium inter scapulas positum, vnguentum ad scabiem WERLHOFII partibus affectis ipsis inductum, radix senegae cum gummi ammoniaco, squilla, caet. interne data, sternutatioque, ad pituitam solutam ex aspera arteria et larynge excutiendam optime conveniunt.

De cura puerperarum et morbis quibusdam, quibus p. 309.
puerperae affici consueverunt. Commodum grauidarum regimen ad partum et puerperium feliciter superandum inprimis necessarium est. Aluus ante partum et post eum laxa, saltim sublaxa esse debet: febris enim puerperarum fomitem suum fere semper in mesenterio atque intestinali tubo, nunquam vero in ipso vtero habet, hinc praecauetur data, si debita indicationes adsunt, leni emetica, aut purgante medicina. Hinc etiam multum ad bonam valetudinem confert aluum puerperis laxam seruare.

De fonticulorum ad phthisin pulmonalem sanan- p. 328.
dam usu. Multas historias Celmus Auctor copiose enarrat, quibus probari potest, admodum conuenire phthisicis pulmonum suppuratione laborantibus purulentam materiam per fonticulos, seu, quod praestat, setacea in ipso pectoris dolente loco posita, ad exteriora deducere.

De faciei dolore. Nulla haecenus contra dirum p. 334.
hunc morbum certa medicina detecta est. Electuarium ex foliorum cicutae puluere cum melle para-

tum et in initio curationis ad mentem FOTHERGILLII magnis dosibus datum, inter alias medicinas efficacissimum se praestitit. Alium aegrum, quem dolor summopere exercuerat, incassum adhibitis medicamentis efficacissimis, cicuta etiam, sulphur antimonii auratum liquidum Clmi HERMBSTAEDT cum tinctura fuliginis datum constanter leuauit. Alii a fonticulis plurimum leuaminis experti sunt.

De materia arthritica ad vesicam urinariam aberrante historiae tres.

Novi ventilatoris descriptio. Morbi ab aëre corrupto oriundi, in orphanotropheo Clausthaliensi frequentes, mouerunt Nostrium, vt aërem in communi orphanorum conclauī studiosius renouari curaret. Idque effecit, aëre impuro per amplam fistulam, in inferiore parte ampliorem, magisque patulam, excepto atque in caminum deriuato. Optime scopo respondit fistula morbique puerorum longe rariores euasere. — Halitus cloacarum acetum vini, sed copiosius, quam IANINVS voluit, in illos infusum, optime correxit.

Historia virginis rusticae, quae corpus suum absque vlla causa pessime mutilari curauerat. Primum, matre suadente, dolorem in sinistra mamma, cancrumque occultum simulauit. Quumque mammam, dolore excepto, quem internas partes lacerare perhibebat, sensus plane expertem esse diceret, chirurgi, precibus eius moti, eam resciderunt. Alteram deinde mammam, quam eodem modo affectam esse simulauerat, chirurgus, pariter rescidit, eaque mamma sanissima pariter fuit. Vtrumque vulnus facile coaluit. Deinde manus dextrae dolorem et digitorum rigorem simulauit, flagitauitque, vt manus sibi rescinderetur. Verum diutius magistratus has querelas non tulit: ergastulo commissae libertas manus, poenae metu, mox restituta est.

Quibus

Quibus praemissis nota iam ex aliis libris famosa p. 365.
castrationis historia, quam celeberrimus chirurgus
Berolinensis in aegro absque vlla necessitate, aegro
tamen illam, mercede cccc imperialium promissa,
atque peracta operatione data, instituerat, fusius illu-
stratur. Mercator, post crebras manuſtuprationes
feminisque spontaneas profusiones in benignam go-
norrhoeam incidit, eamque ratus ipsi fore mortife-
ram, nisi testiculi rescinderentur, Berolinum primum,
deinde mutata mente, Parisios petiit, chirurgum
quaesiturus, qui testiculos ipsi rescinderet. Sed no-
lentibus chirurgis Parisinis Berolinum repetiit, ibique
operationem, administrante eam B. . . subiit. Vxo-
rem deinde, quam putabat viros magis amare, quam
se, expertem virilitatis, male tractauit, ideoque facto
diuortio carceri traditus est.

Mentis morbi diuturni historia. Inciso cadauere p. 406.
anterior pars lobii cerebri sinistri os satis magnum
durumque continere obseruabatur.

IV.

SIM. HERZ, M. D. obseruationes de febribus ner-
uosis. Berolini. 1789. 8. 164 pag.

Primum Cl. Auctor, qui medicinam Primislauiae,
Vcero-Marchiae metropoli, exercet, *obseruata*
quaedam ad similitudinem neruosa febris cum maligna
ſpectantia exhibet. Recte statim monet, typhum
HIPPOCRATIS cum febribus neruosis recentiorum
non conuenire, sed morbum esse ad putridarum fe-
brium classem referendum: minus recte vero statuit;
omnia, quae de malignitate in febribus passim edixit
HIPPOCRATES, cum symptomatibus febrium ner-
vosarum ex omni parte conuenire. Verum quidem
est, HIPPOCRATIS malignitatem nec in putrida fe-
brium indole, nec in biliosa colluuie, nec in phlogi-

stica diathesi sitam esse, hanc tamen HIPPOCRATEM febrem dixisse tantum malignam, cuius ratio in systemate nervoso latet, vix putamus. HIPPOCRATES enim symptomata acutarum periculosa omnia maligna dicit, adeoque malignitatem ceu accessorium quoddam considerat, quod in omnes febrium ordines speciesque cadere possit, febrem malignam talem, qualem recentiores statuerunt, phrenitide et pestilentia fere solis exceptis, vix statuit. Et de his morbis dubitare adhuc licet, quin eis malignitatem originariam adscripserit. His praemissis Celmus auctor paraphrenitidem veterum cum febre lenta nervosa recentiorum vnum morbi genus constituere adserit. Symptomata non curat: haec enim diligentius si curasset, si ex veterum monumentis paraphrenitidis historiam plenam atque perfectam confecisset eamque cum lentae nervosae contulisset, facile perspexisset, plurimum vtrumque morborum genus differre, paraphrenitidemque causam circa praecordia sitam ut plurimum agnoscere, quam adeo phrenitidi non deesse BRENDelius, vir quondam summus, docuit. Nervorum affectionem neque in phrenitide, neque in paraphrenitide negamus; hanc vero affectionem aut a vitiis in praecordiis produci, aut vitia in praecordiis sita producere, adeoque hos morbos ad nervosas febres exacte referendos non esse statuimus.

p. 25. His omnibus praemissis nervosae febris symptomata et quorundam auctorum de eius causis sententiae proponuntur. Ex nostra sententia statum nervosum et debilitatem febrilem ceu symptomata, quae omnibus febribus accedere possunt, considerare debuisset, quod etiam STOLLIVS in immortalis aphorismorum opere fecerat: ipse vero malignitatem primariam statuens febriumque malignarum classem peculiarem, huius malignitatis causam proximam esse

esse lymphatici humoris deprauationem statuit, et quidem duplicem, aut mole sola peccantem, aut nerueas fibras acrimonia laedentem. Hanc acrimoniam accuratius non determinat, adeoque hac acrimonia stabilita non videmus, quid in neruosarum febrium theoria certius euadat, neque quam generalis haec causa supposita ad curationem harum febrium vtilitatem habeat, perspicimus. Omnia sane, quae Celmus vir de neruosae febris natura proposuit, omnes adeo febrium neruosarum earumque curationum historiae, quas in progressu operis copiosissime exponit, opinionem nostram non infirmant, qua statuimus, dari vix febrium peculiarem classem, neruosarum nomine insigniendam, neruosasque recentiorum febres ad pituitosarum classem referendas esse, quae corpus tenerum, mobilitate fibrae sentientis atque irritabilis praeternaturali gaudens, occupant.

Eandemque sane neruosam Nostri febrem esse, p. 33. altera operis pars, in qua historiae febris neruosae proponuntur, probat. Historiae morborum egregie conscriptae sunt modoque tali, vt facile sentiat lector, auctorem in curandis morbis magis esse versatum, quam in opinionibus auctorum de iisdem enarrandis, ordinandis atque diiudicandis. Hae omnes historiae, quod et ipse annuit, probant, ad hanc febrem inclinare, qui habitum corporis laxum, neruos debiliores, sensibiliores habent, qui affectione hypochondriaca aut hysterica laborant, quos tristitia animi pathemata, vigiliae vexarunt, qui studiis operam nimiam dederunt, aut nimis euacuationibus exhausti sunt. His omnibus febris nascitur non valida cum summa neruosi systematis sensibilitate, fibrae motricis debilitate pituitaque resoluta.

Optime simul notat Cl. Auctor, pituitam, vbi in p. 70, his febribus ad internas partes, pulmones praesertim, deposita fuerit, non semper per antiphlogistica me-

dicamenta expurgandam esse, sed si summa debilitas, si ob atoniam vasorum decubitus factus est, excitantibus fortioribus cardiacisque opus esse.

P. 93. *De febre nervosa, vel maligna lenta sudatoria.* Valde memorabilem febris pituitosae cum nervorum mobilitate summa iunctae historiam enarrat Cl. Auctor, non vero ob sudorem; is enim nimius non erat, sed ob spasmodum symptomata creberrima, hydrophobiam spontaneam (ob aluum forte praemature adstrictam) et crisin morbi; per salivationem demum subsequutam, cuius aliquot exempla in prioribus quoque morborum historiis occurrunt.

Expositis variis aliis febris nervosae complicationibus cum febre biliosa, febre vernali, putrida, vermicibus, variolis, morbillis, historiae phrenitidis duae enarrantur. Cum febre pituitosa iunctae erant: sane cerebri et membranarum, quae cerebrum inuestiunt, inflammationis nulla vestigia observata sunt, status vero corporis plane pituitosus erat morbusque corpora aerumnis et animi affectibus tristibus exhausta occupauerat. Recte hinc concludit Celmus Auctor, has phrenitides inflammatorias non fuisse, plures dari phrenitidis species, easque, quas ipse observauerat, a generis nervosi nimia sensibilitate (pituitam resolutam addere debuisset) origines duxisse.

Ad curationem febrium, quarum historiae enarrantur, nervosarum quod attinet, hoc tantum in illa reprehendi debere nobis visum est, quod Cl. Auctor, nervosam affectionem semper prae oculis habens, primis viis non semper, neque satis efficacibus medicinis prospexerit. Pituitae praeter naturam resolutae signa in omnibus nervosis febribus, quarum historias enarrat, aderant: non raro signa certa docebant praecordia a pituita valide affecta esse. Et tamen emeticam medicinam vix semper praescripsit, praescriptamque hac dosi exhibuit, ut alui profluvium

vium potius idque corpus debilitans adeoque nocivum, quam efficacior emesis ab ea expectari potuisset. Neque in his febribus, vti in pluribus aliis morbis vnicum bonum, quod emetica praestant, euacuatio ipsa est: plus expectandum est a nervorum irritamento, quod emetica inferunt, a succussu, quem exhaustis fibris impertiunt, a solidorum actione in fluida intensiore et vegetiore facta et a circuli humorum, secretionum et excretionum libertate restituta.

Finem operi imponunt *corollaria ex historiis morborum enarratis deriuata.* p. 155.

Rationalem (?) *therapiam* horum morborum non existere, naturae molimina observanda, vires aegrotantis rite aestimandas, et ex his indicationes curativas formandas esse (adeoque hoc praeter rationem est?) statuitur.

Venaesectiones, emetica, purgantia damnat Cl. Auctor: quo vero iure emetica in vniuersum damnet, iam docuimus. Specificam medicinam non proflare aduersus febres nervosas statuit. Putat adeo, nondum esse definitum, quibus sub indiciis cortex Peruvianus in his febribus se salutarem nocivumve praestet. — Opium vsum timet, neque sopientem medicinam adhibet, nisi alui profusio immoderata incidat, vigilias enim, corporis iactationem, inquietudinem atque soporem praeternaturalem opium inducere, nervos debilitare, atque coctionis criseosque negotium turbare ait. (Haec alii aliter fieri observarunt, ilque viri fide dignissimi. Crises sane, si ob nervosam sensibilitatem, fibrae mobilitatem et debilitatem succedere nequeunt, nil efficacius, nil certius determinat opio, morbo antea ad ipsam crisin praeparato). Vesicatoria egregios effectus praestiterunt. Regimen paulo calidius optimum est.

Difficul.

Difficulus febris neruosa cum putridis gastricisque complicata cognoscitur: medela aequae difficilis est. — Sudor immodicus absque reliquis criseos bonae signis semper malus est. Generatim nulli valetudinis redeuntis signo fides habenda est. Haemorrhagia aluique fluxus morbum nunquam solvunt, saluariae vero copiosior profusio ut plurimum salutem futuram promittit.

Tussis, difficilis deglutitio, respiratio difficilis, praecordiorum anxietas, dolor, caetera non inflammationem, non peregrinas ad praecordia haerentes materias, sed neruorum perturbatas affectiones et spasmodicam affectionem denotant. — Surditas sola nervosa affectio est, si his febribus superuenit. Metastases generatim in his febribus periculosae sunt. Parotides nunquam vidit Celmus Auctor in his morbis: si vero ad pulmones morbi materia decumbit, neque statim sputa decedunt, mors fores pulsat. Aphthae in faucibus natae non semper gastricae sunt originis, neque gangraena aut petechiae in his febribus a putredine semper producuntur. Duratio morbi incerta, ut plurimum longa est: neque conclusio firma est, fore, ut reliqua stadia morbi absque periculo decurrant, si primum illius expers fuit: subito enim morbus in peius ruit. — Mors ut plurimum placida est: quidam tamen cum anxietate et respirationis difficultate moriuntur.

V.

Medicinische und chirurgische Bemerkungen von MORITZ GERHARD THILENIUS, der Arzneyw. Dr., Stadt- und Landphysikus in Lauterbach. Frankf. am Mayn 1789. 8. 467 pagg.

i. e.

Observata medica et chirurgica.

Rarae

Raræ sunt nostris temporibus observationes medicorum, in quibus instituendis omnia concurrerant ad bonas vtilisque ad ipsam medicinam practicam amplificandam observationes necessaria, opportunitas scilicet ad observationes ipsas copiose instituendas, repetendas, vsuque crebriore confirmanda ea, quæ aut recenter inuenta, aut crebriore vsu nondum confirmata sunt, et mens ad observationes ipsas instituendas apta, assiduum studium, doctrinaque talis, quæ sciat observator, quousque medicina in his, quæ observantur, processerit, quæ certa sint, quæ maiore illustratione, certitudine, indigeant. Haec omnia in Clmo Auctore iuncta esse raro, et felicissimo connubio, facile omnes, vtilissimas has observationes legentes, perspicient.

Loca primum describit Clmus vir, in quibus observationes suæ factæ sunt, aërem, aquas, vitæ genus, alimenta, numerum hominum, deinde morborum numerum, quos singulis annis, ab anno MDCCLXXX ad annum MDCCLXXXV curandos habuit, alphabeti ordine recenset. Quo facto notatu digniora circa hos ipsos morbos copiosius enarrantur.

Abortum delicatulis adeo frequentem, Noster p. 43. hoc modo præcauet, vt priore abortu superato, mox de altero auertendo cogitet, et quidem tonicis medicamentis. Plethoricis sexta post conceptionem hebdomade sanguinem detrahi iubet, sanguinisque missionem omni deinde mense repeti. HALLERI elixirium acidum interne datur, cum opio, si spasmi urgent, iunctum. — Si vterus vsque ad certum tantum gradum extendi patitur abortusque nascitur, si extensio ad hunc gradum processit, vnguenta emollientia adhibere suadet.

Amaurosin, SCHMUCKERI methodo observata, sæpius sanauit. Vapores spiritus salis ammoniaci oculo admissi inprimis efficaces se præstiterunt.

Aphthæ

P. 54. *Aphthae* dum tubum alimentarem nondum obfident, optime cedunt, medicina ex rhei tinctura et magnesia data. Borax cum rosarum melle, aut dauci succo ad abstergenda vlcera optime conuenit. Si putridae sunt, in cortice Peruuiano et alumine vnicum praesidium situm esse putat Celmus Auctor. Ad putrida et sanguinolenta aphthosorum alui profluvia gummi Arabicum cum hordei cremore solutum vtile est.

P. 56. *Apoplexia* ex spasmo in ambitu viscerum vitalium ac naturalium subito suscitato omnium frequentissima est. In sanguineae apoplexiae curatione sanguis ex loco, si fieri potest, emitti debet, ex quo naturali quondam modo, profusione ante insultum intercepta, profundi solebat. — Clysteres irritantes emollientibus semper praeferendi sunt. Vesicantia orgasmum non citant, efficacissime potius acrimonias versus exteriora trahunt, spasmosque in vasorum systemate sopiunt. — Inustio ceruicis (quam recentiora PORTII, LENTINI, aliorumque experimenta in omni humorum ad neruorum origines congestione efficacissimam probarunt) crebrius tentanda est. — Frigida epithemata capiti apoplecticorum eorumque, qui sanguinea versus caput congestione laborabant, iam ante SCHMUCKERI et CRELLII obseruata Noster semper cum successu imposuit: nocent vero, si facies collapsa, frigida, pulsus debilis lentusque est: in hoc casu emetica, excitantia et antispasmodica iuuant.

De praecauenda apoplexia multa atque vtilissima scitu proponuntur. Si sanguis niger, atrabilarius, ad coagula pronus apoplexiam minatur, *lauro-cerasi* aqua, ter vel quater per diem ad LX guttas data (num simplex, num cohobata et quoties?) optime conuenit.

P. 32. *Arthritis* subtiliorem materiem rheumatica habere non videtur, vtque arthritis nascatur, opus est,

vt

vt lymphæ terreis particulis onusta sit. Ad rheumatismum inducendum inflammabili tantum, ad stagnationes et ad acrimonias suscipiendas prona lymphæ opus est.

Prima indicatio in omni arthritide est, vt aluus expurgetur. Optime guaiaci resina cum tartari cremore hunc in finem conuenit. Articulis tumidis ceratum imponendum est, quod ex cera, resina pini, terebinthina et aeris viridi componitur. Deinde ad resoluentem curationem procedendum est, siquæ attenuata est arthritidis materies, ad diaphoreticam: doloribus puluis DOVERI subuenit. — Vesicatoria raro subueniunt: moxa vero, si adhibetur materia adhuc mobili existente, locisque nondum inflammatis, egregie conducit.

Probatissima caeterum ad arthritidem medicamenta sunt saponæ antimoniales KÆMPFII, extractum aconiti, guaiaci pulueres supra memorati, adhibitis simul ptisanis ex dulcamara, saponaria, sassaparilla, pini turionibus. Saponem antimonialem cum galbano, ventriculo magis amicum, efficacissimum Cl. Auctor expertus est. Elixirium acidum HALLERI efficax quidem sese præstitit, verum tamen non, quod LENTINVS V. Cl. dixerat, verum arthritidis domitorem. —

Asthma, morbus nunquam sanabilis, si vitia in solidis pulmonibus subsunt, multos in hydropem præcipitat, inprimis si crebro sanguinem mittunt. — Infusum radicis senegæ, adhibitis simul aliis medicinis ex soluentium classe, efficacissimum ad asthma pituitosum est. — Pectoris angina, asthmatis conuulsui species, causam arthriticam fere semper habet, reditque, si sat cito fieri potest, arthritica materia loco suo mota. p. 92.

Atrophia infantum soluentibus, euacuantibusque medicinis præmissis iufuso glandium quernarum potato p. 97.

tato fere semper curatur. Danda vero est (et per longum quidem tempus) haec infusio soluta iam obstructionum parte plurima fordibusque expurgatis: tunc reliquias obstructionum glandes referant, tonumque instaurant.

p. 99. *Calculos* minutiores, arenulas mucumque in vesica urinaria optime depulit absinthii extractum cum sapone, data simul calcis aqua ex ostracodermatibus in calcem vstis parata, nec non sal alcali minerale Grauenhorstiorum cum hac calcis aqua solutum. Vna vrsi dolores et urinae ardorem auxit.

p. 100. *Scirrhus scrofulosus*, qui malignitatem nondum contraxerunt, dissipavit mercurius sublimatus cum cicuta datus. Scirrhum alium a causa atrabilaria soluens, saponacea methodus, laurocerasi aqua in clysteribus visceralibus adhibita resoluit. Belladonna votis non respondit, verum ob visus turbationem vix diu adhiberi poterat. Verum cancerum medicamenta sanare nequeunt, neque vlla (?) in hoc morbo ab arsenico salus expectanda est.

Ad *cariem* ossium asa foetida valde efficax fuit, imprimis acrimonia scrofulosa, arthritica, rheumatica, simul praesentibus. Plures historiae cariei ossium aut persanatae aut lethiferae, enarrantur. Cariem vertebrarum fonticuli secundum POTTII mentem positi efficaciter sanarunt.

p. 116. *Chorem Sancti Viti* Noster crebro vidit, ut plurimum a vermibus; aut a scabie retrogressa oriundam. Nunquam vidit puerum, nunquam adultum hoc morbo adfectum. Neque haereditarium malum esse videtur.

p. 117. *Coeliacum fluxum* quinquies vidit in praxi XXI annorum. Valetudinem hoc morbo aegrotantium nulli penitus restituere potuit: in vnico tantum aegro vita per aliquot annos seruata est. Historia his praemissis enarratur coeliaci, in quo effectus medicamen-

camentorum roborantium mucilaginosi iunctorum spem plurimam faciebat: sed breui post mortuus est aegrotans, osse sacro carie exeso.

Post *contusiones* et vim externam corpori illatam p. 121. sanguis in internis partibus effusus semper *arnica* opportune data resoluitur. Neque interest, num recens sanguinis effusio, num inueterata, num parvum, num multum sanguinis effusum sit. Folia *arnicae* floribus Noster praefert, quae cardialgiam anxietatemque eodem modo, quo flores, excitant. Qui cardialgia laborant, *arnica* opio remixta uti debent.

Crusta lactea *viola tricolore*, praemissis purgantibus data, semper sanatur. Si parum efficax depressa est haec medicina, a solo forsan nimis pingui hoc pendet, in quo creuerat. Impetiginem sustulit, minus tamen ad alios morbos cutaneos et ad herpetem efficax.

Deglutitionem difficilem raro sanare potuit, et vix, nisi a spasmo locali natam.

Epilepsia, quae subito aegros inuadit, noctuque, p. 129. somno durante, difficulter sanatur. Cuprum ammoniacale morbum, cuius certa causa cognosci non poterat, aliquoties sustulit, neque vnquam noxas peperit. *Valerianae* radix multos sanauit; oleum *valerianae* epilepticum ex terrore liberauit. Aliis folia aurantiorum proficua fuere, quibus efficaciora medicamenta incassum data fuerant.

Febres intermittentes *gei vrbani* radices non sanarunt. Quosdam *quercus* cortices cum sale ammoniaco dati liberarunt. p. 139.

Febrem puerperarum recte Noster ceu febrem considerat, quae in grauiter vulneratos (neruorum et fibrarum irritabilium mobilitate praeditos) cadit, atque pro corporis, constitutionis et causarum, quae praegressae erant, natura varia esse potest, adeoque vario modo curari debet. Aluum leniter ducentes

medicinae morbum, qui gastricus ut plurimum est, saepissime praecauent.

p. 149. *Haemorrhagiam uteri* leuiorem ipecacuanha parvis dosibus data, nervos componendo secure tollit; si vero vehementior est, adstringentia iuuant: si sanguinis plurimum profusum est, vires fatiscuntur, tinctura cinnamomi conuenit. Frigida epithemata congestionem efficacissime praecauent.

p. 153. *Hydrocelen* per setaceum curandi methodus palam reliquis eripit, quod pluribus historiis fuisse enarratis probatur. Permulti asthmatici hydropici euadunt usu crebro radicum solani esculenti. Fructus pomacei oleraque minus matura etiam ad hydropem crebrius generandum aliquid contulisse videntur. Primum in curatione est, ut aquae educantur: sed cuiusnam naturae aquae sint, primum investigandum est. Si lympham spissior est, mercurius cum radicis senegae decoctione datus eam soluit, postea per diuretica aut purgantia medicamenta expellendam. Haeque aquas educentes medicinae saepe non agunt, nisi aquarum mole aut prius educta per chirurgi artem, aut spasmis opio sopitis. Squilla ad diuresin efficacissima est: colchicum nihil praestat. — Curatio hydropis post causas debilitantes nati, praeclare traditur: per tonica, nutrientia, diuretica non infirmantia tentanda est. Thoracis hydrops absque paracentesi raro, si unquam, curatur. Neque paracentesi instituta valetudo tuta est. — Digitale purpuream saepe ad hydropem curandum Celsus Auctor adhibuit, obseruauitque eam quidem subinde vehementer in ventriculum, intestinalem tubum nervosque agere, attamen aquas potenter educere atque obstructionibus pertinacissimis, imo scirrhis soluendis aptam esse.

p. 189. *Hypochondriaci mali* causa ut plurimum in abdomine tumoribusque latet, nervorum vero dispositio morbum

morbum ad maturitatem perducit. Hypochondriacum malum sine materia raris hinc morbis accensendum est: et si etiam materies nervos irritans subinde medicum fugit, tamen non raro accidit, vt KAEMPFIJ methodo adhibita morbus perfecte sanetur. — Sanguinem atrabilarium, tenuiore parte carentem, difficulter per vasa mobilem optime resoluit aqua laurocerasi, quae hunc effectum specifici instar, certe praestat, indeque hypochondriacis, melancholicis, maniacis, in quibus sanguinis talis status est, summe proficua est. Agitque haec aqua absque omni irritatione, absque omni sensu excitato, hinc ubique tuto adhibenda ad LXXX guttas ter vel quater per diem. Pharmacopoeus Lauterbacensis errore quodam vnciam dimidiam huius aquae potauit absque plurimo symptomate, stupore quodam excepto (si concentratiorem potasset, peior certe fuisset effectus: minus enim concentratam fuisse aquam laurocerasi, qua Noster utitur, suspicari licet). Clysteribus visceralibus huius aquae drachmas duas absque malo euentu adiicit.

Cortices vlmi *ad impetiginem*, nec non dulcamara p. 200. ram non raro cum successu dedit, raro vero curatio, absque antimonialibus et mercurialibus medicamentis successit. Locales herpes, multum humoris profundentes, vesicatorium impositum delet. Aqua laurocerasi ad vlcera ex herpetibus nata profunda valde efficax fuit.

Infarctus viscerum abdominalium, frequens sedentariorum morbus, praesertim pituitosi, vim vitalem intestinorum minuunt magnasque, si per interna medicamenta curatio fieri debet, purgantium fortiorum doses requirunt. Methodum Kaempfianam infarctibus omnis generis resoluendis optime facere satis, per multa exempla docetur. Ipse Celmus Auctor hac occasione morbum, quo affectus per lon-

giffimum tempus fuerat, enarrat, methodosque curatiuas, quas adhibuerat, varias.

- P. 232. *Leprae*, seu potius cutis vniuerfae in squamas induratae, delabentis, nouis squamis iterum generatis, exemplum Clnus Auctor vidit. Facile curata est datis purgantibus, cantharidum tinctura, dulcamara et regulo antimonii medicinali cum cortice Peruuiano. Balneum ex aqua, in qua folia boni Henrici decocta erant, multum ad cutem a squamis purgandam fecit.
- P. 237. *Melancholicos* et maniacos plurimos sanare potuit. Hyoscyami extractum plus leuaminis aegris attulit, quam ipsum opium. Belladonna nil boni praestitit. Laurocerasi aqua cum tartaro solubili et emetico iuncta optime votis respondit. Digitalis purpurea crebrius olim in hoc morbo adhibenda alvum praeclare expurgauit.
- P. 239. Sanguis diu in vasis abdominis haerens ibique corruptus morbum constituit, in quo nigra, atrabilia decedunt, *melaenam* Noster vocat. Cremorem tartari solubilem cum cortice Peruuiano inprimis ad vim intestinalis tubi restituendam, sanguine euacuat, laudat.
- P. 249. *Morsos a cane rabido* omnes SCHMUCKERI methodo sanauit. Vlcus diu apertum seruauit, eique ex vlcere profluuium curationis principem partem adscribit.
- P. 254. Senegae radix cum althea infusa, *pleuritidis* data, lympham coagulabilem optime resoluit multumque ad feliciorum huius morbi curationem facit. Intestinorum inflammatione correptis, ob irritationem ab ea excitatam, dari commode non potest.
- P. 255. *Phthisin* a catarrho natam, tuberculosam, extractum cardui benedicti cum extracto radice senegae aquoso datum egregie sanat. Si nulla inflammatio subest, cortex Peruuianus antiphthisicis medicamentis

tis omnibus praestat. Febrem phthysicam sal ammoniacum et cucumerum succus optime temperant. — Si febris non valde magna est, oleum asphalti, vlcus consolidans, cum eoque febrem sanans praeclare subuenit.

Rheumatismus chronicus mercurio sublimato dato, si nulla quoque venerea labes subest, egregie cedit, diaphoretico regimine simul obseruato. Externe cantharidum tinctura cum spiritu salis ammoniaci remixta maxime proficua est. Spiritus salis ammoniaci cum calce viua paratus et loco dolenti impositus cutem sensim exulcerat, nataque deinde crusta dolor remittere solet. Ad ischiadicum malum optime iuuat medicamentum ex oleo terebinthinae cum melle interne datum, si ad inflammationes minus prona constitutio est. Faciei dolorem bis Clmus Auctor vidit sanauitque guaiaci et cicutae ope.

Scabiem TASSERI vnguentum optime curat. Nec necessaria ad id baccarum lauri additio est. Praestat vitriolum album floresque sulphuris vnguento pomato miscere.

Scrofulas sapo antimonialis cum asa foetida et mercurio cum extracto cicutae, aconiti et oleo ligni sassafras mixtus efficacissime sanat. Si fibrae laxae sunt, cortex Peruvianus cum aethiope antimoniali subuenit. — Strumam, si non nimis inueterata est, puluis ex spongia marina combusta semper tollit.

Princeps *tineae capitis* curatio in eo sita est, vt radices capillorum aegrae extrahantur. Puluis ex bufonibus calcinatis paratus nullum auxilium tulit. Tussim conuulsuam extractum nicotianae optime sopiuit.

Vermes (lumbricos nempe) semen cinae optime et efficacissime depellit. STOERCKII electuaria pueri saepe recusant. Semen sabadillae vermes certe necat, sed nimis irritat: valet vero in clysteribus

optime contra ascarides; neque decoctionis forma iniectum in aluum irritationis expers est. Taeniam stanni limatura et medicina CLOSSII efficacius depulit, quam NOVFFERI medicina: actio plurima purgantibus drastice in taenias est, neque vnquam effectus vehementiores Noster a gummi guttae maximis dosibus dato vidit.

p. 301. *Vomitum* matrona pertinacem experta fuerat. Inciso cadauere ieiuni intestini pars callosa vix calammum scriptorium trans mittebat.

Altera sectio titulo *minutiarum* inscripta, varia obseruata continet. Multa satis notabilia enarrantur, v.g. mulieris historia, quae d. vi. Ianuarii primum, die xix. eiusdem mensis alterum foetum enixa fuerat. Post priorem partum nulla plane lochia nullaeque secundinae decesserunt.

Vetulae brachium gangraena senili ad humerum fere vsque correptum ense feliciter resectum est. Vulnus datis cardiacis atque roborantibus, breui consolidatum est. Aliae adhuc vulnere, praesertim capitis, lethiferorum et sanatorum historiae enarrantur. Memorabilis in his praesertim haec est, qua caluariae vtrique tabula laesa, vulnere vsque ad duram matrem penetrante omnibusque factis, quae ad sanationem aegri vlllo modo pertinere videbantur, aeger die morbi LXIV, ob cerebrum suppuratum obiit.

p. 337. *Tertia sectio* historiae variolarum insititiarum enarrantur, quas Cl. Auctor ipse obseruauit. Perinde fuit, num materies variolarum naturalium aut artificialium ad insitionem eligeretur: neque quater per insitionem in alios artificiose propagata materies melioris notae variolas dedit. Confluentium variolarum materiem ad insitionem eligere non licet. Benignarum variolarum materies in vrceolum vitreum excepta, hoc saepius quoque interea aperto, per xxiv dies

dies seruata, nulla putredinis signa dedit. Pus vero a puero sumtum, qui bonas atque discretas variolas habebat, nigrasque tantum duas in sinistro crure, iam tertio die putredinis signa indubitata dedit. — Ut non putrescat pus variolosum, id aliquot guttis essentiae myrrhae sine alcali paratae miscere expedit.

Epidemice quae simul grassabantur, variolae, ad malignius genus referendae, quartumque quemque fere puerum trucidantes, febre biliosa putrida stipatae erant. Hinc et his, quibus artificio variolae datae erant, alius probe expurgari debebat. Caeterum insitio probe successit, neque, nisi quibusdam, qui iam ante insitionem venenum naturali modo conceperant quibusque febris iam secundo, tertioque post insitionem die nascebatur, mortifera fuit. Saltem nullae ex inoculatione mortes, nisi hae erant, in quibus naturale contagium simul agens accusari poterat. Hos etiam peius se habuisse ex insitione variolarum putat Celmus Auctor, qui dispositionem ad variolas naturales maiorem habebant.

Quarta sectione de aquarum medicatarum quarundam virtutibus agitur. p. 443.

VI.

Observationes quaedam de puerperarum morbis, deque ipsarum epidemica constitutione. Epistola IOSEPH CERRI, medic. Doctoris, ad BARTHOLOMAEVM DE BATTISTI, Mediolani. MDCCCLXXXVIII. Apud Ioseph. Galeatium, regium typographum. Superiorum permissu. 8. pagg. 115.

Nonnisi prior pars libelli epistolam ad Cl. DE BATTISTI, qui dissertationem de feminarum morbis Viennae 1782. edidit, sistit, varias morborum hi-

- storias complexa, quae non possunt non commendare Cl. Auctoris studium et in medendi methodo adhibita sagacitatem: ex quibus praesertim memoramus exemplum feminae iam ante partum febre intermittente laborantis, statim post partum in continuam acutam mutatae, erumpentibus quarto die variolis, hisque superatis accedentibus diarrhoea, oedemate pedum, febris intermittentis novis insultibus; sed purgantibus et postea cortice peruuiano feliciter superatus est morbus. Eodem tempore epidemice quasi puerperas inuasit febris gastrica, curatius hic descripta, de qua tantum hic annotamus,
- p. 10.
- p. 12.
- p. 28.
- p. 31.
- in cardiacorum applicatione sollicite attendendum fuisse, ne praecordiorum et ventris prominentia intenderetur, aut alui deiectiones plus iusto retardarentur, quod praesertim a camphorae usu acciderit. Ultima historia est grauidae pleuriticae, inflammatione iam paene discussa foetum septimestrem enixae et postea morbo putrido affectae, ex quo difficillime emerfit; ex quo colligitur, „saepe morbi inflammatorii finem esse putridi initium; quam sint puerperae in putridam labem proclives; pectoris morbos aut numquam, aut raro finiri per aluum, imo saepe periculosiores fieri.“

- Quum autem in epidemia modo memorata alius quidam medicus DONZELLI auctorem nostrum acrius in edito apologetico perstrinxisset, ad eiusdem refutationem adiunxit Cl. CERRI de antiquorum recentiorumque circa febrim puerperalem doctrina dialogum, in qua partim demonstrare satagit, febrim puerperalem non constituere singularem morborum speciem, semper et necessario a lactis metastasi pendente, partim DONZELLII methodum medendi in casu singulari, in quo ambo hi medici concurrerunt, censurae subiicit: num satis modeste, iudicent ii, quibus DONZELLII scriptum legere datum fuerit.
- p. 35.

Rudis

Rudis dictionis veniam a lectoribus Cl. CERRI ipse exorat: nos quidem pauciores mendas typographicas eodem iure optassemus.

VII.

IOSEPHI EYEREL commentarii in MAXIMILIANI STOLLII aphorismos de cognoscendis et curandis febribus. — Tomus tertius. Vindobonae, typis Christiani Friderici Wappleri. 1790. 8. pagg. 395.

Eadem, qua priores *), laude dignus, sed ob insti- p. 1.
tuti nostri rationem non admittens vberiore
eorum omnium, quae vtilitate sua se commendant,
recensionem: quare in enarrando dicendorum ordi-
ne potissimum nobis acquiescendum esse per-
spicimus.

Febris biliosa. Synonymia. Systema morborum
humorale, a modernis immerito damnatum. Poly-
choliae idea: causam proximam febrium biliosarum
in sanguine ipso praeesistere, neque solum ex primis
viis resorberi, quam sententiam STOLLIVS olim
amplexus, longa observatione alia edoctus deseruit;
neque consensui neruorum tribuendam esse **).
Polycholiae sanatio vel natura vel arte. Febris biliosae
genesis; amplitudo ***); duplex eius stadium; cau-
sae; symptomata (inter rariora pertinent petechiae,
vnde quibusdam febris petechialis peculiare genus
constituit, et carbunculi, STOLL rat. med. T. II.);

Ss 5

indo-

*) Vid. Comm. nostr. Vol. XXXII. p. 117.

**) IOH. CH. REIL de polycholia, et fragmenta me-
taschematisini polycholiae. Hal. 1783. 8.

***) IOH. IAC. PLANER *allgemeine Uebersicht der*
Krankheiten in Erfurt von 1781–1785. Erfurt
1786.

indoles parasitica, inprimis coniunctio cum variolis; variationes, vel saburra in ventriculo praeexistente, vel crisi- bus partialibus, successivis, vel recidiuis, vel transitu in febrem ardentem aut putridam. Febris biliosa simplex, et cum metastasi: diuersitatis metastasium in diuersis epidemiis causa inexplicabilis: egregie de diagnosi pleuritidis et peripneumoniae biliosae, et de medici in ambiguo inter morbum biliosum et inflammatorium versantis officio, exemplo GVIDETI *): coniunctio febris biliosae cum inflammatoria, cum pituitosa (febris atrabiliaria GRANTII); in transitu quaedam de febre puerperarum. Exitus febris biliosae: in mortem ex metastasi ad viscera nobiliora, ex erysipelate interno in gangraenam abeunte, ex carbunculo internarum partium, ex transitu in febrem putridam; in sanitatem, euacuationibus naturalibus vel artificialibus primarum viarum, sudoribus, vrinis, eruptione miliari, ptyalismo, ictero; in alios morbos, biliosum complicatum, putridum, intermittentem, morbos infimi ventris. Methodus medendi: in stadio cruditatis soluentia, diaeta, lenia euacuante; in statu turgescientiae emetica, magis tunc proficua quam in principio morbi, ad mentem b. STOLLII et Cl. HAEBERL, adiunctis monitis utilissimis de selectu vomitoriorum, eadem exhibendi ratione, indicationibus eorum cautissime perpendendis, potissimum ex Ill. FRANK **). Praeparatio ad emetocatharsin per venae sectionem methodumque antiphlogisticam, si vel febris stationaria inflammatoriae indolis sit, vel annua phlogistica diathesis subortae biliosae febrī adhuc commixta, vel topica simul viscerum inflammatio subsit; item si peruersa calefaciente methodo phlogosis in corpore accenditur.

Alia

*) Diff. de febr. bilios. et de pleurit. bilios. Edit. noua. Lausannae. 1788.

**) De laruis febr. bilios.

Alia contraindicantia emeticorum. Signa materiae deorsum turgentis, purgantium indicantia. Quid metastasi ad partem nobilem vel iam facta vel saltem metuenda, agendum. Conualescentia: diaeta, roborantia, ad mentem TISSOTI. Relapsus: generales eius causae ex Cl. FINKE *). Peruersa medendi methodus: per calefacientia, cardiaca, vesicantia, opium. Prophylaxis, rursus ex TISSOTO. Corollaria practica: praecipue de euacuantium administratione. Subiunguntur demum historiae septem morborum ex Cl. HAEBERL.

Febris pituitosa. Synonyma: inter haec et ver- p. 117.
minosa. Constitutio pituitosa; saepissime ex sola absentia notarum, quibus febres discernuntur, eruenda. Causa proxima, difficillima: non vnus tantum humoris morbus, sed totius substantiae; pituita tamen abundans, infarctus glandularum, et morbosa neruorum irritabilitas, protractoque morbo nimius eorum torpor, aut simul tanquam causa proxima assumi possunt, aut saltem tanquam proximi frequentissimique causae proximae effectus. Decursus febris pituitosae: prodromi morbi; symptomata eum concomitantia; discrimen a biliosa, putrida, continua remittente, pleuritide et peripneumonia saltem incipiente, febre rheumatica arthriticae, febre verminosa, hectica, dentientium. Complicatio cum aliis febribus: inflammatoriis et biliosis (hinc constitutio atrabiliaria GRANTII): morbi quicumque constitutionibus humidis grassantes plerumque aut haec ipsa febris pituitosa sunt, aut eius quaedam modificationes; constitutio catarrhalis, asthmatica, apoplectica e. s. p. Exitus in sanitatem: lyxi, in leuiore praesertim gradu; vomitu; alui fluxu, modico tamen eo; diaphoresi; miliarium eruptione critica;

*) Vid. Comm. nostr. Vol. XXV. p. 427.

- tica; salivatione critica (HVXH. *) et ROEPER **));
 sputo critico; febre tertiana vernali (GRANT). Exitus infausti: apoplexia; suffocatione ex hydrope pectoris et pericardii; morte subita sub specie redeuntis sanitatis, excepto oedemate pedum, forte a funesta metastasi feri vel lymphae ad cauum aliquod;
 p. 387. metastasi ad varias partes, glandulas praecipue, infausto plerumque exitu; glandularum mesenterii inflammatione diuturna, vix detegenda. Methodus medendi potissimum ex STOLLII rat. med. T. II. singulis fere aegris singularis accommodanda. Cautiones in sanguine mittendo, in euacuantium vsu. Alterantia, ex antimonialibus potissimum. Resoluentia, inprimis flores arnicae. Neruina. Opium. Vesicantia. Diaphoretica leniora. Corticis peruiani decoctum ad firmandam solidorum compagem labefactam. Scillitica sub statu conualescentiae, monstrantibus se vna cum tumore crurum hydrothoracis symptomatibus. Noxae antiphlogisticae methodi iusto diutius protractae, itemque euacuantium nimiorum, calidiorumque, ex GRANTIO. Historia epidemiae in tractu Germaniae mari Baltico vicino a WAGNERO obseruatae ***).
- p. 150. *Peripneumonia notha* seu pituitosa, a SYDENHAMO demum et HVXHAMO rite definita, et praecipue secundum horum ductum descripta, subiuncta descriptione duarum eius constitutionum ex STOLLIO ****). *Peripneumonia atrabiliaria* GRANTII. Duae historiae peripneumoniae nothae sub constitutione atrabiliaria hyemis 1786. obseruatae. Sub finem

*) Vid. Comm. nostr. Vol. II. p. 522.

**) De salivatione critica, in HALLERI coll. T. I. p. 443.

***) Obseruatt. clin. Lubec. 1737. 4.

****) Rat. med. T. II. p. 208. et T. III. p. 35.

finem HVXHAMI monitum, ne iusto liberaliores sint, medici in exhibendis remediis.

Febres intermittentes (quamplurima ex Cl. TRNKA p. 178. DE KRZOWITZ)*). Diuisio earum ratione periodorum in quotidianas, tertianas, quartanas, complicatas; anni temporis in vernales et autumnales (hic etiam relatio intermittantium ad continuas ex SYDENHAMO, et ad inflammatorias ac lentas nervosas ex HVXHAMO); causarum procatacticarum in sporadicis, epidemicas, endemias; diuersitatis stadii in consistentes, anticipantes, postponentes; symptomatum in larvatas et manifestas; indolis in perniciosas et benignas (prioris rarius nostris in terris epidemicae, atque tunc maxime autumnis soboles). Triplex febrium intermittantium stadium. Febris intermittens erratica cum per se, tum a regulari antea cursu deflectens. Diagnos. cum a cuiusvis alius generis febre, tum ratione discriminis typorum. Transitus earum in morbos acutos. Effectus earum generales: solidorum laxitas, debilitas; fluidorum spissitudo, tenuitas, acrimonia. Extispicia ex GRANTIO. Causae febrium intermittantium. Praedisponens in singulo aegro adesse debet: hanc dispositionem in nervis potissimum residere, probabile. Sententia Cl. BANG**) de stimulo nervorum a bile, febrium harum causa. Causae evidentes febrium intermittantium: vel vniuersales, vel singulares seu sporadicae. Contagium earum dubium b. STOLLIO. Methodus medendi: in paroxysmo seu palliativa, et extra eum seu therapeutica. Antiphlogistica in febribus vernalibus, plethora, praesente simul febre inflammatoriae indolis, in latente chronica thoracis inflammatione, aut frequente haemoptysi, aut consuetis haemorrhagiis suppressis, aut circulo humorum

*) Vid. Comm. nostr. Vol. XXII. p. 322. seqq.

**) Praxis medica systematice exposita. Hafn. 1789. 8.

rum in abdomine impedito, porro in dispositione ad apoplexiam, subinde etiam in peculiari epidemia, item in cephalalgia inflammatoriae indolis, caute tamen a biliosa distinguenda: noxia in auctumnalibus saburralibus cachecticorum, cacochymicorum. Methodus soluens, tum remediorum in fluida diluendo, tum simul in solida stimulando agentium; per salina, saponacea, vegetabilia, resoluentia subamara, gummiferulacea, flores arnicae, martialia, antimonia, mercurialia: ubi conueniat necne: monita inprimis de cauta distinctione incipientis pleuritidis a febre larvata intermittente. Methodus sursum euacuans: tartari emetici prae ipecacuanha praestantia; digestiua quando praemittenda; optimum vomitum excitandi tempus, paroxysmo prorsus finito; quando emeticum noceat; monitum, ne vomitus plus iusto repetatur in debilitate ventriculi praevaeque digestionem. Methodus deorsum euacuans: ubi conueniat; purgantium selectus et additamenta; clysteres; ubi noceant purgantia. Methodus praeventens: vel sudore excitato per diaphoretica, alterantia, balnea calida et frigida, stragula, electricitatem, vesicantia et sinapismos, frictiones spinae dorsum cum linimentis aromaticis, camphoram *); vel per mutationem nervis inductam, excitatis animi affectibus, attentione, imaginatione, coeli mutatione; cautio in hac methodo adhibenda. Methodus confundens, iisdem modis obtinenda, sed periculosior. Methodus neruina, per roborantia et narcotica; sola tamen corticis peruuiani ratione habita in tractatu

p. 388. amplissimo et vtilissimo, subiuncta simul in appendice corticis peruuiani rubri mentione ex Cl. PLENK **). Cura conualescentium. Canones prognostici. Febres intermittentes larvatae: earum signa;

*) BANG selecta diarii T. II. p. 307.

**) Icones plant. medic. Cent. II. Fasc. II. p. 35.

signa; morborum periodicorum sedes primaria in abdomine, ratione tamen non explicanda, nisi hypothetice. Febrium perniciosarum indoles ac signa diuersa; cura, potissimum largiori corticis usu perficienda. Historiae quatuor morborum a Cl. LAVTTER obseruatorum. Morbi febres intermittentes sequentes: obstructions viscerum abdominalium ad Ill. DE HAEN *); hydrops; mania; diabetes; fluor albus; varii polycholiae effectus; debilitatis sequelae, potissimum rhachitis. Corollaria practica: de irrita corticis efficacitate, plerumque ob latentem viscerum abdominalium obstructionem; de purgantibus, roborantibus in conualescendi studio interponendis; de necessitate corticem exhibendi in nimia debilitate solidorum, praesentibus licet viscerum obstructionibus; de similitudine tertianarum cum morbis biliosis, et quartanarum cum atrabiliaris; intermittentes, soli mercurio cedentes, a stimulo venereo excitatas esse; de venae sectione in insultibus apoplecticis febrium perniciosarum; de salubritate a febribus intermittens expectanda.

VIII.

C. L. HOFFMANN, Sr. *Churfürstlichen Gnaden zu Maynz geheimen Raths, vermischte medicinische Schriften. Herausgegeben von HEINRICH CHAVET. Erster Theil. Münster, 1790. Bey Friedrich Christian Theissing. 8. pagg. 534. sine praefatione et contentorum conspectu.*

i. e.

C. L. HOFFMANNI opera varia medica, edita ab HENR. CHAVET. Pars prima.

Mutato consilio Cl. CHAVET iam primam partem operum germanicorum minorum Ill. HOFFMANNI

NI

*) vid. Comment. nostr. Vol. XVI. p. 496.

NI exhibet, latinorum editione adhuc dilata *). Ex iis, quae hac parte continentur, nonnulla iam seorsim prodierunt, a nobis asterisco signanda.

P. I.

I. *Tractatio de morbo miliari eiusque curatione in genere* (1756). Praemissa morbi definitione ac diuisione quaedam de putredine animali. Partes putrescentes, sanis additae, in his putredinem prius euolunt, quam id sponte eueniret. Putredo non vnico momento corporibus potitur, sed particulae putridae quantitate successiue increcente generantur. Quamdiu partes putrescentes vel in corpore genitae vel in illud ingestae per vrinam et sudores rursus euacuantur, putredo in corpore euolui nequit. Perspiratione igitur suppressa, maior copia istarum particularum in corpore gignitur, acrimonia sua vascula cutanea stringens, perspirationem cohibens frigusque excitans, quod diutius perdurans tandem acriores in sanguine particulas adeo auget, vt corde vasisque irritatis febris oriatur. Materies miliaris, organo excretorio cutaneo prae reliquis destinata, si hic stagnat, pruritus, punctiois sensum, dolores ad dorsum, inflammationem excitat, eodem modo vt frustulum carnis vel emplastrum cuti impositum. Miliaria rubra saepe, aequae ac alia inflammationis genera, discutiuntur; in suppurationem si abeunt, in alba mutantur, desquamatione demum terminanda. Discrimen materiae miliaris a materie febrium putridarum iam non tangit Ill. Auctor. Curatio eo dirigenda est, vt quantum fieri possit, euacuatio particularum putridarum iuuetur, earumque generatio impediatur. Indusia, antequam aeger iis vtatur, per paucas horas ab alio gestanda iubet succinoque suffienda, ne superstites forsan a sapone particulae putridae corpus aegroti intrent. Purpuram puerperarum in Westphalia penes infimae classis homi-
nes

*) Vid. Comm. nostr. Vol. XXXII. P. II. p. 290.

nes se numquam obseruasse, nutrimento ex sola cereuissia cum acido istius regionis pane cocta, stragulisque vilioribus adscribit. Acidorum mineralium dulcificatorum in praecauenda particularum putridarum generatione illud videtur esse discrimen, ut muriaticum particulis putridis in primis viis oriundis, vitriolicum spasmis, nitrosum calori quam maxime resistat. Ex salibus mediis communis ob excitatam inde sitim alienus est; nitrum illam potius exstinguit; sal ammoniacus putredini omnium potentissime resistit, ideoque nitro diuersa pro vario putredinis gradu proportionem admiscendus est; tartarus vitriolatus sublato maximam partem morbo ad restituendum appetitum exhibendus. Terreæ per se aliena: sed acidis saturata particulas oleosas corruptas in primis viis absorbent. Emulsiones ex seminibus nocent, quum experientia teste nihil facilius corrumpatur: inde utique vis exanthemata expellendi, materia eorum copiosius genita. Somni ad sustentandam transpirationem utilitas. Potus nonnisi is, qui facillime per vrinam transit. Ad eliminandam bilem putridam, miliarium somitem, ipecacuanha, vel ubi vomitus cieri nequit, aloe ad grana decem ob gratiam praeuertendasque vires calefacientes in aceto rubi idaei soluta, subiunctis salibus antisepticis; aut rheum aut sal anglicus siue de Seignette. Venae sectio nonnisi accedente alio morbo inflammatorio. Purpura retrocedens tunc demum mali augurii, quum deleta sensibilitas, aequè ac eo in casu, ubi vesicantia non agunt, aut vlcera chronica et fonticuli exsiccantur.

II. *De inflammatione eiusque sequelis* (1758). p. 81.
 Causæ remotæ sunt irritatio satis vehemens perduransque cum impedimento sanguini redeunti per compressionem venarum facta. Globus plumbeus superficiei laevis, in vulnere inflammationem non
Tom. XXXII. Pars IV. Tt mo-

mouet, quod tamen panni vel lanæ particulis relictis euenit, humores quippe sugentibus in putredinem abeuntes. Vesicantium actio declarata *), quæ postea ad gangraenæ ortum applicatur. Densitatem sanguinis, extremitates arteriarum obstruentis, causam generalem inflammationis **) esse non posse, his argumentis probatur: quia non in eo demum loco, ubi existit inflammatio, sed ubique in corpore talia vasa sanguini eiusmodi transitum negatura essent; quia sanguis eiusmodi in sanis vere adest vel facile eam conditionem assumere potest, inflammatione tamen inde non sequente; quia post tres quatuorue ab inflammationis initio dies, hac licet adhuc subsistente, non amplius adest; quia ingrediens sanguis extremitates vasorum nonnisi accedente spasmò obstruit; quia denique multae sunt species inflammationis absque illa obstructione, ut in saluatione mercuriali, coryza, ophthalmia: neque conicam vasorum figuram huic obstructioni fauere, quandoquidem eadem figura ab iisdem causis, quæ globulum sanguinis impellunt, ampliato vase mutatur: accedit praeterea diuisibilitas globulorum sanguinis in minores, obstructionem praepediens. Congrumatus sanguis tunc demum inflammationem excitat, si tot vasa obstruit, ut impetu sanguinis in vasa serosa aucto in his extensio e. f. p. efficiatur. Motum sanguinis in vasis minoribus impacti non penitus cessare, docet rubor partis inflammatae: plenaria enim stagnatio (sphacelus) colorem obscuriorem sistit. Propter autem vero resistantiam minor copia sanguinis impellitur et mouetur, accedente etiam motu propter diametrum dilatatum retardato, quum docente hydraulica velocitates sint in ratione inuersa quadrati diametri vasorum. Ex motu hoc retardato propensio

iii

*) vid. Comm. nostr. Vol. XXXII. P. II. p. 292.

**) Ibid. p. 291.

in putredinem, et inde sublata nondum resorptione, febris inflammatoria: inde corticis peruuiani vsus in ea praecauenda et infringenda. Inflammationem ergo in parte affecta, non in massa sanguinis gigni. Ex his definitur inflammatio per motum sanguinis per vasa adeo exigua, vt in statu sano cruorem rubrum non transmittant: eiusque causa proxima ponitur in productione virium huic motui efficiendo parium. Varii inflammationis exitus in resolutionem, sphacelum, suppurationem, vel scirrhum. Ad resolutionem sanguis ipse impactus nihil conferre potest: sed causarum remotarum rationem haberi oportet, tollendo causam spasmi, siue illa sit acrimonia humorum, siue instrumentum irritans, siue inaequalis tensio fibrarum; vel compressionem vasorum venosorum; vel congrumatum sanguinem resoluendo et in massam humorum reducendo. Pus mere ex globulis sanguinis resolutis consistit: eo tamen genito motum humorum in vasis non cessare, docet experimentum, vbi hellebori albi frustulo in fonticulum illato diarrhoea excitatur. Sub hac solutione eae particulae, quae maxime in putredinem proclives sunt, separantur et in sanguinem redeunt: inde febris hectica phthisicorum. Ingens saepe expansio vasorum pus continentium, nec tamen disruptorum. Pus resorberi interdum posse, omnino verisimile. Suppuratio quum partes putridas ex loco affecto in sanguinem reducat, inde patet, cur sub eius exortu gangraena sistatur. Scirrhi ex coalitione vasorum, siue ob contractionem eorum spasticam, siue ob compressionem, ortus: eius transitus in cancerum occultum et apertum. Glandulae eidem praesertim obnoxiae ob tunicam eas inuoluentem, earum extensionem impredientem adeoque perpetuam compressionem efficientem. Vsus practicus huius doctrinae prae ea, quae causam inflammationis in den-

itate sanguinis ponit. Venaesectione sub initium ad minuendas vires cor et vasa nimis distendentes, ipsamque sanguinis massam, irritationemque, inflammationis causam: eius noxa imminente iam crisi, tunc demum expectanda, quum spasmus venarum sublatus est; item noxa eius, massa humorum particulis putridis inquinata. Purgantia antiphlogistica; clysteres; diaeta; aer; medicamenta antiseptica externa et interna, camphora, sales medii, potissimum nitrum (haec quidem, ut nobis videtur, nec perfecte nec distincte satis: sed nostri officii est, succincte ea tradere, quae Ill. Auctor vberius proposuit, iudicio lectoribus relicto), externe adstringentia, aromatica: ad discutiendam stasim inflammatoriam sanguinis a causa externa spiritus cochleariae cum vino paratus. Vbi nec a transpiratione aucta, nec a resorptione antisepticorum utilitas expectari potest, epithemata non calida, sed frigida conueniunt, ut in inflammatione cerebri, itidem ex spiritu cochleariae, suadente G. W. WEDELIO, superimposita adhuc aqua frigida seu arte frigidior reddita. Necessitas examinandi causas praegressas inflammationis easque remouendi. Cura gangraenae et sphaceli: euacuantia; antiseptica; scarificationes; causae remouendae: in addita annotatione Cl. Editor de noxis ex nimis arcta fasciarum applicatione differit. Suppuratio quando iuuanda. Tandem ex recentiori Ill. Auctoris tractatu 1778. conscripto de iis, quae ars valeat in scirrhus. Fieri potest, ut interdum scirrhus sponte, aequae ac verruca seu clauus pedum, euanescat: ad quod obtinendum credibile est conferre aliquid posse denegatum accessum humorum ad eum, vel debilitatam aut sublata actionem nerui ad eum tendentis (inde vis remediorum ex classe plantarum venenatarum), vel affluxum acrimoniae cuiusdam, v. c. venereae, ad eum impeditum. Inde tamen ob-

structio.

structionem vasculorum minimorum glandulae cuiusdam ab humore viscido ex caussis scirrhi se non excludere monet. In deligatione post exstirpatum scirrhum summa cautio adhibenda, ne vlllo modo compressio existat. Nullum aduersus scirrhum remedium existere, quod eidem curando semper par fuerit (in puella cancerum faciei apertum vnguento spissiore ex axungia curruum, quatuor partibus farinae secalinae et radice gentianae sanauit Ill. Auctor, eodem remedio aliis in casibus effectu destituto): neque constare, quis scirrhus, et quibus remediis, curationem admittat nec ne.

III. THOMAS BOLTEN, *pharmacopola Monasteriiensis, effectus lethiferos cicutae describit, quum quinque milites Hanouerani 23. Mart. 1762. herbam hanc ole- p. 255.
ris loco comediissent (Monasterii 1762.)* Iam sub prandio ex herba cum pinguedine quadam cocta singulorum risu corripiebantur, eoque vix finito vnus debilitatem visus querebatur; vix elapso quadrante horae amentes reddebantur; post dimidiam horam concidebant, motu voluntario prorsus sublato; lethargus; denique sub conuulsionibus mors, in tribus sesquitertia post prandii initium hora, in reliquis duobus vix dimidia hora post. Sextus nonnisi cochlearia aliquot assumerat, qui, delirio correptus, emetico seruabatur. Altero die vnus cadauer secabatur: scrotum liuidum, maculae aliquot in superficie corporis, praesertim sub hypochondriis; intestina vacua, inflata, pellucida; ventriculus herba (radicis nullum vestigium) vbique repletus, niger; pectus sanum; cerebri vasa turgida, hinc inde etiam guttis aliquot sanguinis extra vasa missis. Curiosius examen alia chirurgi officia impediuerunt. Cl. BOLTEN asserit, se diuersas cicutae species solo odore optime discernere posse: hanc, quam viderit et a cuius esu milites dehortatus fuerit, fuisse speciem maiorem;

superstitem bonum saporem oleris praedicasse, nec, quod reliquum fuerit, odorem tetrum, conio maculato etiam post coctionem proprium, obtulisse (videtur ergo fuisse cicuta virosa). Huic igitur relationi subiungit epistolam Ill. HOFMANNI ad se directam, in qua utilitatem remediorum externorum ad curationem morborum internorum, et praecipue usum externum cicutae interno extracti eiusdem iunctum commendat, solummodo resolutionem glandularum induratarum tumorumque respiciens (Monspelienses *emplastro* de cicuta interne usos esse, sine dubio typographi est error). Femina 38 annorum tumore scirrhuso mammae laborabat, ad emplastri et cataplasmatismatis ex cicuta usum rebellem; internum extracti usum nec in pilulis nec in solutione cum aqua cinnamomi ne minima quidem dosi ferebat; suavit igitur Ill. Auctor balneum tepidum ex infuso recentis herbae, panno duplicato super labrum extenso et circa collum firmato, ne vapor caput tentaret, quem in finem etiam acetum naribus admovebatur; hoc remedio quum quotidie, paucis diebus exceptis, ad dimidiam horam usa fuisset, post sex hebdomades prorsus convaluit. Aeger asthmate et hydrope ab arthritide retrogressa laborans, optimis remediis antea irritis, quatuor eiusmodi balneis simul in usum ductis restitutus est; quibus quamdiu usus est, perpetuo saporem cicutae in ore percepit, et adstantes etiam post coenam similem odorem senserunt. Femina 45 annorum, cancro mammae iam rupturam minante novem balneis intra tres hebdomadas multum levata est, curationique tunc temporis, quum haec scriberentur, propior reddita. Animadversiones quaedam: in parando extracto plures partes activas perdi, quam in balneo; medicamenta per superficiem externam corpori illata minus mutari, quam ore assumpta; hyemali tempore forte extra-

tum.

Etum efficacius futurum videri, quam balnea, tunc nonnisi in herba siccata parabilia; vbi difficilius adhiberi possint balnea, tentandum, quid herba lectis instrata praestet. Rursus relatio cancri faciei curati, cuius iam in tractatu antecedenti mentio facta fuerat. An in tussi conuulsiva balnea vel semicupia ex infuso picis liquidae, vel ex sulphure et calce viua? quaerit Cl. Editor. Halitus cicutam redolens excitat ideam vires eiusmodi balneorum vel ex aliis plantis paratorum in phthisi tentandi. De efficacia remedium externorum, ad obseruationem b. DE HAEN de verbena *). Consilia instituendorum eiusmodi experimentorum.

IV. *De bona methodo medendi variolis, nouoque p. 293. efficaci remedio in malignis et confluentibus, quod primo tentamine admodum proficuum se probauit (Monasterii 1764.).* Exordii loco vindiciae scientiae medicae aduersus obtrectatores eiusdem, ex maiori securitate aduersus morbos olim adeo perniciosos, luem veneream et variolas. Commodis ab insitione repetendis multum detractum iri, si numerus eorum, qui ab insitis variolis moriantur, non comparetur cum iis, qui naturalibus sibi ipsis relictis aut peruerse tractatis obierint, sed qui bona methodo curati fuerint: sibi per viginti duos annos nonnisi duos infantes, vno patre vsos, periisse, quod tamen ipse raram fortunam dicit, numquam accedentibus momentis morbum aggrauantibus. Praeparationem aequae ac ante insitionem locum habere. Commodum insitionis in opportunitate temporis et benignitate epidemiae ponendum compensari eo, quod permulti ab eodem morbo immunes senectutem attingant, neque, qui iisdem prorsus non sint obnoxii, in epidemiis periculum incurrant (verum vltima huius tractationis verba p. 361. sunt: „variolae nonnisi perpaucis par-

T t . 4

cere

*) Vid. Comm. nostr. Vol. XII. p. 141.

cere solent“ — sed repetimus, quod iam fassi sumus, nos hic non censorum, sed, quod aiunt, referentium tantum munere fungi). Dubium esse, an insitio hominibus parcat. Insitioni igitur apta variolis medendi methodus praeferenda est, hic exposita, quam nunc praeterire possumus: in ea prima etiam mentio fit amplioris operis, de quo proxime differemus. Variolarum verarum reditus prorsus negatur, huiusque sententiae probatio in eodem opere promittitur. Iam historia morbi matronae nobilis, variolis confluentibus pessimis laborantis, in qua nec potus acidus (elixirii acidi Dippelii drachmae duae ad mensuram aquae et sex uncias syrupi cuiusdam), nec corticis peruuiiani largior usus, nec camphora in clysteribus, nec epispastica multum praestiterant, quare 6. ab eruptione die mixturae ex camphorae in vitello ouorum (cuius indolem septicam multum superet vis camphorae) solutae drachmis duabus cum aquae cinnamomi s. v. uncis tribus totidemque syrupi rubi idaei omni bihorio cochlear maius, circiter grana viginti camphorae continens, porrigebatur, quarta autem dosi ab aegra, paullum ad se reuersa, repudiata, uncia una cum semisse quavis sesquialtera hora vt enema iniiciebatur, sinapismis simul addita camphora plantis pedum impositis. Quum haec, iunctis euacuantibus, malignitatem morbi nondum vincerent, sed symptomata funestissima redirent, die 11. camphorae solutio aqua rosarum diluta linteis illinebatur, corpusque, excepta facie, iis intra 16 horas ter renouatis inuoluebatur, clysteribus ex cortice peruuiano et camphora interpositis, vnde tandem adhibitis remediis aptissimis aegra in sanitatem rediit, odore summe cadaueroso faecum tamen nonnisi elapsis tribus hebdomadibus euanescente: camphorae in toto morbi decursu adhibitis uncis octoginta! Sub stadio exsiccationis, die 23. ab eru-

eruptione, abscessus parvus in regione temporali sinistra, isque vnicus in toto corpore, oriebatur, qui altero mane excitato dolore punctorio vehementi oculi euanescebat, quem leuis eiusdem inflammatio et plenaria caecitas sequebantur, sed post tres dies iam imminuta, post sex prorsus sublata, nullo remedio, nisi aqua ophthalmica quadam, adhibito. Tandem quaestiones quaedam practicae de tentando vltius camphorae in variolarum diuersis stadiis aliisque febribus malignis et ex putrido fomite ortis vsu.

V. *Confirmatio peculiaris virtutis noui remedii in p. 363. variolis malignis et confluentibus — cum defensione methodi medendi Ill. HOFMANNI, aduersus Cl. C. H. SCHÜTTE iun. Cliuiae, auctore CAR. HOFFMANN, M. D. Gronauiae (Monasterii 1765.).* Acidum vitriolicum, licet putredinem praeuertat, praesentem tamen non coercere. Insufficiencia atque adeo noxa remedii a Cl. SCHÜTTE ad praecauendas variolas earumque cicatrices in facie propositi, laruae ex panno laneo confectae; virus variolosum specificè faciem petere, cuius rei probatio vberior promittitur. De opii vsu sub eruptione: vinum et spiritum cornu cerui eidem nullo modo ad tollendum spasmum variorum cutaneorum equiparari aut substitui posse; vanum esse metum conuulsionum aut putredinis ab eodem. Opium et acidum vitriolicum sibi non contrariari. Virtus eximia camphorae nouis obseruationibus Cl. TRAMPEL aliorumque comprobata.

VI. *Argumenta pro insitione variolarum et contra p. 429. eam, in dialogo (1765).* Inter nobiles episcopatus Monasteriensis quartum quemque adultum variolas non passum mori. Indices mortuorum nihil probare, quum his etiam ii inferantur, qui absque auxilio conueniente perierint. Commoda insitionis ponenda esse vel in diuersitate materiae variolosae, vel rationis eam applicandi, vel morbi ipsius, vel circum-

stantiarum: omnia ista in naturalibus aequè obtineri posse ac in artificialibus. Matronae istius illustris, superiori tractatu memoratae, infantes, cum ipsa conualesceret, contagium ab ea susceperunt, morbo benignissimo inde enato. Circumstantiarum tamen diuersitatem in inferioris sortis hominibus magis fauere insitioni, ab opulentioribus quippe melius ordinandarum. Argumenta moralia consulto non tanguntur.

P. 443. VII. *De modo tractandi variolas (in litteris Moguntiam scriptis 1768).* Mors a variolis per se inductae putredini humorum debetur. G.W. WEDELIVS iam ante BOERHAAVIUM vires hydrargyri aduersus variolas vsu perspexit. Ill. Auctor a plus quam viginti annis pilulas ad variolas tanquam arcanum, ne contradictiones aliorum incurreret, adhibuit, quarum praeparationem nunc eam tradit: mercurius dulcis in subtilissimum puluerem redactus immittatur in mortarium lapideum calefactum, ibique pariter caleseat, quo omnis humiditas dissipetur. Tunc adfundatur quidquam spiritus vini tartarifati, isque tempestate sicca deflagret, quod ter repetatur, mercurio sub ipsa deflagratione frequenter filo ferreo agitato, operaque adhibita, ne vel minimus ventus flammam intempestive extinguat. Ex huius mercurii deflagrati granis quindecim opemicae panis fiant pilulae viginti. Praeparationis loco cum ante insitionem, tum grassantibus variolis naturalibus, nisi peculiaria adsint momenta mercurialium vsu vetantia, tertia quaque vel quarta die ante somnum exhibentur harum pilularum infanti tot, quot annos natus est, ad vltro quindecim, vsu tam diu protracto, donec aut non amplius purgant, aut vermes amplius non eiciant. In scorbuticis mane post pilulas exhibetur aestate manna cum cremore tartari, hyeme extractum catholicum; tunc diebus intercalaribus decoctum

ctum bardanae aut sarsaparillae. In iis, qui antea febre intermittente laborauerunt, eodem temporis spatio corticis peruiani sesquiuncia. Diaeta simul sit antiseptica, vitetur nimius motus corporis. Si necessitas vrgeat, insitio protinus suscipitur, vel materia recenti, vel filis, laesione quam fieri possit minima: fila non diutius 24 horis relinquenda, nisi quum adglutinata fuerint, tuncque expectandum, donec sponte decidant. Sed ab hac insitione praeparatio iam descripta adhuc adhibenda est, donec initia morbi se ostendant: pilulis frequentius propinandis, quum locus insitionis multum inflammatur. Si morbus cum pulsu accelerato, dolore capitis, lassitudine, vertigine, dolore artuum et dorsi ingreditur, protinus pilulae decem, altero mane lene euacuans danda sunt; numerum pilularum symptomata determinant. Sic etiam in initio naturalium, febre intensiore, nisi diarrhoea adsit, dosis pilularum per duos tresue dies repetenda, adiuncto simul, vbi calor multus, clystere refrigerante: etiam sub ipsa eruptione pilulae, sed nonnisi duae vel tres; in stadio exsiccationis iterum camphora externe, modo in prioribus descripto, adhibita, putredinem in variolis ipsis corrigit, antequam in sanguinem resorbeatur, quod nullis remediis internis effici potest, quae, quicquid vnquam expectari poterat, praestant, si sanguinem putridis particulis resorptis inquinatum quodammodo corrigunt. De reliquo autem monet Cl. Editor, camphoram reliquas causas mortis superare non posse, v. c. vermes, potus defectum, aeris inspirati vitia.

VIII. *De diuersitate morbi variolosi in genere* p. 471.
(1777). Non pendet a diuersitate contagii, sed corporum. Caeteris enim paribus, eo benigniores variolae, quo meliores succi, eoque maligniores, quo deteriores illi. Bona constitutio succorum optime ex prompta felicique vulnerum sanatione patescit.
Contag.

Contagium inspiratum nec in pulmones nec in ventriculum agit, sed in singulares glandulas cutaneas eius susceptioni vnice destinatas (haec est celebris illa Ill. Auctoris theoria, in operis maioris, cuius partem secundam proxime indicaturi sumus, parte prima stabilita); neque nausea vomitusque ab eiusmodi actione pendent, sed a miasmate in glandulis variolosis genito et in sanguinem transgresso: quare argumentum in fauorem insitionis petittum concidit, hic contagium cuti immediate applicari, non per circulum humorum eo deferri. Cur variolae artificiales plerumque parcius erumpant, quam naturales? neque ideo, quia per locum insitionis pus effluit, neque quia contagium extus applicatur; sed quia in naturalibus iam maior minorue gradus corruptionis humorum praecessit, insitione potissimum tunc optime succedente, quum vel prorsus non, vel parcissime grassantur variolae, commodissimo anni tempore, et quae sunt reliqua. Quatenus ergo prophylaxis in nostra potestate sita sit, docet.

P. 497. IX. *Disquisitio, in quantum internus mercurii usus ad praeparationem in morbo varioloso sit commendandus.* Exclusis iis, qui febribus, scorbuto, morbis veneris laborant, alia vitia cutanea, scabies, vlcera, ante insitionem praeparationem per mercurium ferunt, cuius vtilitas haec est, vt humores corrigantur, variolarum numerus minuatur (quod multiplex experientia Ill. Auctorem edocuit) et incommoda a vermibus metuenda auertantur. Similis est ratio variolarum naturalium. Remedii prophylactici ex mercurio et antimonio coniecturam non BOERHAAVIO, sed HELMONTIO et post eum ANDR. BUXBAVMIO (disp. de variolis haectenus in patria grassatis, praef. BOHNIO, Lips. 1679.) deberi, Cl. Editor monet. Dubia contra hydrargyri vsum: illum esse remedium potentissime resoluens putredinemque promouens, adeo-

adeoque noxium in morbo a putredine genito —
verum lues venerea itidem est morbus a putredine
genitus; eos, qui antea lue venerea per salivationem
liberati sunt, plerumque variolas malignas pati — at
dispiciendum esset, num virus venereum curatione
instituta perfecte victum sit (adderemus: viresque
corporis bonitasque humorum, corticis inprimis
peruvianii usu obtinendae, redierint) nec ne.

X. *Cur in aegris variolosis sibi ipsis relictis plerum-* p. 517.
que plurimae pustulae in facie, pauciores in manibus,
paucissimaeque in reliquo corpore erumpunt? et quomo-
do copiosior in facie praecauetur eruptio? Causa in
maiore gradu caloris istarum partium prae reliquo
corpore in quouis morbo febrili sita est. Neque ergo
vesicatoriis, neque pediluviis, neque obtectione iis-
dem immunitatem a variolis conciliabimus, sed sub-
trahendo calorem lecti aëris frigidi admissione, et si
hoc non suffecerit, crebra aquae frigidae applicatio-
ne. Calor etiam in aliis corporis locis maiorem pu-
stularum copiam prolicit. Cura faciei vel ideo ne-
cessaria est, quia, SYDENHAMO monente, copia va-
riolarum in ea periculi gradum definit. Regiminis
moderate frigidi usus sub febre eruptionis et eruptio-
ne ipsa. Dari tamen corpora, sed rarissime, in qui-
bus excedens adeo calor nonnisi paucas variolas
producat.

IX.

C. L. HOFFMANN, Sr. *Churfürstlichen Gnaden zu*
Mainz geheimen Raths, Abhandlung von den Po-
cken. Zweyter Theil, worinn die Pathologie der
Pockenkrankheit ferner berichtet und gezeiget
ist, warum der Mensch diese Krankheit nicht mehr
als einmahl bekommen kann. Mainz und Münster,
im Verlage der Perrenonschen Buchhandlung, ge-
druckt

*druckt in der Kurf. privil. St. Rochus Hospitals-
Buchdruckerey, durch F. W. Cordon 1789. 8.
mai. pagg. 326. praef. pagg. xciv.*

i. e.

C. L. HOFMANNI commentatio de variolis. Pars
secunda, in qua morbi variolosi pathologia
ulterius euincitur et monstratur, quare idem
hominem semel tantum adficere queat.

Quod prima pars operis huius *) in commenta-
riis nostris indicata non fuerit, ob eam forte
rationem accidisse arbitramur, quod, qui tunc eorum
curam gerebant, quod reliquum erat doctrinae, breui
sequuturum sperauerint. Itaque post interiectum
adeo longum temporis spatium lectores nostros vix
expectaturos postulatuosue putamus, vt ampliorem
istius primae partis notitiam exhiberemus. Sufficiat
ergo, paucis indicasse, secretiones diuersas in diuer-
sis organis a diuersa grauitate specifica particularum
secernendarum proficisci; causam variolarum esse
materiam putridam sui generis, a peculiaribus orga-
nis, nonnisi in cute existentibus, quae glandulas dicit
Ill. Auctor, contagio susceptam, ibi euolutam, et re-
grediendo massam sanguinis inficientem; glandulas
has pure collecto earumque orificium obstruente
eleuari in pustulas, suppuratione destrui, ideoque
reditum variolarum impossibilem reddi e. q. f. r.

In praefatione huius secundae partis primo loco
studiorum suorum, cum academicorum, tum conti-
nuatorum, rationem reddit Auctor (dissertationem
de attrahentium actione a seipso conscriptam esse
profite-

*) C. L. HOFFMANN'S *Abhandlung von den Pocken. Erster
Theil, worinnen die Erzeugung der Pockenmaterie und
anderer ansteckenden Krankheiten vor Augen gelegt
wird. Münster und Hamm. 1770. gr. 8.*

profitetur, de quo olim *) subdubitabamus); variorum tractatum vel iam editorum vel limae adhuc subiiciendorum (inter quos etiam tractatum de inflammatione, nuper a nobis indicatum, nominatum inuenimus) ortum tradit; quomodo ad conscribendum de variolis opus deuenit, exponit; breui contenta partis primae repetit, monstrans, quae vel minus accurata vel falsa proposita fuerint, vel omissa, inprimisque docens, cur nullus morbus contagiosus ab hominibus ad reliqua animalia transeat, et in his etiam, sola hydrophobia excepta, nonnisi eiusdem generis subiecta afficiat: nimirum quia singulis animalium generibus singularia sint organa secernendis humoribus dicata, iique ipsi in singulis generibus diuersi (ita v. c. animalia variolis non subiici, quia aut glandulis variolosis, aut eorum succo, aut vtrisque careant), fluidum nerueum autem, probabilis hydrophobiae sedes, in omnibus animalibus vni eidemque fini, sensui et motui, inserviat, ideoque opus non sit, vt in diuersis animalibus diuersae indolis existat. Postmodum prolixè satis fata partis primae (partem tertiam eamque vltimam iam in manibus amicorum esse asseuerat, ab iis forte perpoliendam lucique publicae tradendam; an igitur forsan huc spectant commentationes eae, quas Cl. CHAVET collectioni scriptorum minorum germanicorum iam inseruit, a nobis nuperrime indicatae?) recenset **),
et

*) vid. Comment. nostr. Vol. XXXII. P. II. p. 291.

**) *Allgem. deutsche Bib. B. XVI. St. II. S. 422. C. L. HOFFMANN'S Anhang zum ersten Theile von den Pocken, worinnen die angegebene Ursache von der Assimilation der ansteckenden Fiebersmaterie ferner erwiesen und die Existenz der Pockendrüsen außer Zweifel gesetzt wird. Nebst einem Kupfer. Münster, 1775. gr. 8. Huius recensio in Allg. d. Bibl. B. XXXIII. St. I. S. 138. C. L. HOFFMANN'S Nachtrag zum ersten Theile von den Pocken*

et inprimis multus est aduersus Cl. VNZERVM eiusque pathologiam morborum contagiosorum *) huiusque recensionem **); enarrata explicatione contagii per insecta et Vnzeriana per diuisibilitatem in infinitum, ex ingenii lusu aliam proponit, eamque satis lepidam, per semina minutissima, vegetatione quadam euoluenda; ac denique, quae ab iis postulet, qui doctrinam ipsius examinare ulteriusque perficere constituent, docet, et Cl. MOLITOR ob praestitum in hac parte edenda auxilium grates persoluit.

Sectio I. Semiotica morbi variolosi. Praemissa diuisione generali variolarum diuersa earum stadia considerantur, quorum sex assumit Ill. Auctor, nempe contagii vel praeparationis, febris eruptionis (quod, ne confusio oriatur, cum reliquis auctoribus stadium primum vocat), eruptionis ipsius, suppurationis, exsiccationis, et morborum subsequen-
tium. Stadium praeparationis certos limites non agnoscere, docet inoculatio: breuius tamen sex diebus non vidit, uti e contrario vnico casu (ex plus quam duobus millibus, ut inferius fatetur, a se inoculatis) decimo octavo demum ab insitione die febrem eruptionis accedere obseruauit. Singulorum stadiorum decursus sollicitè descriptus, exemplis egregie dicta illustrantibus

cken — Cassel. 1778. 8. Iam Cl. VNZER in scenam prodibat: *Ueber die Ansteckung besonders der Pocken. In einer Beurtheilung der neuen Hofmannischen Pockentheorie, von D. IOHANN AVGVST VNZER* — Leipzig, 1778. 8. C. L. HOFFMANN *beantwortet die Einwürfe, welche Hr. D. I. A. VNZER über die Ansteckung besonders der Pocken in einer Beurtheilung der neuen Hofmannischen Pockentheorie geliefert hat.* Münster, 1782. 8. IOH. AVG. VNZERS *Vertheidigung seiner Einwürfe gegen die Pockentheorie des Hrn. Geh. Raths HOFMANN.* Leipzig. 1783. 8.

*) Vid. Comm. nostr. Vol. XXVI. p. 577.

**) Allg. d. Bibl. B. LXXI. St. II. S. 410.

tibus vbique additis. Halitus foetens, interdum vnicum signum morbum praenuncians, ab vno eodemque cum febre variolosa fomite pendens. Primum apparens variola sub specie puncti rubri, morsurae pulicis similis, sed absque stigmate in medio; in hoc tactus tuberculum durum distinguit, futurae pustulae prodromum, quod si absit, efflorescentia cutanea rursus disparet. Felix, at rarus, morbi exitus pustulis ante suppurationem euanescentibus, probe discernendis a retrocedentibus, nimirum febre, virium prostratione aliisque symptomatibus absentibus. Cicatrices oriuntur, si, crusta decidente, subiacens cutis nondum consolidata fuerit; eoque profundiores, quo frequentius crusta formata fuerit: a crusta prima nullae vnquam enascuntur. Singulis stadiis morbum vel sanitate vel (excepto stadio praeparationis) morte terminari posse, exemplis adductis probatur: prius si in stadio praeparationis contigerit, inoculatione etiam postea incassum tentata, fieri potuit, vt eiusmodi subiectum a variolis per totam vitam immune creditum sit. Conuulsiones eruptionem antecedentes, variolis naturalibus frequentiores quam artificialibus, non plane negligendae, siquidem nonnunquam morte terminantur, nonnunquam graves morbos relinquunt. Variolas sanguineas in propria praxi nunquam obseruauit Ill. Auctor. Grauida vndecimo a morbi initio die angina mortua, fetus septimestris viuus exsectus est, sed breui post mortuus. In duobus infantibus insitis nonnisi initium febris eruptionis totum morbum absoluit, solummodo pustula insitionis periodos consuetas percurrente: alius tamen insitionem repudians, ab iisdem infectus variolas naturales subiit, quarum pure prius dicti rursus inoculati sunt, sed effectu nullo. Insitionem Ill. Auctor punctura peragit ope lanceolae, quam acu commodiorem inuenit; si pus vtrique in-

strumento rubiginem contraxit, illud inefficax est. De inoculatione per fila et siccatas pustulas in prima parte iam differuit. Aliam methodum inoculationis per fila sibi in mentem venisse, his ope acus inter cuticulam et cutim traiectis (eodem modo, quo exteræ quaedam gentes uti solent*). Inoculatio per vesicatorium ulceribus generandis fauet; pus gossypio exceptum vel cuti affricum non adeo certe inficit; certius, si emplastro vel vesica obtegatur, sed tunc facilis inflammatio. Incisio maior ulcera foeda producit. Locus in humero opportunior quam inter pollicem et indicem; in ultimo loco bis inflammationem et cariem ossium enatam vidit. Minus etiam opportuna insitio in pedibus, accedente etiam glandularum inguinalium inflammatione. Medicus quidam fama illustris infanti proprio turundam pure impraegnata naribus immisit: nasus et facies inflammabantur, subsequente sub febre eruptionis morte. Ad materiam insitioni aptam obtinendam sufficit pustulas parva incisione aperire, lymphamque pellucidam, non pus ipsum, excipere; haec ex vesiculis altero post eruptionem die obtineri potest, item ex humiditate loci insitionis inde a fine stadii praeparationis per quatuor subsequencia stadia. Pustulae insitionis, regionis insitionis, pustularumque localium siue earum, quae in regione insitionis propullulant, mutationes et decursus. Inoculatio pluribus in locis suscepta nullum in morbum influxum habet. Pustula insitionis absque periculo plerumque nigrescit et in vlcusculum fonticulo simile transit, nonnisi exsiccatis reliqui corporis variolis sanationem admissurum. Pus corruptum ad inoculationem adhibitum mala localia, inflammationes, ulcera foetida cet. producit, morbo tamen varioloso ipso non peiore reddito: sin autem miasma ex eiusmodi pure

*) vid. Comm. nostr. Vol. IV. p. 142. et Vol. VI. p. 322.

pure iam exhalauerit, eadem quidem damna, imo gangraena morsque ipsa, producuntur, neutiquam autem variolae. Praefagia ex consideratione regionis insitionis ratione morbi futuri. De variolis spuriiis: secundum ea, quae Ill. Auctori ipsi in praxi ob-
venerunt, tres earum species constituit, aquosas seu lymphaticas, duras seu acuminatas (*Steinpocken*), et innominatas. Variolae aquosae distinguuntur a veris absentia vel breuiore duratione (non ultra triginta sex horas) febris eruptionis, halitusque foetidi; celeritate eruptionis et exsiccationis variolarum; absentia veri puris, licet nonnunquam vna vel altera illud offerat adeoque cicatrices relinquat. Durae veris multo similiores sunt: differunt tamen absentia halitus foetidi, humiditate tertio die post eruptionem exsudante, duritie sub maturatione subsistente, quae ipsi disruptioni per compressionem tentatae resistit, et pruritu sub exsiccatione, ita vt infantes eas plerumque decerpant, sanguine inde profluente, sed nulla cicatrice relicta, quod tamen in cute minus sana fieri quoque posse non negatur. Tertiam speciem variolarum spuriarum peculiari nomine designare nequit Ill. Auctor, ideoque eas innominatas dicit: febris in iis modica; halitus foetor nullus; die secundo vel ad summum tertio exanthemata veris simillima, sed celerioris incrementi, et iam tertio ab eruptione die suppurantia, succedentibus interim inter priora aliis pariter inflammatis, ast non in sup-
purationem abeuntibus, sed vna cum prioribus sic-
catis; quae suppurant, non circulo rubro, sed macula rubra figurae irregularis ambitusque largi cinguntur; figura minor est quam verarum, basis rubra, pus tantum in apice; foetor non specificus, qualis in veris; sup-
purationis stadium trium circiter dierum; siccatio celerior quam in veris, quadraginta octo circiter horis absoluta. Omnes has species interdum

pro veris habitas fuisse, indeque opinionem variolarum recurrentium magis inualuisse. De diagnosi variolarum verarum ex signis essentialibus et accidentalibus. Sub febre eruptionis solus halitus foetens; altero eruptionis die vesicula in medio pustularum erumpentium, characteristicum TISSOTO signum, et postea foveola in pustula conspicua (quod tamen signum vniuersale non est); in suppurationis stadio, praeter signa anamnestic, absentia madoris in variolis duris deprehendendi. Signa accidentalia: infectio per variolas veras; febris, febre eruptionis similis; praegressum cum variolosis commercium, aut commoratio in loco infecto. Ad eruendam certitudinem, veraene fuerint variolae nec ne, sola inoculatio. Nullum existere exemplum variolarum verarum altera vice reuersarum, siue priores naturales fuerint, siue artificiales, et medicos magni adeo nominis, vti b. DE HAEN, in ferendo de iis iudicio deceptos fuisse.

Sectio II. Pathologia morbi variolosi. Multa hic ex parte prima eiusque appendice repetuntur atque vltius illustrantur ad refutandas Cl. VNZERI obiectiones.

I. *De glandulis variolosis.* Si variolae suppuranti cuticula demitur, in conspectum prodit particula cutis seu globulus super reliquam cutim eminens: inter hoc corpus et cuticulam haeret pus, facta etiam in cuticulam iterata incisione rursus colligendum, quod autem amplius non fit, corpore hoc destructo v. c. per traiectum filum. Ergo corpus hoc est glandula, pus separans; in principio, quum efflorescit, inflammata, sub maturatione vero suppurata. His respondent obseruationes Cl. COTTUNNII *), quas ideo

*) De sedibus variolarum syntagma, Vienn. 1771. 8. indicatum in Comm. nostr. Vol. XVIII. p. 411.

ideo Ill. Auctor appendici partis primae vna cum tabula aeri incisa inseruit. Infitio docet, glandulis his maxima in copia sibi proxime adiacentibus totam externam corporis superficiem oblitam esse: ulterius tamen non extenduntur, quam ad anteriora narium internarum et interiora oris. In partibus interioribus, quicquid dixerint alii, nunquam inuentae sunt. (In transitu etiam monetur, illum morbum exanthematicum, quem in ouibus et leporibus variolas dicere solent, in partibus internis non existere, sed in leporibus tantum hydatides inueniri.) Exemplum, vbi glandulae mesenterii suppuratae, aliudque, vbi aphthae pro variolis habitae sunt. Dubium quoque est exemplum a COTTUNNIO allegatum variolarum in bronchiis repertarum, quum anatomicae earundem disquisitionis mentionem non fecerit, neque vnquam in aliis locis internis easdem conspexerit. Vesicula in medio pustulae erumpentis se ostendens est ductus excretorius glandulae, orificio suo occlusus vel coalitus, qui quamdiu cum cuticula cohaeret, foueolam seu umbilicum efformat, ab eadem vero separatus eleuationem variolae et effusionem puris inter cuticulam et glandulam efficit: inde etiam repletio variolae pure per incisionem emissio patet. In statu sano ductus hic excretorius perspirationem cutaneam iuuat.

2. *De pure varioloso.* Omnes corporis humores sibi ipsis relictis odorem sibi proprium maiori gradu acquirunt, acidum alii, alii putridum: posteriorum alii, sub debitis conditionibus in alios ad putredinem dispositos agentes, horum corruptionem adiuuant, alii non; priores vere putridos, posteriores spurie putridos vocat Ill. Auctor. Prioribus pus variolosum accensetur, quod non modo foetor cadauerosus variolis demortuorum, sed etiam experimenta probant, quibus sanguis et caro puris variolosi ope prius pu-

tredinem contraxerunt, quam sponte euenturum fuisset. Quum ergo suis quodque humorum genus organis secernatur: pus est humor glandularum variolosarum putridus redditus. Pulmones eum suscipiunt, utpote organon depurationi sanguinis quam maxime dicatum. Non ergo generatur in sanguine: neque reliqua organa excretoria cutis idem suscipiunt.

3. *De contagio.* Ad corrumpendum humorem in glandula variolosa retardatio eius, pari modo ut urinae in vesica urinaria *), requiritur: retardatio haec obstructis et coalitis ductibus excretoriis glandularum efficitur, quae mutatio ab irritatione per acrimoniam proficiscitur, constricto prius, et, nisi brevi reseretur, oblitterato sphinctere. In corporibus demortuis putredo sola pus variolosum gignere nequit: si enim variolae iam ante adfuerunt, destructae sunt glandulae variolosae; sin minus, ductus excretorii earum oblitterari non possunt. Vero simile est, si humor glandularum variolosarum eodem modo, quo alii humores in corpore secreti, obtineri posset, eum in vitro occluso aequè corrumpi et contagiosum reddi posse, ac sanguinem in PRINGLIi experimento **). Quousque gradus putredinis et contagii in loco clauso augeri, et quamdiu hoc efficacitatem suam servare possit, docet notum illud exemplum contagii in Anglia aperto loculo hominis, qui ante triginta annos variolis occubuerat, per plures vicos sparsi. Obstructo licet ductu excretorio glandulae, secretio tamen in ea non nisi vase secretorio coalito tollitur, neque resorptio per venas: hinc regressus puris in sanguinem, febris eruptionis, exhalatio illius per pulmones.

4. *De*

*) BOERHAAVE El. Chem. T.II. Proc. 92.

**) vid. Comm. nostr. Vol.II. p. 402.

4. *De puris geniti effectibus in corporibus variolosorum.* Consideratio mutationum protinus ab insitione ad infectionis naturalis phaenomena declaranda viam pandit. Repetuntur ea, quae Ill. Auctor alibi, ut nuper vidimus, de inflammatione stabiliuit, et ad ortum variolae insitionis, aut, quum sub operatione glandula variolosa vel discissa vel pure acriore arrosa fuerit, vlceris inde nati applicantur. Rubor in regione insitionis a miasmate ex loco insitionis in viciniam sese expandente, glandulas variolosas irritante, inflammationisque gradum aliquem excitante; dispiciens, si minor sit irritatio. Variolarum localium origo ex iisdem causis. Dolor in glandulis subaxillaribus, vel insitione in pede facta, inguinalibus, a corrupto glandularum variolosarum humore vasis lymphaticis excepto: cur vero idem saepe rursus evanescat, humore tamen successu temporis maiorem acrimoniam adepto, Ill. Auctor lectoribus indagandum relinquit. Halitus foetens a resorpto ex glandulis variolosis humore acri, in pulmonibus iterum ex sanguine secreto et in vapores mutato, tunc demum contagioso, quum humor in glandulis ipsis ad eum gradum corruptionis cuectus est, qui contagium communicare valeat. Sub eadem conditione etiam contagium per cutim existit. Vtrumque nonnisi vno demum vel altero die ante febrim eruptionis euenit. Inde patet, insitionem pluribus in locis factam eruptionem non accelerare. Transitus etiam dictis ad variolas naturales. Incredibile est, quam parum contagii sufficiat ad corpus inficiendum, quod hic exemplo hominis probatur, qui illud in conclaui suscepit, in quo aegra decubuerat, ante plus quam quatuor hebdomades repurgato depuratoque. Contagii per inhalationem et miasmatis salivae admixtionem possibilitas non negatur, licet hi modi non semper necessarii sint. Contagii etiam tantam quantita-

tem ab vna glandula suscipi posse, quanta sufficiat ad inflammationem protinus, vt in insitione, excitandam, probant variolae sic dictae matres (*Mutterpocken*), solito maiores, ante febrem eruptionis apparentes. An primo contagio vna vel plures glandulae afficiantur, dubium: plerumque prius fieri, probabilius. Infectio continuata glandularum plurium eodem modo, vti post insitionem. Corruptio post infectionem vniuersalem celerior, quam ante eam. Febris eruptionis ortus ab aucta quantitate et acrimonia humoris glandularum variolosarum affecti, in sanguinem regurgitantis. Si vasa secretoria ductusque excretorii glandularum prius coalescant, quam humor in iis stagnans acrior reddi inflammationemque producere possit, variola non enascitur: quia etiam priori in casu nulla secretio amplius fit, necessario inde refluxus in sanguinem ideoque febris eruptionis cessat. Quintuplici igitur modo glandulae variolosae mutationem subire possunt: vel omnes ac singulae coalescunt, nulla inflammata (febris variolosa absque variolis); vel pleraeque coalescunt, vna tantum et altera inflammata; vel pauciores coalescunt, plures inflammantur; vel numerus inflammatarum numerum coalescentium multo magis superat (variolae concretae et confluentes); vel denique omnes inflammantur, nullis coalescentibus: vltimum casum nunquam vidit Ill. Auctor, eumque rarissimum, et, si vnquam existat, febre eruptionis mox ab initio nimis aucta breui exitialem futurum putat. Exitus inflammationis idem ac aliorum inflammationis generum: inde distinctio inter variolas euanescentes, suppurantes, sphacelosas, verrucosas. Euanescent variolae, si durante adhuc inflammatione ductus excretorii glandularum coalescunt, quod saepius accideret, nisi aucta perpetuo acrimonia hoc impediret: coalitionem vero partium sub ipsa inflamma-

inflammatione fieri posse, docet concretio pulmonis cum pleura durante pleuritide. Pus eiusdem originis est, ac pus aliarum partium inflammatarum (repetuntur ea, quae in commentario de inflammatione tradita sunt). Variolas nonnullas ante perfectam puris maturationem siccescere, ex coalitu vasorum fecernentium ductuumque excretoriorum, sublato inde affluxu humorum ad glandulam inflammatam, patet. Tardius hoc contingit, quum perfectam maturitatem adipiscuntur variolae: tuncque marcescunt, siccantur, et in crustis decidunt, sub quibus si cutis nondum conualuit, glandulae variolosae plus minus arroduntur ac in grauiore casu tandem cum notabili cutis particula consumuntur. Variolarum sphacelosarum et verrucosarum siue scirrhosarum considerationem parti practicae reseruat Ill. Auctor, id tantum monens, posteriores semper lethales esse, nisi demum in suppurationem, foedissimas cicatrices relicturam, abeant. Demonstratio impossibilitatis variolarum redeuntium ex coalitu seu destructione glandularum variolosarum: eas de nouo gigni posse, oeconomiae corporis nostri contrarium. Obiectio variolarum ab immediato contactu secunda vice excitatarum id tantum probat, glandulam coalitam a pure acri applicato inflammari posse: sed in ea ipsa contagium non amplius praeparari resorptionique febrem excitaturae, velut in morbo varioloso, aptum reddi potest. Magnitudo morbi variolosi a maiore gradu et longiore duratione febris eruptionis pendet, et haec a minore copia glandularum coalescentium temporisque spatio longiore, quo haec perficitur: et sic etiam vice versa. Quicquid ergo coalitionem hanc inuare poterit, febrem eruptionis ipsumque morbum mitiorem reddet. Febris haec, variolis copiosius enatis, vel tantum mitescit, vel perdurat: suppuratoria a maiore copia puris suppura-

tione acrioris facti ad sanguinem regrediente oritur. Symptomata eius, v. c. angina, parti practicae referantur. Iam ad eruendam causam, cur in vno subiecto citius, in alio tardius contingat ista coalitio? prius considerationem acrimoniae humorum praemittit Ill. Auctor, eamque ponit in aucta vi, solo contactu adeo agendi in solida, in quibus statu sano continentur, vt inde morbus partis, in quam agunt, sequatur; augmentum istud ab acquisita maiori propensione in corruptionem physicam, ergo a solutione, non ab indole mechanica, vti BOERHAAVIUS aliique statuerunt, proficiscitur. Inde patet, vti omnes corporis humores, sic praecipue humorem glandularum variolosarum, quo magis a naturali blanda indole recedat, eo magis illarum coalitioni fauere, et vice versa. Vt igitur morbus, quantum fieri possit, mitior reddatur, ad duo respiciendum est medico: nimirum vt corruptionem humoris glandularum variolosarum rite imminuat, et ipsum corruptum, quantum fieri possit, remoueat. Vtrumque autem quibus auxiliis praestandum sit, pars practica docebit.

X.

Instruzione intorno alla malattia convulsiva denominata Tetanos. In Verona. MDCCLXXXIX. Per gli eredi di Marco Moroni. 8. mai. pagg. 91. praef. pagg. 6.

i. e.

Instructio super morbo conuulsiuo, qui Tetanus dicitur.

Eadem instructio, quae ante aliquot annos gallico idiomate prodiit, hic Cl. CARRERE adscripta, et quum hic morbus subinde etiam in Italia, praecipue in regionibus montosis, obseruetur, in italicam linguam

guam versa. Cuius quum versionem germanicam (praeter quam etiam hispanicam existere, hic edocemur) olim indicauerimus *), nihil hic addendum arbitramur.

XI.

Fragmenta semiologiae obstetriciae, quae consensu gratiosi medicorum ordinis pro gradu doctoris medicinae die xxvi. Ianuar. MDCCXC publice defendet auctor FRIDERICVS GVILIELMVS VOIGTEL, Magdeburgensis. Accedunt tabulae sex aeneae. Halae. typis Franckianis. 4. pagg. 80. absque dedicatione et classium conspectu.

Libellum multifaria eruditione refertum Cl. Auctor, dignus Cl. MECKELII discipulus, in quatuor sectiones diuisit. Prima semiologiae medicae et obstetriciae notionem, huiusque ambitum, difficultatem, instituendae methodum, et dignitatem sistit. Ad semiologiam obstetriciam physiologicam pertinent 1. Semiologia genitalium mollium et mammarum adultae in statu pubertatis, virginitatis integerrimae, coitus perpeffi, post abortum aut partum praegressum; 2. signa pelvis bene conformatae femineae; 3. signa conceptionis; 4. signa grauiditatis verae, vterinae, eiusque periodorum; 5. signa fetus viui ante et sub partum; 6. dolorum signa distinctiua; 7. signa partus naturalis, perfecti; appropinquantis et instantis, eiusque temporum; 8. signa fetus perfecti, maturi, sani; 9. signa bonae nutricis; 10. signa status naturalis puerperae. Semiologia obstetricia pathologica sistit 1. semiologiam partium genitalium mollium morbosarum extragrauiditatem, grauiditatis tempore, sub partum et post eum; 2. pel-

*) Vid. Comm. nostr. Vol. XXX. p. 635.

2. pelvis vitiatae signa, seu totius, seu quarumdam eius partium; 3. signa sterilitatis; 4. grauiditatis spuriae signa; 5. grauiditatis verae, at extrauterinae, signa diagnostica; 6. signa fetus mortui grauiditatis tempore, sub ipsum partum, post eum; 7. signa abortus instantis; 8. signa partus praematuri; 9. signa partus serotini; 10. signa dolorum spuriorum; 11. signa generaliora partus non naturalis, anomali; 12. specialiora praecipuarum illius causarum: vel in matre a morbo locali aut vniuersali, vel a partibus inter fetum et matrem vitiatis, vel ab incauta et imperita manu, vel a fetu male conformato, numero excedente, peruerse sito; 13. signa puerperii morborum; 14. signa morborum neonatorum. Vsitatissimum medium signa diagnostica sensibus assequendi est exploratio cum externa seu abdominalis, tum interna seu vterina, quam nunc vterius pertractat Cl. Auctor, quem in finem, qua ratione, et sub quibus situs feminarum modis fiat, ostendens. Inter explorationem dolores ad partum excitari posse modo simplicissimo, pressione in ligamenta sacro-ischiadica, ex Cl. MECKELII versione BAUDELOCQUII.

P. 24. Sectio secunda partus non naturalis diuisiones secundum eius causas, deque diagnosi situs praeternaturalis fetus quaedam in genere exponit. Causae sunt 1. in matre: vitia organica et morbi locales genitalium, pelvis, labiorum vulvae, vaginae, orificii vterini, ipsius vteri; vel morbi dispositionesque vniuersales, aut partium magis vel minus in partus actu adiuuantium; 2. in partibus, quae nexum faciunt inter matrem et fetum: funiculi vmbilicalis vitia, placentae situs praeternaturalis, membranae a statu naturali aberrantes, aquarum quantitas peccans nimisque praecox effluxus; 3. in obstetricum vitiis omissionis vel commissionis; 4. in fetu: ex mala eius partiumque ipsius proportionem et conformationem, siue sint aberrantes.

aberrationes totius a statu naturali, siue singularum partium difformitates; ob numerum insolitum; ob situm peruersum extra vterum, vel in hoc ipso. Vltimum momentum speciminis loco vberius exponendum sibi sumsit Cl. Auctor, praemonitis quibusdam de acquirenda ope explorationis cognitione partium praeuiarum ferendoque inde iudicio de situ partium latentium.

Tertia igitur sectio de diagnosi partuum praeter- p. 35.
naturalium secundum eorum classes, ordines, genera et species agit, praemissis signis generalioribus partus praeternaturalis. Diuisionem, quam tabulae adiunctae mirifice illustrant, hanc constituit Cl. Auctor, a nobis nunc, omis- sis speciebus, repetendam.

Classis I. Situs praeternaturales *simplices*, in quibus eiusdem generis partes fetus ad orificium vteri conuersae.

Ordo I. Capitis situs praeternaturales.

Genus I. Situs faciales.

II. Situs occipitales.

III. Capitis latus dextrum praeuium.

IV. Capitis latus sinistrum.

V. Situs verticales.

Ordo II. Collum ad os vteri conuersum.

Genus I. Facies colli anterior.

II. Nucha et ceruix.

III. Colli latus dextrum.

IV. Colli latus sinistrum.

Ordo III. Trunci pars superior praeuia.

Genus I. Pectus.

II. Dorsum.

III. Humerus dexter.

IV. Humerus sinister.

Ordo IV. Trunci pars media ad vteri ostium conuersa.

Genus I. Abdomen delapsum.

Genus

Genus II. Regio lumbaris praeuia.

III. Regio iliaca dextra.

IV. Regio iliaca sinistra.

Ordo V. Situs praeternaturalis ob trunci partem inferiorem praeuiam.

Genus I. Regio pubis et facies anterior femoris obiacentes.

II. Nates ad os vteri conuersae.

III. Regio ischiadica dextra praeuia, seu partus natium imperfecti genus primum.

IV. Regio ischiadica sinistra praeuia, seu partus natium imperfecti genus alterum.

Ordo VI. Partus extremitatum inferiorum perfecti et imperfecti.

Genus I. Vtrumque genu praeuium.

II. Vtrumque crus facie posteriori, seu poplites et calces ad orificium vteri conuersi.

III. Partus agripparum perfecti.

IV. Genu alterutrum delapsum.

V. Facies posterior cruris alterius, vel regione poplitea, vel sura, vel calce ad os vteri conuersis.

VI. Partus agripparum imperfecti.

Ordo VII. Extremitatum superiorum vel vtraque vel singulae delapsae.

Genus I. Vtraque protuberantia cubiti a pectore delapsa.

II. Protuberantiae cubiti a dorso prominentes.

III. Vtraque manus a pectore prolapsa.

IV. Vtraque manus a dorso prolapsa.

V. Alteruter cubitus e latere propendens.

VI. Alterutra manus e latere propendens.

Ordo

Ordo VIII. Extremitates decussatim propendentes.

Genus I. Genua decussatim ad os vteri conuersa.

II. Pedes decussatim propendentes.

III. Manus super pectus decussatae prae-
viae.

IV. Manus e dorso decussatim prolapsae.

Subiunguntur huic classi velamenta, funiculus umbilicalis et placenta praeuia.

Classis II. Situs praeternaturales *compositi* et *mixti*,
in quibus vel vnus fetus partes diuersi gene-
ris, vel plurium variae partes simul praeuiaae.

A. Vnius fetus.

Ordo I. Capitis pars quaedam, cum funiculo,
vna vel altera extremitate superiori aut in-
feriori, vtraque alterutrarum, funiculo et
alterutra extremitate superiori aut inferio-
ri, vna extremitate superiori et inferiori,
ternis, quaternis, aut omnibus quinque
partibus.

– II. Trunci pars praeuia, simili modo.

– III. Genua et pedes vel singulatim vel con-
iunctim, aut vnum genu, aut vtrumque, aut
pes alter vel vterque, diuersa itidem con-
iunctione.

B. Plurium fetuum.

– IV. Caput vnus vario modo parte praeuium,
cum alius fetus hac vel illa aut pluribus
partibus.

– V. Trunci pars quaedam fetus alterius, pari
ratione.

– VI. Alterius extremitates et funiculus vel sin-
gulatim vel coniunctim cum alterius hac
vel illa pluribusue partibus.

Signa diagnostica in prima classe sollicitè vbique
exposuit, in secunda classe ex prioribus sponte pa-
tentia.

Sectio

P. 54. Sectio quarta de nonnullis impedimentis et difficultatibus diagnosis in arte obstetricia agit, a parte matris sunt vitia pelvis, labiorum, vaginae, vteri eiusque orificii: a parte adnexarum fetus partium, membranarum crassities, liquoris amnii abundantia, placentae in loco insolito adhaesio: a parte fetus, praeter aberrationem a structura naturali, facilitas situm mutandi, quae in fetu mortuo ob maiorem mollitiem flacciditatemque maior esset solet; cuius rei exemplum satis insigne sub auspiciis Cl. MECKELII observatum hic adducitur; contorsiones aliaeque destructiones artuum prolapsorum, tumores varii sub diuturno partu enati, ossa cranii sibi imposita, partes plurium fetuum simul prolapsae, e. s. p. Aberrat a structura naturali fetus vel excessu, vel defectu, vel situ partium peruerso ac mutato, vel fabrica aliena: singulorum exempla in capite, trunco et extremitatibus adducuntur. Fetus coaliti vel integri gemelli, vel integer cum parte alterius, vel ex pluribus compositi, quorum tamen exempla dubia pronunciantur. Sub finem quaedam de fetibus in vtero iisdem, quibus matres, morbis affectis, ubi memoratur fetus in museo Cl. MECKELII servatus, legitimo fere tempore exclusus, sed mox post partum mortuus, variolis a matre communicatis in vtero affectus, et facie tumida truncoque partim recentes variolarum cicatrices, partim insidentes adhuc escharas passim offerens.

P. 73. Accedimus ad figurarum explanationem, quae aberrationes quasdam a statu naturali fetuum sistunt, partim ab Ill. viris SELLE et MECKELIO, partim ab Auctoris Cl. patruo, medico Islebiensi, communicatas. Tab. I. Compages ossium hydrocephali interni ex infante recens nato. Os bregmatis sinistrum in duo triangula diuisum, magna interstitia membranacea inter has diuisuras osque frontis ac bregmatis sinistrum

Arum, multoque insigniora in parte posteriori in sutura sagittali et lambdoidea, ita ut fontanellae minoris et lateralis omnis species evanuerit; in his membranis multa ossicula diuersae magnitudinis et cohaesionis.

Tab. II. Fig. I. Cranium fetus perfecti, fontanella magna osse Wormiano perfecte occlusa. Fig. II. Fetus sexus (viti duo sequentes) sequioris, octo circiter mensium, cranio, cerebro et cerebello destitutus, cum spina bifida ad tertiam dorsi veteram decurrente, ceterum bene formatus, matre sana; liquor amnii in hoc et sequentibus naturalis. Margo cutaneus in utroque latere a nucha (collo fere nullo) incipiens et supra verticem usque protensus, pilis hirsutus; aures a capite multum distantes eiusque anteriora occupantes; bulbus oculi dextri ex orbita quasi protrusus, aequae ac sinistri superciliis carens; basis cranii, variis protuberantiis conspicua, obtecta tenui, molli, fusca et pulposa membrana, marginis cutanei productione, quae super vertebrarum colli corpora nuda usque ad tertiae dorsi interstitium continuatur, in qua etiam initium canalis medullae spinalis conspicitur.

Tab. III. Fig. I. Fetus alius octimestris, qui aequae ac antecedens vitae aliqua signa edidit. Cranii pars superior membranacea et ossea, cerebrum, cerebellum, medullae spinalis pars superior, prorsus absunt. Spinae bifidae ad vertebrae lumborum usque progressus. Collum brevissimum, aures humeris innixae. Membrana pulposa, marginis cutanei continuatio, tumorem fungosum omnem cranii basin obducentem constituit; in hac utrinque foramen ad duas lineas penetrans ad protuberantiam lateralem, quae pars petrosa ossis temporum esse videtur. Filamenta ex membrana, basin cranii obducente, producta inter spinae bifidae partes laterales in dorso decurre-

runt. Fig. II. Fetus septimestris, anterioris cranii partis maiore quam in superioribus fetibus superstita, sed cerebro, cerebello, theca cranii magnaue integumentorum communium parte destitutus, spina bifida usque ad orificium ani decurrente; tumor pulposus omne reliquum baseos cranii obtegens; processuum spinosorum vertebrarum radices nullae; neque inter illas filamenta, uti in priori fetu.

Tab. IV. Cranium ossium acephali spurii maturi cum palato et processu alveolari maxillae superioris fissis, ossibus nasi deficientibus, hincque processibus nasalibus maxillae superioris distantibus; parte orbitaria ossis frontis in duas portiones laterales diuisa.

Tab. V. Fetus octo mensium et quod excurrit, cum vitae signis quibusdam in lucem editus, sine genitalium et ani ullo vestigio, pectore valde deformi, depresso, praeter thymum et extremitatem superiorem pulmonis sinistri nihil continente; sacco hernioso insignis magnitudinis, pedimento ab integumentis communibus formato in dextro latere cartilaginis ensiformis adhaerente, pleraque abdominis et thoracis viscera continente, ita ut versus medium margo acutus hepatis, inferius gyri intestinorum pellucerent; funiculi umbilicalis parte pone eundem conspicua; posterius sacco cutaneo pone femur sinistrum dependente, lymphâ repleto, quo aperto spina bifida, foramine ovali definita, conspiciebatur.

Tab. VI. Fetus septem, ut videtur, mensium, capite, collo, brachiis, pectore, corde, pulmonibus, imò omnibus pectoris et abdominis contentis, praeter renem sinistram cum glandula suprarenali et particulam intestinorum, destitutus: loco manus dextrae massa mollis carnofo-adiposa, plicis et protuberantiis inaequalis, binis appendiculis, digitis haud ab-
 similibus, quarum altera ungue instructa erat, altera eo carebat; plica in coniunctione huius massa cum
 alia

alia massa molli deformi, ossibus prorsus destituta, brachium et antibrachium referente (in icone hae duae massae similitudinem brachii chirotheca vestiti habent); tumor adiposo-carnosus, mammae ad instar hypochondrium dextrum occupans, huicque similis, at maior, in latere sinistro cum processu cutaneo papilliformis. Incisis his prodiit cauitas superius costis absque sterno, inferius musculis abdominalibus imperfectis definita: in latere sinistro ren cum glandula suprarenali, in dextra massa fungoso-carnea, in medio saccus membranaceus, intestinorum partem ad orificium ani usque progredientem et funiculum umbilicalem continens, cum apertura ad eiusdem insertionem. Infimi ventris sedes vacua. Ossa femoris et pelvis adsunt: femur dextrum sinistro crassius; genu sinisterum cum magno tumore, plica profunda cutanea distinctum (cui plures similes in superficie externa corporis exstant); patella nulla; crus sinisterum dextro longius, inque eius anteriori ac inferiori parte processus cutaneus; pes sinister deformis cum duobus appendicibus digitorum ad instar; tarsi et metatarsi ossa nonnulla, digitorum nulla; ungues in utroque appendice. Femur dextrum cum simili, ut sinisterum, tumore; crus situ plane horizontali, aequae ac sinisterum ossibus instructum; dextri pedis planta sinistra multo perfectior, cum digitorum (ut ex icone apparet) vestigiis. Processus cutaneus, sesquipollicem longus, prope orificium ani; hoc ipsum cum vulua et praeputio clitoridis conspicuum.

XII.

PETRI CAMPER dissertatio de structura patellae et olecrani, figuris illustrata. Hagae Comitum, apud Isaacum van Cleef, MDCCLXXXIX. 4. mai. pagg. 75. tab. aeri incisae 2.

Vltimum hoc b. Auctoris opus ingrauescente iam morbo demum ad finem perductum est: editor eius, ADRIANVS GILLES CAMPER, defuncti filius, proxime se catalogum relictorum operum manuscriptorum publici iuris facturum pollicetur, quae auide certe a quouis expectatum iri persuasi sumus, acriter simul dolentes de descriptione ossium morbosorum musei ipsius, ne inchoata quidem, desperandum nunc esse, licet vel hoc ipso opere b. Auctor eamdem pollicitus sit.

P. 23. De patellae fractura iam 1754. dissertationem academicam Franequerae ediderat b. Auctor, cuius nunc, disquisitis istius laesionis speciebus in museis aequae ac hominibus viuis, diligentiusque explorata genu structura, supplementa additis iconibus quibusdam exhibet. Praemissa consideratione anatomica subnexusque quibusdam ex zootomia, et facta virium patellae computatione, docet, non a lapsu in terram dirumpi vel frangi patellam aut eius tendines aut ligamentum, sed lapsum sequelam esse laesionum istarum partium.

P. 7. Tensoris vaginae femoris tendinem, super condylum externum femoris et cristam tibiae insertum, a nullo anatomico memoratum esse, licet muscoli ipsius mentionem fecerint. Rumpitur ligamentum vel iusto maiori extensione ob nimis celerem actionem musculorum genicularium, vel vehementi ictu sub eadem extensione. Eodem modo quoque patella ipsa, rarius vtraque simul, frequentius alternis vicibus. Fractura longitudinalis rarissima: vnicum exemplum b. Auctori notum illud est, quod STALPART VANDER WIEL reliquit. Exacte transuersam fracturam nunquam vidit, sed semper plus minus obliquam.

P. 15. Discrimen essentialiale diuulsionis patellae per rupturam, et fracturae eiusdem a percussione. Diagnofis rupturae ex causis praegressis, immobilitate cruris post lapsum, maximeque

ex hiatu inter fragmenta: difficilior rupturae tendi-
 nis musculi recti et cruralis, ob intumescentiam
 protinus insequentem (in transitu quaedam de fra-
 cturis ossium non conferuentibus). Ligamenti pa- p. 27.
 tellae ruptura dignoscitur ex adscensu patellae ad
 femur: ita etiam huius fractura a vi externa. Dia-
 gnosis patellae in longitudinem fractae. Comminu-
 tio in plures partes, ob contusionem et intumescen-
 tiam aegerrime cognoscenda. Prognosis apud va-
 rios auctores varia, partim quod non omnes propriis
 observationibus vsi sunt, partim quod non attendunt
 ad diuersitatem temporis, quo claudicatio desinat.
 Ruptura tendinis recti et cruralis minus periculosa p. 31.
 videtur, tendinibus vastorum integritatem seruanti-
 bus, crurisque actione a tensore vaginae femoris ad-
 iuta. In viuis, quotcumque examinavit, nunquam
 conspexit fragmenta coalita, sed semper ad vnum vel
 duos pollices a se inuicem separata, quaquaversum
 mobilia, satis bono tamen incessu: ancylosin patel-
 lae nunquam, licet satis frequentem cum femore,
 nulla praegressa patellae fractura. Exemplum ra-
 rum perfecte coalitae patellae transuersim fractae
 cum paruo fragmento a parte interna, vna cum aliis
 fracturae exemplis etiam a Cl. SHELTONO iconibus,
 at iis minus exactis, expressum *). Duo alia patel-
 larum, ex parte conferruminatarum, in quarum al-
 tera margo et ima superficies cariosa quasi reddita,
 probabiliter a luxuriante sensim callo. Ligamentosae
 unionis exemplum illustre, fragmentis ope membra-
 naceae

Xx 3

naceae

*) Essay on the fracture of the Patella; or Knee pan,
 with observations on the fracture of the olecranon.
 London, 1789. 8. Versio germanica exstat in der
 neuesten Sammlung der neuesten und auserlesenen
 Abhandlungen für Wundärzte. II. Stück. Leipzig.
 1790. 8. m. K. S. I.

- naceae concretionis ex tendinibus enatae, vltra duos pollices longae, inter se iunctis; aliudque, illo memorabilius adhuc, fragmentis ad quatuor pollices rhenanos distantibus. Tendineam eiusmodi concretionem sufficere, vt patella etiam fracta officio suo fungatur, fragmento inferiore solo patellae integrae vices gerente. Fractura patellae ab ictu, praecipue instrumentorum bellicorum ope, summe periculosa, eo magis, quo maior comminutio articuli que ipsius destructio: an inde, exsudante ex partibus diffractis callo, ancylosis, dubium. Curatio rupturae patellae eiusque tendinum ac ligamenti, per tentandam concretionem tendineam genuque quietem eo respectu, vt tumor, dolorque sedetur, tendinumque reliquorum ruptura vltior et destructio praecaueatur: fractura complicata, a violentia externa producta, amputationem tempestiuam postulat, antequam caries vel meliceris enascantur. Quietem
- p. 48. nimium protractam rigiditas articuli insequitur. Specialiora curationis praecepta; fomenta variae indolis. Ex fasciis maxime laudanda ea, quae musculos geniculares modice comprimit. Pes altius collocandus, quam dorsum, non tamen recta linea extendendus, sed angulo facto cum coxae osse, vti pluribus Cl. SHELDONVS docet. Tumore, dolore, inflammatione sedatis, aeger surgat et scipionis aut alterius adiumento deambulet, donec restituto robore solus incedere queat. Simplicissimam hanc curandi rationem non, vti Cl. FLAIIANI existimat *), nouam esse,
- p. 60. sed iam ante complures annos WARNERO et POTTIO innotuisse. Fractura in tenuibus genu partibus auxiliis generalibus indiget: quiete diuturna, vt directe inter se concrecant fragmenta, et femur cum tibia, situ in linea recta seruato, ne obliqua cruris directio a musculis flexoribus inducta, quum geniculares

*) Vid. Comm. nostr. Vol. XXXI. p. 470.

culares punctum fixum amiserint, incesum difficilior-
rem reddat.

In consideranda olecrani fractura prius eius com- p. 63.
parationem anatomicam cum patella instituit b. Au-
ctor, posteaque duos, qui ipsi obuenerunt, casus enarrat,
in quorum utroque olecranon cum vlna non imme-
diata, sed ope membranae coaluit, motu libero reli-
cto: quare eodem, quo in patellae laesionibus, modo
chirurgum agere debere monet, agglutinationem
non moliendo, datumque iam a CELSO *) consilium
sequendo.

XIII.

ANTONII IACOBI VAN DOEVEREN, medicinae Do-
ctoris, observationes pathologico - anatomi-
miae. Cum figuris. Lugduni Batauorum,
apud Sam. et Ioh. Luchtmans, MDCLXXXIX.
4. mai. pagg. 49. sine praef. tabulae aeri in-
cisae 3.

Inauguralis est dissertatio digni paterni nominis hae-
redis, et utique mutato titulo in publicum prodire
digna. Tres continet observationes, quarum binas
priores Cel. SANDIFORT Cl. Auctori communicauit,
ultimam hic ipse conscripsit. Tabulae I. et II. obser-
uationem primam, III. ultimam egregie illustrant.

Obs. I. Cadaver feminae vlsibus anatomicis desti-
natum, de cuius praegresso morbo mortisque ratione
nihil innotuerat, nisi ipsam subito exspirasse, praeter
incipientem ouarii dextri hydropem, spinae dorsi
multiplicem incuruationem vertebrarumque qua-
rumdam ancylosin, costarumque situm mutatum,
obtulit ventriculum ingenti copia sanguinis partim
fluidi, partim coagulati, qui et in duodenum transie-
rat, plenum: vltiore indagatione fons eius dete-

X x 4

Aus

*) Libr. VIII. Cap. X. §. 4.

Stus est, erosio oesophagi et aortae, eo in loco, ubi sibi inuicem adiacent, materia ichorosa ad pulmonem sinistrum progressa, sub cuius membrana exteriori, separata et tumidula, sese effuderat. Vlcus admodum late per oesophagum extendebatur, in aorta ultra duos pollices, aperturae marginibus crassis a destructis tunicis exterioribus, interius fluctuantibus duabus lamellis, nonnisi exiguam fissuram ab impetu sanguinis pendentem inter se offerentibus, a tunica interna relictis; ceterum aorta et oesophagus sana. Mutationem hanc morbosam praegressae inflammationi adscribendam esse, admodum verisimile videtur. Mitioris morbi exitus per suppurationem, licet omnino rarioris, duo exempla enarrantur, alterum a Cl. BLEVLAND in se ipso obseruati. In praesenti casu pus exulcerato oesophago per contextum cellulosum ad aortam transiisse, docet sectio alius viri, in quo praeter destructum ferme totum pulmonem dextrum ab abscessu simili vlcus in oesophago ad vicinam aortam progressum, hac tamen nondum prorsus penetrata, detectum fuit. Similem casum nullibi consignatum inuenit Cl. Auctor, quem enim Cl. DE SAUVAGES allegat *), potius ingenti aneurysmati aortae, continuato inde in oesophagum vlcere, quemadmodum alium a Cel. HUNTERO adductum **) simili aneurysmati cum aspera arteria communicanti, adscribi debere docet.

Obs. II. Femina iam a iuuentute de deglutitionis molestiis, accedente interdum vuulae elongatione, quæsta, aucto sensim malo, glandulis colli et thyreoidea induratis, deglutitione demum prorsus impossibili, febre lenta, anxietate tussique molestissima cum sputo sanguinolento, amurcofo, foetidissimo, 51. ætatis anno obiit. Sectione apparuere glandula
in

*) Nosol. method. T. II. p. 298.

**) Medical Observations and Inquiries, Vol. VI. p. 23.

in latere dextro colli, ultimo vitae tempore disparuisse visa, nucis iuglandis magnitudine, iugulari interna firmissime accreta, mollior et materia amurcosa, pultacea, granulosa quasi, plena; glandulae in inferiori colli regione induratae multumque tumefactae; thymus insolitae magnitudinis, non tamen consueto durior; glandula thyreoidea durior et tuberculata; oesophagus superius tactu durior, ibi vero, ubi dolorem et obstaculum in depulsione alimenterum senserat aegra, magis praecipue dextrorsum expansus et tumidus, tunicis tenuissimis, quae vel leviter tactae materiam tussis ope reiectae similem emittebant; superficies eiusdem interna erosa, ulcere in pharynge ad cartilagineas arytaenoideas extenso; inferior cartilaginis cricoideae margo totus nudus, in substantiam osseam mutatus, et infra eum apertura sursum in laryngem penetrans; in parte membranacea arteriae asperae duo foramina ad interiora ipsius penetrantia, per quae materies ista, sine dubio etiam potus et medicamenta, transierunt, unde non tantum vasa aerea, sed ipsi quoque pulmones scatere eadem conspiciebantur. Similis propemodum casus enarratur a Cl. LE CAT, cuius olim paucis mentionem fecimus *), aliusque a Cl. BLEVELAND in libellis a nobis indicatis **), pulmonis dextri ubique, maxime vero in sacco eius medium occupante, materia grisea, densa atque grumosa, lacti corrupto simili, repleti, et per aperturam marginibus scabris, valde inaequalibus et crassis cum oesophago communicantis, oesophago inferius admodum contracto.

Obs. III. Femina 59. aetatis annum agens, per triginta fere annos continuo quæsta de dolore in epigastrio, ad viciniam etiam se extendente, variis

X x 5

modis

*) Vid. Comm. nostr. Vol. XVI. p. 95.

**) Eorund. Vol. XXVIII. p. 60. et Vol. XXXI. p. 547.

modis excrucitata, demum subinde sanguinem, saepiusque sputa admodum tenacia cum sanguine mixta summos inter dolores emittens, ab omnibus ingestis maximas anxietates perpeffa, tandem symptomatibus auctis multoque sanguine eiefto viribus exhausta periit. Intestina liuida, coagulato sanguine distenta; ventriculus in loco, solito depreffiore, ad vmbilicum se extendens, multo itidem sanguine grumoso refer-tus: pancreas maxime induratum, fere cartilagi-neum, superius cum ventriculo concretum parte cir-culari, in medio exulcerata, margine ventriculi cal-loso; superficies pancreatis eo in loco tuberculis in-aequalis, foraminulis ex arteriae coeliacae ramo lienali hinc inde obsita, alio maiori ductus pancreatici ori-ficium sistente, qui altero fine duodeno inferebatur; ceterum ventriculi superficiei interna parum mutata, nisi quod admodum rugosa et vbique muco tenaci obducta esset. Quae huius vlceris origo fuerit, non constat. Filia huius feminae natu minor, de reliquo bene valens, saepe de similibus symptomatibus sen-suque grauitatis ac doloris in epigastrio, praecipue instantibus menstruis, queritur, nonnunquam etiam ingesta euomit, vnde metus nascitur, ne eiusdem mali initium adsit.

XV.

Osservazioni mediche e chirurgiche intorno alle facoltà febrifughe ed antisettiche della cor-teccia dell' ippocastano raccolte da ANTONIO TVRRA medico - filosofo, socio di molte acca-demie, ec. Vicenza. 1788. nella stamperia Turra. 8. mai. pagg. 110.

i. e.

Obseruationes medicae et chirurgicae super vi-ribus febrifugis et antisepticis corticis hippo-castani, collectae ab ANTONIO TVRRA.

Qui

Qui olim iam super viribus corticis huius libellum ediderat Cl. Auctor ^{a)} iam supplementa quaedam ipsi subiungit, a nobis nunc indicanda. In praefatione monet, se ex propria experientia dubitare, num arboris huius usus oeconomicus tantus sit, quantum bb. HALLERVS ^{b)} et SCOPOLI ^{c)} praedi-p. 8. carunt.

Extractum epistolae Cl. IOH. IAC. ZANICHELLII p. 9. ad Cl. IVL. BONFEDERA ^{d)}.

De vi febrifuga et antiseptica corticis hippocastani, p. 24. ex opere coronato Cll. COSTE et WILLEMET ^{e)}. Vtriusque epitomes exhibendae otium nobis fecit Ill. MURRAY ^{f)}. Nimis composita ad verum effectum remedii constituendum videtur formula elotuarii ex pulueris corticis vncia, gratiolae scrupulis duobus, salis fixi asari (!) drachma, et syrupo florum persicorum, cuius singulae dosi decoctum cichorei sylvestris superbibendum praecipitur.

Obser-

a) Della febbrefuga facoltà dell' ippocastano, lettera ed osservazioni di ANTONIO TURRA, dirette al Nobile Sig. CONTE ANTONIO MARIA PORTO. In Vicenza. 1780. 8. Teutonice vertit, praefationem annotationesque adiecit Cl. BVCHHOLZ, Weimar. 1783. 8.

b) vid. Comm. nostr. Vol. XVI. p. 664.

c) Eorund. Vol. XVIII. p. 640.

d) Raccolta d' Opuscoli scientifici, e filologici, da ANT. CALAGIERA, T. X. in Venezia. 1734. 12. p. 187.

e) Essais botaniques, chimiques et pharmaceutiques sur quelques plantes indigenes, substituées avec succès à des végétaux exotiques, auxquels on a joint des observations médicales sur les mêmes objets. A Nancy. 1778. 8. p. 57.

f) Appar. medicam. Vol. IV. p. 66. seqq.

P. 30. *Observationes Cl. LEOP. MARC. ANT. CALDANI.*
In quinque aegris, febre tertiana duplici laborantibus, quae cortice peruuiano profligatae redierant vel eidem prorsus non obsequutae fuerant, decoctum vnciae corticis ramorum tenuiorum cum libris duabus aquae ad consumptionem dimidii, interdum addito cochleari maiori tartari crudi, optatos effectus praestitit.

P. 33. *Epistola Ill. COMITIS FERD. GVALDO ad Cl. Editorem VALLISNERIVM* iam remedii huius mentionem fecisse. Eius efficacia quatuor observationibus comprobata, in febre tertiana inflammatoriae indolis, in qua aeger corticem peruuvianum repudiabat; in tertiana saepius recurrente, continuato demum, etiam suppressis paroxysmis, vsu deuicta; in tertiana duplicata, et in tertiana cum epilepsia coniuncta, in qua itidem peruuiani corticis vsus irritus fuerat. Consilia de modo optimo colligendi siccandique corticem.

P. 44. *Litterae Cl. LARBER ad Ill. GVALDO.* Ex numerofo grege aegrorum a febribus intermittentibus hoc remedio liberatorum (ex quibus tamen nonnisi in duobus quartanam vicit, in quibus cortici nostro purgans aut resoluens quoddam addit, quod in tertianis non semper facit) observationes sex febrium tertianarum et duae iam memoratae quartanarum: primo dedit sesquiunciam in octo dosibus, horis quaternis inter duos paroxysmos, hac autem non sufficiente, duas vncias iisdem dosibus, in quartana duas cum semisse, additis salis cathartici anglici drachmis decem vel minus. In quartana corticem peruuvianum, in tertiana hippocastani praestare. Necessitas continuati ipsius vsus, febre licet profligata, sed tunc parioris.

P. 55. *Extractum epistolae Cl. LUDOVICI TARGIONI*
P. 56. *ad Cl. Editorem, aliusque Cl. IOS. ANT. MACCARI-*

NI, qui eius effectus in omni fere febrium intermittentium et remittentium adeoque perniciosarum genere depraedicat.

Observationes practicae Cl. CAIETANI FORNA- p. 58.
SA de viribus antisepticis et antinecroticis corticis nostri. Vndecim exemplis vsum externum simplicis decocti declarat, etiam in vlceribus faucium venereis, chronicis crurum cum ipsa carie coniunctis; infinito experimentorum numero eo deductus est, vt relictis omnibus aliis decoctis antisepticis hoc solo vtatur.

His praemissis Cl. Editor synonymiam, locum p. 62. natalem et descriptionem botanicam arboris exhibet, partemque efficacissimam, comparatione per experimenta instituta, declarat corticem exteriorem bene ab alburno separatum, praecipue ramorum maiorum; eo meliorem, quo magis soli pateat, inque loco arenoso et elato posita fuerit arbor. Ab exeunte aprili in iunium vsque, vbi succis scatet arbor, collectus is cortex ex vnica drachmam extracti garayani largitur. Ad parandum tamen decoctum, quod efficacius existit a cortice recenti, sub quouis anni tempore colligi potest, modo ab alburno lignoque probe purgetur. Siccandus in loco vmbroso sicco, nec, nisi quum eodem vti animus est, in puluerem vertendus. Decoctio paratur ex vncia corticis recentis vel siccati, minutim concisi seu contusi, ad quamlibet libram aquae communis donec dimidium consumtum fuerit; tum fortiter exprimenda et frigida servanda. Ad extractum parandum vnciae duae corticis contusi per biduum aquae communis frigidae libris duodecim infunduntur et crebro agitantur, dein filtrantur, sine ebullitione euaporationi committuntur, sique parum fluidi remanserit, refrigerentur, denuo filtrentur, in orbes planos porcellanos effundantur et ad consistentiam extracti fisci inspissentur, probe

probe ab humiditate tuendi, additis aqua aut syrupo commode in pilulas redigendi. Pulueris dosis drachma sesquialtera ad duas; decocti vnciae duae ad tres; extracti scrupulus vnus ad drachmam dimidiam, quarta quaque hora. Decoctum (frigidum vel calidum, quod perinde est) minus ingratum puluere, multoque minus extractum. In nullo aegroto molestiae ventriculi aut alia incommoda ab vsu harum praeparationum obseruata, nec secretionum aut euacuationum vlla mutatio. Neque vlla febrium crisis se monstrauit, excepta alui ductione, rariore tamen ea.

P. 73. Experimenta ad comparandam inter se vim antisepticam corticis hippocastani et peruuiiani. Puluis prioris carni inspersus maiorem eidem duritiem impertit corruptionemque diutius arcet puluere corticis peruuiiani, sed iam praesentem non cohibet; similis effectus decocti vtriusque; extractum diutius adhuc putredinem coercuit puluere et decocto, minus tamen quam sal communis; cum corticis peruuiiani extracto experimenta facta non sunt.

p. 84. *Observationes quaedam practicae*, numero quadraginta duae, ex multis selectae a Cl. Editore partim in nosocomio, partim extra illud institutis, in aegris varii sexus variaeque aetatis, ab anno 4. ad 72. et vltra, partim tertiana simplici, partim duplici, partim quartana remittente (in his octogenaria) quartana simplici et composita (praecipue memorabili casu 42. vbi quartana triplex a peruerse tractato morbo venereo, aegro perfecte sanitati reddito) laborantibus, in aliis praemissis purgantibus et sanguinis missionibus, in aliis protinus exhibito remedio; morbo in quibusdam antea cortice peruuiiano frustra oppugnato.

p. 108. *Gangraenae vsu externo decocti curatae exempla duo*: in altero, sublata gangraena, separatio phalangae

gae primae indicis cariosae cataplasmate ex radice chelidonii maioris contusa et in butyro frixa, bis de die applicato, praestita.

XVI.

Neues Magazin für Aerzte. Herausgegeben von ERNST GOTTFRIED BALDINGER. Zehnter Band. Leipzig bey Friedrich Gotthold Jacobäer. 1788. 8. pagg. 570.

i. e.

Nouum promptuarium in vsum medicorum editum ab E. G. BALDINGER. Vol. X.

P. I. Cl. SCHAEFFERI, archiatri principis Oettingo-p. 1.
wallersteinensis, *epistola ad Cl. BECKER*, respon-
sionem ad ea exhibens, quae posterior in praecedente volumine *) de cognatione apoplexiae cum arthritide proposuerat: ad quam Cl. BECKER iam annotationes quasdam responsionis loco subnectit.

*Tractationum minorum Cl. BÜCKING **) finis.* p. 12.
Annotationes pharmaceuticae et practicae in vsum medicorum. Responsio ad censuram in nouis Ienen-
sibus litteraturam vniuersam spectantibus.

Reuisio eorum, quae fratres BÜCKINGII monue- p. 28.
*rant ***), auctore Cl. KNACKSTEDT, iam osteologiae morborumque ossium prof. publ. ord. in schola imperiali medico-chirurgica Petropoli.*

Super epidemia variolosa, ab anonymo, de dato S. P. 33.
im H. B. 15. Oct. 1787.

Historia morbi feminae 62 annorum, auctore Cl. p. 36.
FUCHS. Asthmatis pituitoso succedebat hydrops, febris scarlatina, denique mors. Sectione inueniebantur

*) vid. Comm. nostr. Vol. XXX. p. 621.

**) ibid. p. 643.

***) ibid. p. 621.

tur sanies sanguinea in abdomine, colon dextrum coalitum, pleura cum pulmone dextro, ventriculus cum diaphragmate, lien et reliqua omnia, quae peritonaeum tangebant, cum eodem concreta, ouaria indurata, ren sinister permagnus, cor item, liquoris pericardii insignis copia, calculus biliaris pisi maioris mole, multum aquae in ventriculis cerebri.

P. 39. *Historia morbi*, auctore B***. Tinctura antimonii acris feminam 69 annorum cachexia cum asthma humido et oedemate pedum liberauit; vsa tamen simul est aliis pectoralibus et resoluentibus.

P. 41. *De lumbricis*, aphoniam et paralyfin vnus lateris efficientibus, medicamento, quod mercurium dulcem et diagrydium capiebat, curatam: idem effectus in puero epileptico.

P. 43. *De vi narcotica papaueris exemplum*. Vterque horum articulorum eidem anonymo B*** debetur.

P. 44. *Historia morbi*, auctore anonymo B-CH. Femina 58 annorum, per multos iam annos doloribus vagis rheumaticis imprimis in cardia et intestinis obnoxia, puluere nicotianae abusa, ante sex annos obstructionem narium querebatur, quae anno sequenti pure mucoso erodebantur; postea in vtraque cartilagine nascebantur excrementariae durae verrucosae, lente incrementum, sed huc dum remediis nec internis nec externis cedentes, verum a causticis incrementum sensim maius adeptae. Cultro non ad omnes aditus patet, quem etiam aegra reformidat. Ergo quid agendum sit quaeritur.

P. 49. *De noxis liquorum spirituosorum, potissimum vini adusti*, auctore C. H. S. in A. Strenuum potatorem elixirio vitrioli Mynsichti et acido vitriolico aqua diluto restituit, qui vero ad pristinos mores rediens macie confectus postea periit. Sectio infantis post exhibitum crebro spiritum vini, quo dentitio facilitaretur, atrophia confecti: viscera maximam partem exsucca
et

et scirrhus; loco bilis ichor alcalinus; sanies foetida in pulmonibus pleurae accretis cet.

Protocolum examinis medicastris cuiusdam. P. 61.

Prandium in promotione Altorfina 1787. P. 65.

Cl. IOH. GOTTHELF HERZOG, medicus Cameracensis, de catalepsi in puero, continuato usu tartari emetici posteaque corticis peruuiani cum liquore cornu cerui succinato sublata. P. 67.

Liquidatio chirurgi satis enormis, subiuncta moderatione. mo-p. 71.

Historia morbi conscripta a Cl. КЕУР. Faber li-p. 76. gnarius 47 annorum per nouem menses febre quartana affectus multisque omnis generis bonis aequae ac peruersis medicamentis usus fuerat; iam ad incitatus redactus Cl. Auctoris opem efflagitabat, qui resoluventibus exquisitissimis per 14 dies exhibitis, hisque subiunctis euacuantibus, quum paroxysmi tempore mutarentur et mitescerent, cortice peruuiano primum cum rheo, tartaro tartarifato et gentiana in decocto, postea iam quassia in infuso vinoso, aegri vires et vigorem restituebat, adeo ut consuetis negotiis rursus vacare posset. Sed breui elapso tempore subito mania corripiebatur; tartari emetici magnae doses nihil efficiebant; balnea frigida recusabant propinqui; reliqua auxilia irrita erant, et tertio die accedente nouo horrore aeger moriebatur.

Cl. F. A. WEBER, physici Heilbronensis, episto. p. 81. la ad Editorem de variis litterariis, cum adiuncta morbi et sectionis historia, viri a pede equi ad canthum internum oculi dextri percussi et die sexto mortui. Diffracta ossa usque in substantiam medullarem cerebri penetrauerunt: symptomata tamen funesta nonnisi 21 ante mortem horis apparebant.

Anecdota.

P. II. Continuatio quarta indicis copulatum cet. P. 92. in Pomerania Suecica et Rugia a 1. Iul. 1786. — 30. P. 97.

Tom. XXXII. Pars IV.

Yy

Jun.

Iun. 1787. auctore Cl. MAVR. (nunc) DE WILlich. Copulata 469 paria. Nati 1150 pueri, 976. puellae; ex his 153 extra coniugium; mortui 20; gemini 17 paria. Mortui sunt 1875; a natiuitate ad decimum annum 781; a decimo ad vigesimum 82; a vigesimo ad quinquagesimum 332; a quinquagesimo ad sexagesimum 221; a sexagesimo ad septuagesimum 243; a septuagesimo ad octogesium 121; ab octogesimo ad nonagesimum 34; a nonagesimo ad centesimum 12. Morte praeternaturali 40, quorum dimidia pars submersi, vnus tonitru occisus, quum ipse Cl. Auctor vix 40 passus ab eodem distaret: enecti facies protinus obscure liuebat, de reliquo nulla laesio nec metalli, quo vestimenta obsita erant, fusio conspicienda. Idem fulmen vna duos equos necabat, arborem diffindebat et aedificium incendebat. Ipse Cl. Auctor stupidus, tristis et anxius reddebatur, et per otiduum grauitatis lassitudinisque sensum percipiebat. Senio periere 120; atrophia 109; phthisi 92; hydrope 60; oedemate 22; tussi 16; asthma 16; spasmis 22; colica 19; obstructione alui 22; apoplexia 154; catarrho suffocatiuo 20; febribus acutis et pleuritide 159; morbis pectoris 222; haemorrhagia 11; febribus putridis (secundum indices ex parochiis exhibitos, ideoque omni exceptione neutiquam maiores) 37, absque epidemia; variolis 235; purpura 60; in puerperio 16; e. s. p. Ex inspersis annotationibus haec excerpere liceat. — Oedema subito oriens et increscens, praecipue in obesis, a refrigerio post calorem praesertim ortum, periculo fere carens, profligatur vino antimonii HVXH. cum dimidia portione tincturae colocynthidis DAHLB. *) ad guttas 30 omni trihorio, vsuque meracioris decocti baccarum iuniperi, quod etiam sub initiis anasarcae quamplurimum prodest. Spasmi in

*) vid. Comm. nostr. Vol. XXII. p. 357.

in infantibus non infrequentes, nec euacuantibus, nec anthelminthicis, sed solis antispasmodicis et cortici cedentes. Hysteria in femina iuniore, tinctura valerianae, elixirio vitrioli acido Lond. et essentia aurantium, ad guttas 30. quater de die exhibitis, curata. Obstructio pertinax cum febre et deliriis, quae symptomata nonnisi egestis ovis cancerorum, ante quatuordecim dies magna copia assumtis, cessabant. Vfus ouorum in ictero probatur. Tristis relatio de maniaco, qui sibi ipsi asperam arteriam et oesophagum disciderat, vasis maioribus illaesis, septimoque demum die moriebatur. Exemplum feminae nunquam menstruatae, octo tamen liberorum matre: filia eius, sani habitus, itidem nunquam menstruata, neque grauida, licet aliquot iam annos nupta. Vetula septuagenaria variolis secunda vice correpta obiit. Aduersus eclampsiam infantum remedium domesticum, iam ab OSWALDO GAEBELHOVER (*Arzneibuch, Tübing. 1641. 2. Aufl.*) propositum, ex caruncula lieni simili, linguae pulli equini recens nati inhaerente, siccata et in puluerem redacta, dosi mane et vespere in recens natis quantum cultri cuspis capit, in adultioribus duplo vel triplo maiore, ter vel quater repetenda. Aër fixus methodo Hulmiana exhibitus, omnium lithontripticorum facile princeps. Cereuisia fermentans remedium domesticum ad menses proliciendos, aut, si suppressi fuerint, reuocandos, itidem ob fixum aërem. In crusta lactea violae tricoloris (bicolorem dici mauult) vsum Cl. Auctor verè utilem perspexit: illam et in aliis corporis partibus, facie libera, vidit. Locis humidissimis semen lycopodii, quod etiam iunctum lotionibus cum aqua frigida excoriationibus optime medetur, inspergi, vel iisdem vnguentum ex sebo ceruino, cremore lactis et eodem semine aliquoties de die infricari iubet, quo etiam aduersus tineam crustasque variolarum vtitur.

Iam his indicibus per quatuor annos continuatis finem imponit Cl. Auctor, et conſectaria quaedam generalia ex iis elicit, in quibus etiam metum variolarum naturalium, ab inoculatione non fugandum, exemplo trium fratrum, quibus idem fatum acciderit, et quibus ſimilia alia exſtare aſſerit, adducit.

p. 127. *Hiſtoria morbi*, medicis ad diiudicandum et auxilia ſuadenda propoſita a Cl. GRAVMANN, prof. Butzoviſi. Vir ſexaginta aliquot annorum, vitae ſedentariae laboribusque caput afficientibus deditus, ſubito peculiarem ſenſum in capite, duorum circa, pollicum ſuper aurem ſiniſtram diſtantia, percipit, quem cum ſono elateris in horologio comparat, abſque dolore, ſed cum leuiore gradu deliquii animi et inſigni laſſitudine; ſtrepitus iſte, diuerſimode mutatus, ceſſat, quum corpore in lecto quieſcente caput in ſiniſtrum latus inclinatur; febris nulla vnquam; poſt aliquot hebdomadas, ſtrepitu licet ſubſiſtente, debilitas tamen ſenſim diſparuit, aegerque ad conſue- ta negotia rediit; ſtrepitus autem ipſe, ab inclinatio- ne verſus terram vel capite menſae impoſito, non ſuſcitandus, tamen per quosdam menſes bis de die ſtatis horis redit. Auxilia multa tentata, ſed ſine ſucceſſu: quum autem haemorrhoidalia molimina ſub primo morbi acceſſu aſſent, hirudinum uſus commendatus, quas vero aeger repudiauit. Morbus iam in nonum menſem perdurat.

p. 137. *Cogitata quaedam* auctore Cl. DE WILlich, de limitibus venaefectionis in vomitu cruento, et de re- troſlectionis vteri exemplo, Ill. RICHTERI bibliothecae chirurgicae *) inſerto.

p. 141. *Quaedam ad biographiam medici celeberrimi* (ſaty- ra, cuius nec veritatem nec ſalem diiudicare nobis datum eſſe fatemur).

p. 144. *Tractatus minores, auctore anonymo.* De difficul- tatibus

*) Vid. Comm. noſtr. Dec. III. Suppl. IV. p. 708.

tatibus auxiliorum apparenter mortuis ferendorum, et quomodo eae tolli possint. De verrucis seu clavis digitorum: commendatur frictio crebra cum sapone sicco, quo sensim deteruntur. Pia desideria: de medicis in vita academica, imo sub ipsius practicae initia, sustentandis et ab inopia, adeo largo malorum fonte, defendendis.

Observationes quaedam super hirudinibus, auctore p. 160. Cl. FIELIZ. Nigrae (*H. sanguisuga* L.) ab aliis damnatae, aequae commode in usum duci possunt, ac striatae (*H. medicinalis*). Nec auulsio noxios effectus producit.

Observationes variae minores, auctore eodem. p. 165. Certum indicium grauiditatis primis temporibus iam determinandae a Cl. STEIN propositum, orificii vteri in figuram circularem mutatio *). Versio, capite iam in peluim minorem delato, anceps remedium. De praestantia forcipis, in primis Ormiani, aut Leurentiani brachiis longioribus instructi. Ischias ad vexatissimum SVETONII locum succussionibus cum virga balaenaria et fotu cum sacculis arena calefacta impletis sanata. De docimasia pulmonum: infantis debilis nati pulmones in aqua fundum petebant, praeter partem inferiorem pulmonis dextri, qui etiam separatus aquae innatabat. Suffocatio in aqua: duo submersi signa manifesta eius offerebant, glottis aperta erat, aqua paludosa, sanguine spumesciente remixta, aequae ac bronchia repleta; tertius, qui vitae restituebatur, per aliquot dies inter dolores tensuos pectoris et pungentes lateris cum tussi vehementi et pertinaci similem materiem eiiciebat. Aqua traumatica, pro arcano habita, ex millefolio, plantagine et chelidonio cum vrina, fermentatione praegressa, coctis, dein combustis et cum expresso hoc succo, vi-

Yy 3

triolo

*) In primiparis tantum-valens. Vid. Ill. METZGER *Annalen der Staatsarzneykunde*, I. B. 2. St. S. 76.

triolo et alumine calcinatis, in massam nigram lapideam coctis, cum aqua fontana digerendam. Cataracta a terrore subito orta, quum operatio staphylo-
matis incurabilis alterius oculi aegrae denegata fuisset. Morbi ficti: excretio materiae ichorosae a prolapsu vaginae, quae nihil erat nisi solutio saponis cum puluere laterum mixta; simulata tormina ventris a retento spiritu, ut in gastromythia,

p. 182. *Historia sectionis* L. B. DE GREIFFENCLAU, *ecclesiae Spirensis cathedralis*, ischuria demortui, conscripta a C. BIRNSTIEL. Figura externa abdominis multum mutata, vesica vrinaria usque sub scrobiculum cordis et ad utrumque latus extensa; tumor in medio inter regionem epigastricam et umbilicalem pugni magnitudine et pollicis altitudine, aliusque maior ambituque magis irregularis in medio lateris sinistri regionis umbilicalis. Sub sectione fundus vesicae protuberabat, omento et intestinis e situ naturali depulsis. Corpus vesicae plus minus arcte cum peritoneo coniunctum. Vesicae longitudo a fundo ad collum 10 pollicum, diameter transversalis in fundo 5 pollicum 6 linearum, in corpore 7 pollicum 3 linearum; ambitus in longitudine 2 pedum 2 pollicum 2 linearum, transversalis minimus 10 pollicum, maximus 1 pedis 5 pollicum 9 linearum. Corpus et fundum distinguebat cingulum tendineum 3 lineas latum, ex quo sursum ligamenta oriebantur, fundum in tres eminentias herniis similes, sed absque constrictione, diuidentia; simile ligamentum densum in sinistro latere descendens tumorem maiorem exterius iam conspicuum efficiebat. In his eminentiis tunicae iusto tenuiores erant, in reliquis partibus 2 vel 3 lineas crassae. In latere dextro colli vesicae plexus vasorum quodammodo turgidiores; in superficie posteriori vesicae sugillatio a tentata methodo Fluranti paracentesi inducta. Pro-
stata

stata et sphincter multum inflammata, prior $\frac{2}{3}$ naturali maior et durior. Orificium vesicae interius laevissimum. Euacuata vesica, quae circa libras 9 urinae cum muco et pure remixtae capiebat, ex profata eximebantur lapilli quinque albi, partim rotundi, partim oblongi, magnitudinis diuersae globulorum plumbeorum (*Schrot*); caput gallinaginis, itidem multum inflammatum, sed omnia densitate naturali. In vesica ipsa calculi duo coloris nigrofusci, maculis rubris variegati, splendentes, politi, superficie nonnihil depressa, margine subrotundo, diametri 1 pollicis latitudine, 6 linearum altitudine, cuius medium album erat, collum formans, calcareum, tactu molle, laminis tenuissimis constans. Hi calculi conceptaculis peculiaribus inclusi fuerant, quorum 31 in tunica interiore exstabant, inter se non communicantia, a membrana humida gelatinosa, tremula, descendente formata; in his loculis magna copia liquidi purulenti haerebat, procul dubio ex rene sinistro huc delati; vreteris sinistri insertio adeo ampla, ut nucem auellanam mediocrem caperet; vreter ipse digiti indicis hominis robusti capax; pelvis renis itidem iusto amplior, sed vacua; ren ipse dimidio maior naturali, exterius multis abscessibus pure corruptoque sanguine plenis obsessus; tota substantia putredine tactus, mollis, digitis in putrilaginem conterendus. Ren dexter, praeter abscessus in superficie externa, et magnitudinem eius adhaerentisque vreteris paullo minorem, sinistro similis, aliquot adhuc uncias puris continebat. Intestina sana, sed iusto angustiora. Ventriculus a medio curvaturae parvae ad medium magnae in partes duas constrictione diuisus, transitum tamen non impediens. Reliqua in abdomine et pectore sana.

P. III. Morbus, mors et sectio puerperae, auctore p. 193.
 c. h. s. medico in A. Biduo post puerperium febris
 Yy-4 cum

cum lochiorum suppressione, obstructione et spasmodicis abdominalibus, quibus antea crebro obnoxia fuerat, aegram subito inuasit, et licet aluus solueretur, tamen morbus increfcebat et accedente demum delirio aegram quinto die tollebat. Sectio monstrabat aquam in cavitates pectoris, pericardii et abdominis effusam. pulmones liuidos, sanguine turgentes, intestina liquore lacteo obducta, omentum tenue et marcidum, hepar ingens, pallidum, vesiculam felleam bile obscure viridi fluida turgidam, lienem fracidissimum, ventriculum et intestina maxime expansa et relaxata, et partem tenuium leuiter inflammata, vterum contractum, exsanguem, orificio cum vagina coniuncto, et in hac excrescentiam sesquipollicem protuberantem. Causas praedisponentes quaerit Auctor in variolis malignis ante sexennium superatis et peruersa diaeta.

p. 201. *Mors a deglutitis nucleis prunorum*, auctore eodem, in rustico quinquagenario maiore, post vomitum diuturnum; causa post mortem demum detecta.

p. 204. *Quaedam super scabie ad confirmandam Cl. WICHMANNI aetiologiam eiusdem *)*, auctore Cl. HENR. ERN. IVSTI, orphanotrophi Annaburgensis medico. Damna a scabie retropressa non huic, sed suppressae a pinguibus transpirationi adscribenda esse; item frigori durante inunctione admissa. Salutares scabiei effectus creditos eosdem esse cum effectibus vesicatoriorum aliorumque cutim irritantium. Irritationi, quam in vnguento Iasseriano vitriolum album, aequae ac mercurius sublimatus, in cute efficit, pustulas recens surgentestribuendas, neque eas scabiosas dicendas esse. Remedium, quod quam maxime utilitate sua se probauit Cl. auctori, ex florum sulphuris vnciiis tribus, salis ammoniaci vncia vna, cum aquae

*) vid. Comm. nostr. Vol. XXVIII. p. 633. seqq.

aquae calcis viuae libris quinque ad residuum librarum trium coctis, addendo colaturae mercurii sublimati in aqua calcis bene soluti scrupulos duos; hoc remedio vesperi tota superficies corporis, vbicumque pustula adest, abluitor, subiuncto altero mane balneo et saponis vsu. Hoc modo plus quam 300 intra annum spatium paucis hebdomadibus elapsis sanauit, nullo vquam incommodo relicto. Immunditiem primariam causam scabiei esse; febres intermittentes, tineam cet. nullum influxum habere, contagio parum vel nihiltribuendum; diaetae rationem non habendam esse; dispositionem humorum ad cutim determinandorum nihil conferre aduersus Cl. SELLE *).

Cogitata quaedam de publicitate (sit venia verbo p. 215. recenti) *in rebus medicis*, occasione tractatus cuiusdam Cl. ZIER in indice litterario Brunouicensi de aqua Toffana (egregie dicta, nostroque applausu dignissima). *Fallacia causae medica*: radices dauci fructusque iuglandis recentes non anthelminthica esse, sed vermibus copiosum nutrimentum praebendo eorum morsus atque inde oriunda symptomata praeuertere. *Annotata ad loca quaedam in antecedente volumine huius promptuarii*; fluorem album benignum, etiam chronicum, optime curari laxanti, cui adiunctus mercurius dulcis, dein tinctura antimonii acri cum essentia succini et pimpinellae, ac denique essentia catechu. *Annotata pharmaceutica* de magnete ferrum cum cupro et orichalco mechanice vnitum attrahente, et de aqua Goulardiana extemporanea ex aquae simplicis destillatae vnciiis duodecim et sacchari saturni drachma vna paranda; *chirurgica* de vnguento nutrito, quarta parte lithargyrii efficaciore reddendo, cet. *practica* de diuerso effectu corticis peruuiiani in laxanda vel adstringenda aluo.

Y y 5

Extra-

*) Vid. Comm. nostr. Vol. XXVIII. p. 209.

P. 226. *Extracta ex diariis instituti clinici Gottingensis, subiunctis quibusdam annotationibus Cl. FISCHER.* Intra biennium ex 986 aegrotis mortui sunt 39. Epidemici morbi nulli, nisi 1785. typhus frequens cum petechiis, et 1786. variolae: ex 31 variolosis sex mortui. Tempus maxime insalubre finis hyemis, februius et martius.

P. 230. *Brevis historia contagii virulenti a mortuis porcis in homines translati, auctore Cl. I. D. BVSCH, med. p. p. o. Marburgensi.* Seruus carnificis, qui porcum angina inflammatorio-suppuratoria enectum aperuerat, et digitis nondum ablutis nasum emunxerat, ab hac causa et ab inhalatis putridis vaporibus subito gangraena nasi et ingenti tumore elastico faciei et colli corripiebatur et intra triduum ex improviso moriebatur, putredine adeo celeriter incremente, ut (licet februario) ultra 36 horas sepultura differri nequiret. Duo canes, qui carnis demortui eiusmodi porci quicquam deuorauerant, intra paucas horas cum omnibus assumpti veneni signis perierunt.

P. 234. *Consilium de rheumatismo arthritico chronico in superiori vol. *) descripto a G. medico in F.*

P. 237. *Symbola ad formulas medicamentorum peruersas, a pharmacopoeo iuniore in itinere per Germaniam septentrionalem collecta, subiunctis annotationibus. (Nux-Moschati nisi inter errores typographicos referenda, non adeo honorificum de scientiis praeparantibus auctoris testimonium exhibere quibusdam videri posset. Formula specierum ad clysterem, non clysteris ipsius, quae est mens auctoris, forte ad copiosiores eosdem Kaempfiana methodo praescripta est, ideoque censuram minus mereretur, licet nec bellis bis in eadem occurrens, nec scriptionis commissa vitia nos lateant; hinc etiam arduum iudicamus de ingredientium inter se relatione compositionisque rationibus*

*) vid. Comm. nostr. Vol. XXX. p. 636.

nibus decidere velle, incognitis morbo, aegro eiusque genio, aliisque, quae in itinere non protinus occurrunt, sed diuturno demum usu innotescunt. Neque tamen his omnibus peruersarum ineptarumque formularum causam agere suscipimus, aut ignorantiae vel oscitantiae patrocinari villo modo volumus.)

Cogitata quaedam mere medica super manipulatio p. 248.
ne, auctore BÜCKING. Omnia ad effectus frictionis redire.

Remedia quaedam aduersus rheumatismum arthriticum chronicum, cuius paullo ante meminimus, indicata a Cl. ZELLER. Debilitas genu, superata iam acrimonia remanens eiusdemque tumorem fouens, roborantia externa exigit, lotiones cum aqua vegeto-minerali camphora mixta mane et vespere super prunis et leni accedente motu, interposita applicatione sparadrapi GOVLARDI seu vnguenti eiusdem, adiunctoque usu remediorum internorum et fonticuli in brachio, motu corporis in curru, cuius efficacitatem in tumore genu a gonagra residuo in seipso expertus est Cl. Auctor. Remedia autem saturnina nec in metastasi materiae arthritico-rheumaticae ad alia loca, nec in vera gonagra, nec protinus in initio morbi, nec eodem iusto diutius protracto, commendat.

Morbus rarus, ab anonymo descriptus, sed ad p. 260.
modum imperfecte, siquidem nec eiusdem initia aut causae praegressae memorantur, nec exitus: videtur fuisse summus asthmatis spastici gradus.

Morbi cutanei chronici historia, auctore s - sr. Ae. p. 262.
gra 32 annorum iam per decem annos cum eodem conflictatur, iam multum mitigato, et procul dubio a vitio hepatis profecto. Historia morbi satis prolixè conscripta est, sed paucis contrahi a nobis iam nequit.

G. in B. *responsio ad quaestionem, quomodo aegrae* p. 269.
succurrendum sit, cuius historiam vol. huius P. I. p. 44.
exhi-

exhibuit. Excrefcentiae non causticis, sed cultro tollendae; interne mercurialia cum aconiti extracto aucta sensim dosi exhibenda; sublato malo thermae Emsenses.

- p. 271. *Relatio inoculationis variolarum in carcere Newgate 1721. in sex captivis a chirurgo CAROLO MAITLAND susceptae.* Documentum publicum ad historiam inoculationis quam maxime pertinens.
- p. 278. *Anecdota.* (Ad phaenomeni physici n. 7. propositioni explicationem putamus rationem haberi oportere vasis, diuersae conditionis calcis viuae, et proportionis eiusdem ad quantitatem aquae).
- p. 289. *P. IV. Examen physico-chemicum fontis chalybeati Langenschwalbacensis.* Grauitas specifica ad aquam simplicem destillatam est 1,0011 ad 1,000. Librae medicae (= ℥xii) 48 continent salis culinaris grana 5; alcali mineralis sicci aëratı 6; selenitae 16; terrae calcareae aeratae 33; magnesiae aeratae 20; ferri aerati 29; praeterea vestigium substantiae resinosae (non tamen adeo aquae ipsi, quam vasis pice obturatis adscribendum) et extractivae. Ex libris duabus euoluebantur acidi aerei pollices cubici $32\frac{1}{2}$, et aeris dephlogisticati $\frac{1}{4}$.
- p. 307. *Visum repertum super examinis impotentiae, ea solertia hic transcriptum, qua uti solent in describendis diplomatibus: iudicium innititur aetati, habitui corporis, vitae generi, statui genitalium; erectionem in eiusmodi examine non posse vi obtineri.*
- p. 310. *Exemplum consilii medici lingua gallica conscripti a Cl. VICQ D'AZYR (in quo autem istam solertiam desideres, uti vel ex subscripto nomine patet).*
- p. 311. *Varia variorum auctorum. Cl. FRANC. WILH. KAVHLEN, prof. med. Bonnensis, in diario medico Baldingeriano (St. XIV. S. 38.) censuram praelectionum medicarum in academia Bonnensi, in promptuario*

rio medico *) exhibitam, diluere tentauerat; ad quae hic auctor anonymus istius censurae respondet. De variolis naturalibus secunda vice redeuntibus. De machina aerostatica a medico parata spectatoribusque publice annunciata. Relationes chirurgi ad medicum super statu aegroti cuiusdam transmissae (quibus similes vbique locorum inueniri posse nulli dubitamus). De agyrta curationes magneticas exercente. De femina suppressione vrinae ab vtero retroflexo per inscitiam chirurgi mortua. De febre intermittente larvata sub specie tussis conuulsivae periodicae, per corticem peruuvianum cum sulphure aurato antimonii, vesicatorium inter scapulas, et assam foetidam ante accessum sumtam curata. De menstruis sponte cessantibus, haecque supplente stato tempore haemorrhagia narium. Annunciatio versionis germanicae descriptionis dysenteriae epidemicae a Cl. VAN GEVENS editae, per Cl. KEVP..

Observatio communicata a Cl. BIRNSTIEL. Vir- p. 325
go rustica per 14 dies suppressione vrinae laborauerat; chirurgus Bruchsalienſis SPENGEŁ caussam in hymene coalito inuenit, eoque discisso remediisque antiphlogisticis, venaeſectionibus, clysteribus et aquae frigidae iniectionibus aegram restituit.

Monitum de aquis ſelteranis, ad cauendas fraudes p. 329.
in iis vendendis committi solitas.

Symptoma peculiare in octogenario, communica- p. 331.
tum a medico quodam I. Ante duos annos et dimidium in lecto, antequam incaluiſſet, motum plumarum cum caloris ſenſu percepit, quod quum per aliquot noctes perſenſiſſet, conſilium cepit, loco ſtragulorum corpus tantum induto veſtimento pellibus (qualibus?) munito obtegendi, et tunc phaenomena electrica cum in proprio corpore, tum in conclaui eiusque vicinia animaduertit; electricitas negatiua
ingen-

*) vid. Comment. noſtr. Vol. XXX. p. 621.

ingentem copiam scintillarum eduxit, et priora phaenomena debilitasse visa est, sed subsistit sensus quasi percussionis in capite, variae directionis, per intervalla aliquoties recurrens, quum aliquamdiu in lecto iacuit; hic tamen sensus iam per septem vel octo annos percipitur (adeoque prior est phaenomenis istis electricis). Ill. BALDINGER electricitati aliquid largitur, quaerens tamen, numne symptoma primum ex hypochondriaca quadam hyperaesthesia in cute explicari queat? an molimina haemorrhoidalia occasionem praebuerint hallucinationi visus et auditus?

P. 335. *Status domus ad iuvandos partus Gottingae institutae per trimestre ab aprili ad iunium 1783 enarratur a Cl. FISCHER.*

P. 336. BARONIS AB HIRSCHEN *declaratio super ipsius aqua aereosalina, ex ephemeridibus rei litterariae universae Ienenfibus.*

P. 341. *Schola veterinaria Marburgensis descripta, una cum indice praelectionum per hyemem habendarum, a Cl. BVSCH.*

P. 345. *Casus infrequens excretionis hydatidum et materialium gelatinosarum puriformium ex utero et ano, descriptus a Cl. ZELLER.* Morbus in vegeta et iuvene rustica a primo puerperio, in quo, praeter prolapsum uteri ab imprudenti corporis inclinatione contractum, febre puerperali solis naturae viribus superata laborauerat, originem traxisse visus, diu satis duravit et a Cl. Auctore sollicitè tractatus prolixèque descriptus est. Post hydatides, quarum excretionem multa ac diuersa symptomata praecedebant et comitabantur, et gelatinosam materiam cum ingentibus doloribus, quales ad partum esse solent, secedentem, post aliquot horas in aquam diffluentem, sed in vrina diutius consistentem, purulenta materia ex genitalibus effluxit, et quum nimiam dosin pilularum balsamicarum sumfisset aegra, hydatides maximam copiam

piam disruptae per anum secesserunt, ac denique cum summis cruciatibus corpus quoddam per vaginam eductum est 8 pollices longum lumbrico simile, quod materia glutinosa copiosa insequuta est; inde sensim imminuto effluvio per genitalia et intestinum rectum, exhibitis euacuantibus et dein roborantibus, sanitati reddita est aegra, quum aliquot menses cum morbo hoc conflictata fuisset. Prolapsus, iam sub initium morbi reductus, non rediit.

Excerpta ex BERNHARDI DE GORDONIO tracta- p. 359.
tu de conseruatione vitae humanae (Lips. 1570.) de cura infantis recens nati et de requisitis nutricis, et alia quaedam ex eodem libro. Subiunguntur nonnulla de dysenteriis epidemicis variorum annorum in ducatu Montensi, de statu rei medicae variisque medicastis in eadem regione, de singulari paralyti artuum inferiorum a refrigerio, de febre catarrhali per aliquot annos aegrum vere et autumnino inuadente, de medico vomitoria quammaxime auersante.

Anecdota medica, ab eodem, vt videtur, auctore p. 379.
anonymo, ex quibus tantum varia exempla effectus imaginationis in fetum, consilium exhibendi opium animalibus viuisectioni subiiciendis, et virum testiculo dextro scirrroso laborantem, duorum filiorum patrem (aduersus hypothesein HENKII), adduxisse sufficiat.

P. V. Anecdota et singularia quaedam momenta ex p. 386.
vitae quorundam medicorum veterum proponit Cl. FIELIZ: quae quidem quum omnia ex libris desumpta sint, hic etiam fideliter indicatis, qua ratione anecdotorum nomen mereantur, nos quidem non videmus. Subiuncta sunt alia quaedam, nobis minoris momenti visa.

Cl. BIRNSTIEL de propagatione morborum epizooticorum in homines, ex obseruationibus propriis: ad illustranda ea, quae Cl. VVSCH superius p. 230. huius
volu-

voluminis enarrauerat. Corripuit aliquot homines morbus ex arthritide vaga inflammatoria pustulis sociatus, quae anthracibus admodum similes essent,isque tum dissectioni armentorum morbo gangraenoso lienis demortuorum, tum transportationi atque comestioni carnis eorum adscribebatur: hoc autem causam veram non fuisse, variis argumentis euincit Cl. Auctor, cuius super hac re relatio ad episcopum Spirensensem id effecit, vt transitus armentorum peregrinorum per episcopatum non prohiberetur, ideoque contagii metus ex animo ciuium excuteretur, quem etiam vanum fuisse euentus comprobauit.

P. 425. *Historiae tres morborum ad confirmandam singularem efficaciam curationis visceralis Kaempfianae, auctore Cl. GROSSMANN, medico Biedenkopfensi in Hassia: morbi cutanei scorbutico-phlegmatici, leprae Graecorum simillimi, in quinquagenario; morbi neruosi, ab infarctibus infimi ventris enati, in femina 36 annorum; atrophiae in infante bienni. Bene et exacte enarratae.*

P. 437. Cl. FRID. IAHN, medici Meiningensis, *responsio ad Cl. DE WILlich* nos non tangit.

P. 439. Cl. GROSSMANN *de morbo a Cl. GRAVMANN p. 127. huius voluminis proposito: sedem eius in abdomine esse, tentanda resoluentia interne et in clysteribus, postmodum roborantia; ad haemorrhoides vix posse respici, nisi praestita prius resolutione, tubercula tamen si clysterum applicationem impendant, aut hirudinibus euacuanda aut cultro resecanda esse.*

P. 442. *Continuata historia morbi feminae, p. 262. huius voluminis enarrati.*

P. 446. *Historia morbi cum subiuncto statu exulcerationis HENRICI EPISCOPI FULDENSIS (ob. 25. Sept. 1788. a. a. 58.) auctore Cl. FRANC. ANT. SCHLERETH, eiusdem cons. int. et archiatro (WEIKARDI successore). Omphalocoele et vlcere pedis affectus, saepius cholera*

cholera vexatus, ea etiam diaetae vitiis suscitata obiit. Methodum medendi adhibitam diiudicare nobis non sumimus, non omnibus forte arrisuram. Ventriculus et intestina crassa sphacelosa, diaphragma, vti reliqui in toto corpore muscoli, friabile, sphacelosum, pulmones gangraenosi; praeterea in ventriculo sinistro cordis, aorta vtraque, arteriis iliacis, subclaviis et carotidibus insignes ossificationes; arteriae opticae sanguine prorsus vacuae, partim cartilagineae, partim ossificatae; in cerebro iusto tenaciore aqua et hdyatides; sub corporibus quadrigeminis minoribus distinctum par neruorum oriens, in ventriculos laterales progrediens et ad pedes hippocampi se firmans

Observationes excerptae ex diario Ill. Editoris. De P. 457.
carie maxillae superioris et erosione partium adiacentium a causa venerea, per excitatam a solutione Plenkiana adiunctis aliis remediis convenientibus saluationem curata. De atresia ex partu laborioso, instante iterum pariendi momento ope cultri sublata. De infarctu mucoso in puella, antea verminosa, iam symptomatibus iisdem se prodente, et anthelminthico absque vermium vlla excretionem sanato.

Historia morbi et sectio pueri subito mortui, aucto. P. 465.
re Cl. IYSTI. Aeger antea iam morbis verminosis et biliosis affectus fuerat. Exitialis morbus symptomata vermium manifesta offerebat. Sectio monstrabat ventriculum a lumbricis perforatum, qui effusae in eundem bili innatabant; praeterea polypos in arcu aortae sinubusque venarum pulmonalium et venae cauae, procul dubio sub mortem demum genitos.

Cl. GROSSMANN *phaenomenon physicum superius P. 472.*
p. 280. enarratum explicat, eodem, quo nos, modo ad diuersam calcis conditionem respiciens.

Cl. C. S. KRAMER finem cantus tertii ARM-STRONGII *) versione metrica germanica exhibet.

P. VI.

*) vid. Comm. nostr. Vol. II. p. 534. Alia versio ser-
Tom. XXXII. Pars IV. Z z mone

- p. 481. *P. VI. Edictum Hassiacocassellianum contra medicastro*, d. d. 19. Sept. 1788. Qui primae poenae iam constitutae non obtemperant, altera vice sex hebdomadas carcere detinentor, nominibus eorum simul indicibus publicis infertis; tertia vice ad dimidium annum ad ergastulum ablegantor aut, si ita visum fuerit, in exilium mittuntor.
- p. 483. *Numerus hominum et animalium oeconomicorum Marburgi 1788 et 1789.* Priorum numerus ultimo anno maior 239, posteriorum 188.
- p. 484. *Status rei medicae Hottentottorum, ex scriptis optimis fideque dignissimis (?) depromptus* a Cl. FIELIZ. Scriptores, quibus usus est, sunt KOLBE, DAPPER, OGYLBY et TEN RHYNE: recentiorum nullus.
- p. 492. *Observationes super diuersis putatitiis vermibus in cute vel carne humana, praesertim super dracunculo seu vena medinensi, auctore eodem.* Copiam lectionis, multoque magis atticum (si Dis placet) salem lubentissime remitteremus Cl. Auctori: quae ex propria observatione tradit, acceptissima sunt. Pluribus vermium generibus, v. c. in peste, cancro, tinea, scabie; verme sublinguali in canibus; vermibus in gingivis scorbuticorum; *nigua* in noua Hispania; furia infernali cet. in dubium vocatis, ad venam medinensem accedit, et monstrat descriptiones eius in auctoribus (an vero omnes consuluerit, dubium nobis enatum est) mancas esse, nec sibi constare, vtrum id, quod nostrates *Engerlinge* vocant, vere laruae insectorum (vermes dicit) sint nec ne (vbi itidem Cl. FISCHERI obseruata*) Auctori nostro incognita fuisse suspicamur), quum ex eiusmodi tumore in dorso bouis, cui vermem inesse hippiater assererat, aperto et
et
mone soluto prodiit eodem anno 1788. Tiguri
8. min.
- *) vid. Comm. nostr. Vol. XXVIII. p. 139. seqq. Vol. XXX. p. 486. seqq.

et expresse similes laruarum figurae exirent, ac alias in furunculis et abscessibus deprehenduntur. Similem materiam saepe ex parotide suppurante furunculisque gangraenosis extraxit, quae admodum extendi se pateretur: eadem quoque ratio concretionum polyposarum a phthisicis excretarum. Similis igitur forte origo venae medinensis a tumore cystico, steatomate vel simili, in calidioribus climatibus a causis peculiaribus frequentiori. Femina ignotae originis, forte tataricae, per Lusatiam inferiorem vagata, in pedis digito minimo pustulam inflammataam offerebat, quae cum emollientibus tractata febrisque simul ratio habita esset, tertio die rumpebatur, et egresso nonnihil puris tenuis et sanguinis, ad pollicis longitudinem corpus album teres elasticum eminebat, forcipe ad unius adhuc pollicis longitudinem extrahi se sinens, sed tunc magnum dolorem excitans, neque ulterius cedens. Corpus hoc sub cute per varios gyros usque ad malleolum se extendebat. Sectione super illud in cute facta illud cum contextu celluloso cohaerere vidit Cl. Auctor; altero fine incisione facta, illum etiam extraxit, aliquot fibrillis, radicis verrucae ad instar, terminatum, neque per microscopium aliud quid organicum, sed tantum fibras tenuissimas separandas a se inuicem distinguere potuit; curuaturis sub cute interim evanescentibus; et sic die septimo totum istud corpus eduxit, longitudine, praeter iam abscissam particulam, dimidiae vlnae Lipsiensis, prorsus inorganicum. Altero pede femina ista duas cicatriculas a simili morbo relictas obtulit: breui post in brachio sinistro similis tumor musculo bicipiti insidens exortus est, frictionibus resoluentibus intra octiduum dissipatus. Vtroque in casu origo corporis huius ex partibus aponeuroticis proficisci videbatur.

- P. 508. *Quaedam adhuc de speciebus humanis*, auctore Ill. METZGER, ad defendenda ea, quae in commercio litterario medico *) proposuerat: nonnisi duas existere, alborum et nigrorum, et inter harum extrema omnes collocari posse.
- P. 513. *Super quibusdam Ill. RICHTERI annotationibus subiunctis recensione commentariorum academiae Iosephinae medicochirurgicae Viennensis, in eiusdem bibl. chirurg. auctore Cl. ANTONIO REINL, chirurgiae doct. et prof. Vienn.*
- P. 525. *Ad publicum auctoremque litterarum in huius promtuarum voluminis praesentis P. IV. p. 311. auctore Cl. KAVHLEN.*
- P. 529. *Symbola ad historiam fatorum anatomes, in litteris ad Ill. olim TREW, ad editorem transmissa. Cl. ADOLPH, Helmstadii tunc temporis (1768.), postea Altorfii professor, causas enarrat, cur Helmstadii a munere academico dimissus fuerit.*
- P. 537. *Historiae morbi p. 262. et 442. huius voluminis finis cum extispiciis, auctore Cl. MARSCHALL, medico Offenbacensi. Post varias morbi mutationes denique triduum ante mortem accessit vomitus niger, quo licet leuari videretur aegra, placide tamen exspirabat. Sectio inter alia extrauulsum cruentum in abdomine, tunicam villosam ventriculi fere prorsus consumtam, intestina fere omnia, excepta inferiore coli parte, sphacelata, pancreas solito maius, pallidum, extremitate dextra cum partibus adiacentibus coalitum, hepar magnum, diaphragmati, duodeno et mesenterio accretum, extus superficiei inaequalis, intus solito durius, passim scirrhosum, vesiculam felleam minimam, vacuum, ligamento similem, hepatis accretam, ductu hepatico et cystico ligamenti in modum contracto, choledochum cum duodeno concreto, venam portarum contractam et vacuum, lienem solito densiorem,*

*) Vid. Comm. nostr. Vol. XXVIII. p. 102.

florem, lobum dextrum maxime gangraenosum, sinistrum passim inflammatum, pericardium cruore nigro repletum, cor vacuum et marcidum, in omnibus vasis parum sanguinis, ossa ipsa flauo colore tincta offerebat. Morbus in resolutione vniuersali humorum a bile non secreta positus fuerat.

Hydrops abdominis saccatus, descriptus a Cl. CLOS. p. 543.
sio. Duo sacci sibi incumbentes, quorum anterior ex tela cellulosa peritoneae, et subiacens ex capsula Glissonii, soli superficiei inferiori hepatis ope filorum tenuium adnexus, formatus fuerat, cum contentis aquis fuscis glutinosis inodoris pondus prior 35, alter 21 librarum aequabant. Viscerum situm inde admodum mutatum fuisse, facile patet: ea vero a conditione sana (mesenterio excepto, pinguedine quippe prorsus orbato) in morbo per triennium durante non recessisse, forte magis miraculum.

Quaestio de impotentia in P. IV. huius voluminis, p. 547.
soluta a Cl. GROSSMANN. Caussam, biliosae forte indolis, in abdomine suspicatur, huicque medendi consilia accommodat.

Consilium super historia febris vere et autumnop. 549.
redeuntis in eadem parte promptuarii enarratae, auctore eodem. Corpus suspicatur rigidum, in regione venae portae cruditatibus bilioso-pituitosis refertum, moliminibus haemorrhoidalibus obnoxium.

Consilium super paralyti artuum inferiorum ibidem p. 551.
enarrata, auctore eodem. Causa videtur debilitas neruorum ab onania inducta: contulisse aliquid potest lapsus. Curatio per roborantia externa, iunctis, ubi opus, resoluentibus internis cet.

Cl. ZELLER itidem *de febre ista periodica cogita-* p. 553.
ta sua communicat: eam a decubitu materiae catarrhalis ad cardiam deriuat, statim temporibus actiuam redditam. Paralytin istam artuum inferiorum causae rheumaticae adscribit. Impotentiam istam magis

stimulo nimio a diaeta et phantasia excitato tribuendam putat, non tamen exclusa possibilitate caussarum in intestinis forte praesentium.

p. 560. *De usu acidi puri tartari in re medica et oeconomica*, auctore Cl. ZOBEL, Comiti de Loewenstein a consiliis eiusdemque archiatro. Apozematibus ex rheo, fena, manna, additum saporem nauseosum corrigit; magnesia nuptum aërem fixum optime euoluit, sicut in consortio cum nitro aërem nitrosus, antisepticorum principem; in itineribus commodius asseruari potest, quam citri eorumque succus; cum aceto mixtum melius citiusque carnibus condiendis inseruit, quam acetum solum, e. q. s. r.

p. 566. *Brevis historia epilepsiae hystericae*, auctore Cl. BVSCH. Femina sub ingressu in decimum sextum aetatis annum nondum menstruata, temperamenti phlegmatici, plethorica, amoribus vagis dedita, demum venere clandestina usa, hacque denegata verosimiliter peccatis occultis indulgens, in epilepsiam incidit, quae quum a moliminibus ad menstrua proficisci crederetur, administratis remediis emmenagogis crebriusque misso sanguine vehementem haemorrhagiam vteri passa et in vitae discrimen coniecta est: insultus diri post aliquot demum menses remiserunt, insigni debilitate neruorum superstite. Quatuor annis elapsis sensim vigor rediit, veneris exercitium repetitum est, ipsaque grauiditatem simulauit, ut amantem ad coniugium cogeret: exploratione facta orificium vteri aperturam rotundam, sed minimam obtulit, ipsius collum autem ad trium digitorum longitudinem in vaginam descendisse deprehensum est. Matrimonio confirmato tumor ventris sensim euauit, insultibus epilepticis rarius accedentibus, sed post separationem a marito eadem vehementia reuersis, largo vero veneris illicitae usu sedatis. Inde rursus grauiditatis indicia, ponderis sensu in parte
dextra

dextra abdominis percipiendo; quum partus instare crederetur, adeo vt obstetrix brachium fetus se sentire assereret, subito euanescentibus indiciis, at superflite ponderis sensu, se sanam pronunciauit, erumpentibus altero die variolis spuriiis, quibus siccatis dataque multo cum effectu euacuante medicina aegra conualuit, tumore ventris adhuc praesente, sed nec sanguinis, nec dolorum, nec epilepsiae (cuius per septem praegressos menses, quibus grauida putabatur, tres tantum accessiones leuiores sub specie deliquii animi subierat) vllis vestigiis. Mirum, feminam hanc in concubitu ipso insensilissimam, eundem tamen adeo appetere. An sub initio morbi remediis pellentibus procuratus sit abortus? an in ouario dextro stagnatio? Cl. BVSCH quaerit.

XVII.

Catalogus librorum, qui anno 1789. prodierunt.

ABBILDUNGEN (natürliche) der merkwürd. Thiere, nach ihren Geschlechtern, mit Farben nach der Natur erleuchtet, 38stes Quartal, womit dieses Werk beschlossen ist. Berl. u. Stralsund. 8.

ABCBUCH (naturhistorisches) oder Abbild. u. Beschreib. merkwürd. Thiere, nach Schreber u. Büffon. Ein Geschenk für fleißige und folgsame Kinder, von D. C. W. I. GATTERER, m. illum. Kupf. Offenbach. 8.

ABHANDLUNG von Anlegung eines Obstgartens, worinn dessen richtige Lage, innere Güte, jährliche Pfl. u. Wartung abgehandelt wird. Zweite Aufl. Berlin. 8.

ABHANDLUNGEN der Kön. Böhm. Gesellsch. der Wissensch. zu Prag, auf das Jahr 1788. oder 4ter Band, mit ausgem. u. andern Kupf. Dresden. 4.

— (merkwürdige) der zu London 1773. erricht. medicin. Gesellschaft. A. d. Engl. 1ster Band, m. Kupf. Altenburg. 8.

ABHANDLUNGEN (neue) der Kön. Schwed. Acad. der Wissensch. aus der Naturlehre, Haushaltungskunst u. Mechanik. Aus dem Schwed. übers. von KAESTNER, 9ten Bds. 1ste u. 2te Hälfte. Leipzig. 8.

— und Vorschläge (verschiedene allgem. nützl. ökonom.) für den Stadt- und Landhausvater. Frankf. am Mayn. 8.

ACKERMANN (I. F.) über die körperliche Verschiedenheit des Mannes vom Weibe, außer den Geschlechtstheilen. Frankf. am Mayn. 8.

ANDERSON'S (IOH.) heilkundige Bemerk. über die natürl. freiwillige und durch Kunst erregte Ausleerung im menschlichen Körper. Nach der zweiten verm. Londner Ausg. A. d. Engl. v. D. C. F. MICHAELIS. Breslau. 8.

ANLEITUNG zum Tobacksbau, besonders für den sächsischen Landwirth. m. Kupf. Dresd. 8.

ANNALEN (frankfurter medicinische) für Aerzte, Wundärzte, Apotheker u. denkende Leser aus allen Ständen, herausg. von D. IOH. VAL. MÜLLER und D. GEORG. FR. HOFFMANN, 2tes Quartal 1789. Frankf. am Mayn. 8.

ANWEISUNG, wie Naturalien zu sammeln, zuzubereiten, zu verpacken und zu verschicken sind. Memmingen. 8.

— zum Seifensieden, Lichtziehen, Essigbrauen, Einmachen von Früchten, Einpöckeln und Räuchern des Fleisches, Brodbacken, Bierbrauen etc. für Frauenzimmer, die ihrer Wirthschaft selbst vorstehen, v. I. G. S. Nebst einem in Kupf. gestoch. Holzsparsöfen. Berlin. 8.

— (kurze) für den Landmann, Steinkohlen, Torf, Mergel u. Gips zu entdecken, Wiesen zu verbessern, Flachs, Hanf, Hopfen, Toback, Kümmel u. Fenchel mit Nutzen zu erbauen, Baumschulen anzulegen, Bienen zu warten etc. Leipz. 8.

ANWEI-

ANWEISUNG (*kurze u. deutliche*) *wie man durch einen an jedem Orte wohnenden Schmid, eine sichere Wetterableitung mit geringen Kosten an allerhand Gebäuden anlegen lassen kann. Dritte verbess. Aufl. Dresd. 8.*

— (*kurze*) *wie man sich ohne Beihülfe eines Arztes vom Tripper befreyen u. vor der Ansteckung durch den Beischlaf hüten kann. Nebst einigen Recepten gegen das Unvermögen im Beischlase. Gera. 8.*

APHRODISIACVS, *sive de lue venerea in II. part. divisus, quarum altera continet eius vestigia auctorum uonimentis obuia, altera quos Aloysius Lufinus temere omisit, scriptores et medicos et historicos, ordine chronol. digestos, collegit notulis instruxit, glossar. indicemque rer. memorabil. subiecit D. CHR. GODOFR. GRVNERVS. Ienae. fol.*

AEPLIS (A.) *medizinisch polemische Probschrift von den Kanthariden gegen Hofr. TRALLES, vom bössartigen Fieber gegen Hofmed. TODE, u. vom Nachgeburtsgeschäfte gegen MVR SINNA. Winterthur. 8.*

APOTHEKERBUCH (*Londoner*) *nach der neuesten Originalausgabe übers. u. mit einigen Zusätzen u. Anmerk. herausg. von Dr. CHR. G. ESCHENBACH. Leipzig. 8.*

ARCHIV (*allgemeines medizinisches*) *oder Annalen für Aerzte, Wundärzte, Apotheker u. denkende Leser aus allen Ständen, herausg. v. Dr. IOH. VAL. MÜLLER u. Dr. GE. FR. HOFFMANN, 1stes Quartal 1789. Frankf. am Mayn. 8.*

— *gemeinnütziger, physischer u. medicin. Kenntnisse, herausg. von I. H. RAHN, 2ten Bandes 2te Abtheil. Zürich. 8.*

— *für Roßärzte und Pferdeliiebhaber, 2tes Bändch. Marburg. 8.*

ARTEDI (PETRI) *Synonymia piscium graeca et latina, emendata, illustrata, atque aucta; seu speci-*

men historiae piscium. Cum Hippopotami veterum historia critica. Auctore IO. GOTTL. SCHNEIDER. Lipsiae. 4.

ARZNEIMITTELLEHRE (chirurgische) der 1sten Klasse 1ste Abtheil. von den blutausleerenden Mitteln. Altenburg. 8.

AERZTIN (die) für Maedchen, Mütter und Kinder. Ein Volksbuch, zunaechst für Landhebamman, jedoch allen guten Müttern nützlich zu lesen etc. von Dr. H. G. MARSCHALL. Offenbach. 8.

AUSZÜGE, medicinisch-chirurgischer Bemerk. aus den neuern Schriften der K. Akad. der Naturforscher, verf. von Dr. GE. ALBRECHT WEINRICH, 1ster Theil, Nürnberg. 8.

BALDINGER'S (E.G.) medicinisches Journal, 19ter Hest. Goettingen. 8.

— Magazin für Aerzte, 11ten Bandes 1 u. 2tes Stück. Leipzig. 8.

BAER, Experimenta chemica. Erlangae. 4.

BATSCHS (Dr. I. G. C.) Versuch einer Anleit. zur Kenntniß u. Geschichte der Thiere u. Mineralien für akadem. Vorlesungen entworfen, m. Kupf. 2ter Theil. Jena. 8.

— Versuch einer historischen Naturlehre, oder einer allgemeinen und besondern Geschichte der körperlichen Grundstoffe. Für Naturfreunde, 1ster chemischer Theil. Halle. 8.

BECHERS (IO. PHIL.) mineralogische Beschreibung der Oranien-Nassauschen Lande, nebst einer Geschichte des Siegenschen Hütten- u. Hammerwesens, m. 1. Karte u. Kupf. Giessen. 8.

BECHERS (DAV.) neue Abhandlung vom Carlsbade. m. Kupf. Leipzig. 8.

BECHSTEINS (I. M.) gemeinnützige Naturgeschichte Teutschlands nach allen drey Reichen, ein Handbuch zur deutlichern u. vollständig. Selbstbelehrung, besonders

- ders für Forstmänner, Jugendlehrer u. Oekonomen,
1ster Band, der die nöthigen Vorkenntnisse u. die Ge-
schichte der Säugthiere enthält, mit Kupf. Leipzig. 8.
- BEITRAEGE zur Mineralogie von Italien. Frankf. am
Mayn. 8.
- BEKMANN'S (IOH.) Grundsätze der deutschen Land-
wirthschaft. Vierte vermehrte u. verbess. Auflage.
Göttingen. 8.
- physikalisch-oekonom. Bibliothek, 15ten Bandes
4. 5tes Stück, 16ten Bandes 1stes Stück. Götting. 8.
- BELLS (B.) Lehrbegriff der Wundarzneikunst, a. d.
engl. 4ter Theil, Leipzig. 8.
- BEMERKUNGEN praktische u. Geheimnisse die Haus-
haltungskunst betreffend etc. 10ter Theil. Quedlin-
burg. 8.
- u. Untersuchungen über den Gebrauch der Dampf-
bäder, bei verschied. Völkern, insbesondre in Rußland.
Memmingen. 8.
- BENDERII (C.B.) *Glecoma hederacea* Linn. egræ-
gium in atrophia medicamentum. Erlang. 4.
- BENKENDORF'S (von) Auszug aus dessen *Oeconomia*
forensis, oder kurzer Inbegriff derjenigen landwirth-
schaftl. Wahrheiten, welche allen Gerichtspersonen
nöthig zu wissen, 3ter u. letzter Band. Berlin. 4.
- BEOBACHTUNGEN u. Entdeckungen aus der Natur-
kunde, von der Gesellschaft naturforschender Freun-
de zu Berlin, 3ten Bandes 2tes, 3tes u. 4tes Stück.
mit illum. Kupf. Berlin. 8.
- BERENDS (D. C. A. W.) über den Unterricht junger
Aerzte vor dem Krankenbette. Berlin. 8.
- BERGBAUKUNDE, von der Societät der Bergbaukunde
herausgegeben, 1ster Band m. Kupf. u. Karten.
Leipzig. 4.
- BERGMANNI (T.) *Opuscula physica et chemica*, Vol.
VI. ac vltimum, cum tab. aen. et indice omnium
VI. tomorum. Lips. 8.

BERGMANNI (T.) *kleine physische u. chymische Werke, a. d. lat. übersf. v. H. TABOR, 5ter Band m. Kupf. nebst 1. Hauptregister über alle 5. Bände. Frankf. am Mayn. 8.*

BERNSTEINS (IOH. GOTTL.) *praktisches Handbuch für Wundärzte u. Geburtshelfer. Neue durchaus umgearbeitete Ausgabe. Leipzig. 8.*

BEROLDINGENS (FRANZ Freihrn. von) *Bemerkungen auf einer Reise durch die Pfaelz. u. Zweibrück-schen Quecksilber-Bergwerke, mit einer Vorrede v. Dr. I. D. BRANDT, mit einer illum. petrograph. Karte. Berlin u. Stettin. 8.*

BESCHREIBUNG des Gesundbrunnens zu Deinach im Herzogthum Wirtemberg, mit Kupf. Tübingen. 8.

— (physikalische) der franzöf. u. spanischen Pyrenäen, ihrer Höhe, deren darauf befindlichen Eisberge, ihrer Produkte, ihrer Einwohner etc. mit Karten u. Kupf, Aus d. Franz. des RAMOND de Carbonniere unter den Augen des Verfassers übersetzt, 1ster Theil. Strasburg. 8.

— (physikalische) der Taurischen Stadthalterschaft nach ihrer Lage u. allen ihren Naturreichen. Aus d. Russischen übersf. v. L. GUCKENBERGER. Hannover u. Osnabrück. 8.

— u. Gebrauch des Funkischen Erdkörpers nach seinen verschiedenen Zonen. Berlin. 8.

BESTIMMUNG der Oerter dererjenigen Himmelskörper, deren Beobacht. dem Seemann zur täglichen Berichtigung des Orts des Schiffes in See nach Laenge u. Breite anwendbar ist, für alle Tage des J. 1790. zum Besten aller Seefahrenden, auf Veranlassung der Hamb. Gesellsch. zur Befoerderung der Künste u. nützl. Gewerbe herausgegeben v. der Hamb. Commerc-Deputation. Hamb. 4.

BIBLIOTHEK der gesammten Naturgeschichte, herausg. von I. FIEBIG u. G. NAU, 1 u. 2tes Stück. Frankf. am Mayn. 8.

BIBLIOTHEK der oekonomischen Litteratur, oder vollständiges Verzeichniß von oekonomischen Cameral-Haus - Kunst - Landwirthschafts - u. Bergwerksbüchern. Breslau. 8.

BLACKS (Dr.) Entwurf einer Geschichte der Arzneiwissenschaft u. der Wundarzneikunst, a. d. Engl. v. I. O. F. SCHERF. Lemgo. 8.

— *Vergleichung der Sterblichkeit des menschlichen Geschlechts in allen Altern, ihren Krankheiten und Zufällen, aus d. Engl. Leipzig. 8.*

BLUMENBACH (Dr. IOH. FR.) Specimen physiologiae comparatae inter animantia calidi sanguinis viuipara et ouipara, cum fig. Gottingae. 8.

— *über den Bildungstrieb. Neue verm. u. verbess. Aufl. Ebend. 8.*

— *medizinische Bibliothek, 3ten Bandes 2tes Stück. Ebend. 8.*

— *Physiologie des menschl. Koerpers, a. d. lat. übersf. u. mit Anmerk. herausg. v. EYERL, m. Kupf. Wien. 8.*

BOEHMERI (Dr. GEO. RVD.) Bibliotheca scriptorum historiae naturalis oeconomiae aliarumque artium ac scientiarum, ad illam pertinentium realis systematica, Pars IV. Vol. II. Mineralogia Pars Vta. Hydrologia acced. index vniuersalis. Lipf. 8.

— *systematisch litterarisches Handbuch der Naturgeschichte, Oekonomie u. anderer damit verwandten Wissenschaften u. Künste, 4ter Theil 2ter Band. Mineralreich, 5ter Theil. Wasserreich, nebst allgemeinen Register. Ebendas.*

BOHNENBERGERS (G. C.) Beschreibung einiger Elektrifirmaschinen u. elektrischer Versuche, 4te Fortf. m. Kupf. Stuttgart. 8.

BONN (A.) Tabulae offium morbosorum praecipue thesauri Houiani, Fasc. IIIus. Amstelodami. fol.

BORKHAUSENS (M. B.) Naturgeschichte der europäischen Schmetterlinge, nach systematischer Ordnung,
2ter

2ter Theil, mit 1. ausgemahlt. Kupf. Frankf. am Mayn. 8.

BOERNER (I. CH.) über die Kälte. Breslau. 8.

BOROWSKYS (GE. H.) Ideal einer praktisch-oekonomischen Landes-Akademie für die K. Preuss. Staaten. Berlin. 8.

— die besten ein- u. ausländischen Getreidearten, Futtergewächse, Fabrik-Gewürz-Faerbe - u. Oelpflanzen in 100 versch. Arten, nach ihren Eigenschaft. Cultur, Nutzen u. Gebrauch etc. Zweite verb. Auflage. Ebendas. 8.

BOETTCHERS (Dr. I. FR.) Abhandlungen von den Krankheiten der Knochen, 2ter Band, m. Kupf. Königsberg. 8.

— Abhandlung von den Krankheiten der Knochen, 1ster Band. Neue verm. Ausgabe, m. Kupf. Ebend. 8.

BRANTWEINBRENNEREY (die) nach theoretischen u. praktischen Grundsätzen. Erfurt. 8.

BRENDELII (I. G.) Medicina legalis, siue forensis, eiusdemque praelect. acad. in H. F. TEICHMEYERII institutiones medicinae legalis. Edi curavit notis quibusdam et indice locuplet. auxit FR. GOTTL. MEIERVS. Hannouerae et Osnabrugae 4.

BRIEFE (forstwirthschaftliche) oder über Waldungen und Förster, von dem Verfasser der oekonom. Briefe über die Betrügereien der Verwalter. Leipzig. 8.

— über das Geheimnißvolle in der Elektrizität, in Briefen an Frauenzimmer. Heidelberg. 8.

BRINKMANN'S (I. P.) Beiträge zu einer neuen Theorie der Gährungen. Zweite Auflage. Düsseldorf. 8.

— über die Wirkung des Blattereizers bei der Inoculation, zweite Aufl. Ebend. 8.

BRÜNINGHAUSEN (HERM.) über den Bruch des Schenkelbeinhalses überhaupt, und insbesondere eine neue Methode denselben ohne Hinken zu heilen, m. Kupf. Würzburg. 8.

MÜCKINGS (I. I. H.) *Abhandlung vom Kniescheibenbruche, nebst der Beschreibung einer neuen Maschine dazu u. 1. Kupf. Stendal. 8.*

MÜFFONS *Naturgeschichte der vierfüßigen Thiere, 14ter u. 15ter, und der Voegel 15ter Band, auf Druck- und Schreibep. auch mit illum. Kupf. Berl. 8.*

MURJAS (ABEL.) *Grundlehren der Statik, oder desjenigen Theils der Mechanik, welcher vom Gleichgewichte bei festen Körpern u. Maschinen handelt. m. Holzschn. Berlin u. Liebau. 8.*

MURSERIUS (I. B. VON KANILFELDS) *Anleitung zur Kenntniß u. Heilung der Ausschlagskrankheiten, a. d. Lat. von Dr. HINDERER. Gießen. 8.*

— *Institutiones medicinae practicae Tomi V. Pars Ima et IIda. Mediolani et Lipsiae. 8.*

— *Institutionum medicinae practicae Vol. IV. Lipsi. 8.*

CANCERINS (F. L. von) *erste Gründe der Berg- und Salzwérkskunde, 10ter Theil 2te Abth. welche die Gradiérkunst enthält, m. Kupf. Frankf. am Mayn. 8.*

DESSELBEN *Buchs 10ten Theils 3te Abtheil. welche die Siedekunst u. die Anlage neuer Salzwérke enthält, m. Kupf. Eband. 8.*

— *Abhandlung vom Torf. Gießen. 8.*

— *Beschreibung eines mit mehr Holzersparung eingerichteten Backofens. Eband. 8.*

— *Salzwérkskunde 2ter u. 3ter Theil, welcher die Gradiér- u. Siedekunst enthält, m. Kupf. Eband. 8.*

CARMINATIS (B.) *therapeutische Abhandlungen, aus d. Lat. 1ster Band. Wien. 8.*

— *Opuscula therapeutica Vol. Ium. Lipsi. 8.*

CARRERE *Untersuchungen über die verlarvten, ausgearteten oder verwickelten venerisch-chronischen Krankheiten, a. d. Franz. m. Anmerk. des Uebersetzers. Frank. am Mayn. 8.*

CHABERT,

CHABERT, von den Krankheiten der Würmer in den Eingeweiden der Pferde, Ochsen u. s. w. a. d. Franz. Göttingen. 8.

CHAMBON (DE MONTAUX) von den Krankheiten der Frauen u. von den Krankheiten der Schwangern, a. d. Franz. übersf. m. Anmerk. von Dr. C. H. SPOHR. Erfurt. 8.

CHAULNES, neue Art, mathematische u. astronomische Instrumente abzutheilen, a. d. Franz. übersf. v. I. S. HALLE, m. Kupf. Berlir. 4.

COMMENTARII de rebus in scientia naturali et medicina gestis, Vol. XXXII. Pars I. II. III. IV. Lipsf. 8.

COMMENTARIEN (medicinische) von einer Gesellschaft der Aerzte zu Edinburg, a. d. engl. 7ter, 8ter u. 9ter Band. Altenburg. 8.

COMMENTATIONES Soc. Reg. Gotting. ad 1787. Vol. IXum, cum figur. Gottingae. 4.

CRAWFORD'S (AD.) Theorie der Wärme, und über das Verbrennen u. Athemholen u. s. w. a. d. engl. m. Kupf. u. Anmerk. v. B. R. CRELL. Zweite ganz umgeänderte Aufl. Leipzig. 8.

CRELL'S (Dr. LOR.) chemische Annalen für 1789. 5tes - 10tes Stück. Leipzig. 8.

— Beiträge zu den Annalen 4ten Bandes 1stes Stück. Ebendasf.

CULLENS (WILLIAM) Anfangsgründe der praktischen Arzneikunst. Zweite Aufl. nach der 4ten englischen Ausgabe übersf. u. mit Anmerk. u. Zusatzen vermehrt, 4. Bände. Leipzig. 8.

De febre nosocomica. Mediolani et Lipsf. 8.

DELI (Dr. H. FR.) PHILYRA qua de nupero et praes. Acad. Imperial. Nat. Cur. statu agit. Erlangae. 4.

DIESKAU (C. I. C. F. von) das regelmäßige Versetzen der Bäume in Wäldern u. Gärten. Zweite vermehrte Aufl. Hildburgshausen. 8.

DOEVEREN (A.) observationes pathologico-anatomicae. Lugd. Batav. 4.

DOLOMIEU

DOLOMIEU (DEODAT de) *Bemerkungen über die Pon-
zainseln, u. Verzeichniß der vulkan. Produkte des
Aetna, als Fortsetzung seiner Reise nach den Lipa-
rischen Inseln, mit Anmerkungen, v. Bergr. VOIGT,
u. 4. Karten. Leipz. 8.*

— *Abhandlung über das Erdbeben in Kalabrien im
Jahr 1783. a. d. Franz. Ebend. 8.*

EBELL (Dr. I. G.) *Observationes neurologicae, ex
anatomie comparata cum icon. Traiecti ad Via-
drum et Züllichouiae. 8.*

EBERTS (I. I.) *Unterweisung in den Anfangsgründen
der Naturlehre, zum Gebrauch der Schulen, m. Kupf.
Dritte verm. Aufl. Leipzig. 8.*

ECTYPA plantarum Ratisbonens. oder *Abdrücke derje-
nigen Pflanzen, welche um Regensburg wild wach-
sen, von DAV. HEINR. HOPPE, 3tes u. 4tes Hundert.
Regensburg. fol.*

EHRHARTS (F.) *Beiträge zur Naturkunde und den
damit verwandten Wissenschaften, besonders der Bo-
tanik, Chemie, Haus- und Landwirthschaft etc. 4ter
u. 5ter Band. Hannover. 8.*

ELENCHI fungorum continuatio II. describens
XLIX. species et variet. totidem icon. CLXXXIV—
CCXXXII. repraesentatas. Auct. AVG. IOH. GE-
CAR. BATSCH. *Zweite Fortsetzung nach der Na-
tur gem. und beschriebener Schwämme, welche 49
Beschreib. von Arten und Abänder. und eben so viel
Abbild. von der 184.sten bis zur 232.sten enthält.
Halle. 4.*

ELSNERS (Dr. CHR. FR.) *Beiträge zur Fieberlehre
1stes Stück, zweite veränderte Ausg. Königsberg. 8.*

ENGELS (E. F. von) *Briefwechsel, die Landwirth-
schaft, insbes. die meklenb. betr. 3ter u. letzter Theil.
Schwerin. 8.*

ENTWURF (kurzer) *zur Ausrottung der Pfscherey
in der Medicin. Sendschreiben eines Arztes an seinen
Collegen. Stendal. 8.*

Tom. XXXII. Pars IV.

AAA

RRRAR-

ERHARDI (Dr. TH.) *Traëtatus de asphyxia neophytorum. Memmingae. 8.*

ESSIGS *zwo Abhandlungen vom Gebrechen der Füße und über Nutzen und Schaden der Ergötzlichkeiten. Augsburg. 8.*

EYEREL (IO.) *Commentaria in Max. Stollii aphorismos de cognoscendis et curandis febribus. Tom. Ildus. Vindobonae. 8.*

FALCONER'S (WILH.) *Abhandlung über den Einfluß der Leidenschaften auf die Krankheiten des Körpers, a. d. Engl. übersf. u. mit einigen Zusätzen vermehrt v. Dr. C. F. MICHAELIS. Leipzig. 8.*

TAUJAS (DE ST. FOND) *physikalische Abhandlung über den Trapp, a. d. Franz. Straßburg. 8.*

FEHR (IOSEPH) *etwas über die Hundswuth. Münster. 8.*

FERBERS (I. I.) *drei Briefe mineralogischen Inhalts. Berlin. 8.*

— *mineralog. u. metallurgische Bemerk. in Neufchatel, Franche Comté u. Bourgogne mit Kupf. Eben-
dass. 8.*

FEYJOO (des Pater) *Gesundheitsregeln vorzüglich für Gelehrte, aus dem Spanischen ins Engl. übersf. jetzo verdeutscht von Dr. C. F. MICHAELIS, nebst der Diätetik, von Dr. IOH. FOTHERGILL, u. dessen diätet. Bemerk. über den besondern Kopfschmerz. Zittau u. Leipzig. 8.*

FINKE (L. L.) *von dem verschiedenen Verfahren der Völker bei Kranken, Sterbenden u. Gestorbenen. Lingen. 8.*

FISCHERI (I. L.) *Historiae teniae hydatigenae in plexu choroideo inuentae accedunt nonnullae al. argumenti de vermibus intestinal. obseruat. c. tab. aenea. Lips. 8.*

FISCHERS (E. G.) *Betrachtungen über die Kometengeschichte des in diesem Jahre zurück erwarteten Kometen. Beschr. eines neuerfundnen bequemen Instruments zur Untersuchung desselben. Berlin. 8.*

- FLORA, oder Nachrichten von merkwürdigen Blumen,
3tes Heft, mit 2. nach der Natur gem. Nelken u. Au-
rikelblumen. Stuttgart. 8.
- FONTENELLE (BERNH. de) Dialogen über die Mehr-
heit der Welten. a. d. Franz. m. Anmerk. u. Kupf.
v. IOH. ELERT BODE. Zweite sehr verbesserte u.
vermehrte Aufl. Berlin. 8.
- FORSTERS (GEORG.) kleine Schriften. Ein Beitrag
zur Völker- u. Länderkunde, Naturgeschichte u. Phi-
losophie des Lebens, 1ster Band m. Kupf. Leipz. 8.
- FOURCROY'S (de) Anweisung zur Kenntniß u. An-
wendung der Arzneimitteln, in den Krankheiten, denen
der menschliche Körper unterworfen ist. a. d. Franz.
Stendal. 8.
- FRAGMENTE, Nachrichten u. Abhandlungen zur Be-
förderung der Finanz- Polizey- Oekonomie- u. Na-
turkunde, 2tes Stück. Berlin. 8.
- FRANKII (Dr. S. P.) Delectus opusculorum medi-
corum, Vol. VIum. Ticini et Lips. 8.
- FREESE (I. C.) über die Vekne u. Torfgräbereyen,
nebst 1. Karte. Aurich. 8.
- FRENZELS (I. T. G.) Skizze über die Thierarznei-
wissenschaft. Wien. 8.
- EBENDESSELBEN über die Erlernung der Thierarz-
neikunst auf Akademien. Wittenberg. 8.
— gerichtlich - polizeiliche Arzneiwissenschaft für
alle Stände u. zum Gebr. meiner acad. Vorlesungen
bestimmt. Ebendas. 8.
- GAERTNER (IO.) de fructibus et seminibus planta-
rum. Accedunt seminum centuriae quinque prio-
res, cum tab. aen. Tubingae. 4.
- GARNS (Dr. IOH. ANDR.) vermischte wichtige Kran-
kenfälle, nebst Kurart u. Erfolg. Wittenb. u.
Zerbst. 8.
- GEHLERS (Dr. I. S. T.) physikalisches Woerterbuch,
oder Versuch einer Erklärung der vornehmsten Be-
griffe

griffe und Kunstwörter der Naturlehre, mit kurzen Nachr. von der Gesch. der Erfind u. Beschr. der Werkzeuge begleitet, in alphabet. Ordnung, 2ter Theil mit Kupf. Leipzig. 8.

GENERA insectorum Linnaei et Fabricii, iconibus illustrata. Vitoduri. 4.

GESCHLECHTS- und Namensregister (botanisches) zur Erläuterung des Grafen MATTUSCHKA Flora silesiaca. Breslau. 8.

GEUNS (M. V.) *Abhandlung über die epidemische Ruhr, besonders des J. 1783. a. d. Hollaend. übers. v. I. H. KEUP. Düsseldorf. 8.*

GEUNS (S. S. van) Plantarum Belgii confoederati indigenarum spicilegium. Harderouici et Lipsi. 8.

GILLIBERTI (I. E.) Methodi Linnaeanae botanicae delineatio, cum figur. Lugdun. et Argentorati. 8.

GIRTANNERS (CHPH.) *Abhandlung über die venerische Krankheit, 2ter u. 3ter Theil. Götting. 8.*

GLEDITSCH (Dr. I. G.) *Botanica medica, oder die Lehre von den vorzüglich wirksamen einheim. Arzneigewächsen, zu öffentl. Vorlesungen für angehende Aerzte bestimmt, herausg. v. Dr. F. W. A. LÜDERS, 2ter Band. Berlin. 8.*

— *vermischte oekonomische u. botanische Abhandlungen, herausg. m. Kupf. und einer Vorrede versehen v. Dr. K. A. GERHARD. Berlin. 8.*

GMELINS (EBERH.) *fortgesetzte Untersuchungen über den thierischen Magnetismus. Tübingen. 8.*

GMELINS (IOH. FRIEDR.) *Grundriß allgem. Chemie, zum Gebrauch der Vorlesungen, 1ster u. 2ter Theil. Goetting. 8.*

GOESSELS, *Naturgeschichte u. Erdbeschreibung für Kinder. Zweite Auflage. Dresden. 8.*

GOETTLINGS (I. F. A.) *praktische Vorthelle u. Verbesserungen verschiedener pharmaceutisch-chemischer Operationen für Apotheker. Zweite sehr vermehr. u. verbess. Auflage. Weimar. 8.*

GOETT-

GOETTLINGS (I. F. A.) *Anweisung zum Gebrauch seines vollständ. chemischen Probirkabinets für Scheidekünstler, Aerzte, Naturforscher, Mineralogen, Metallurgen u. s. w.* Jena. 8.

GRETINGS (IOH. ERNST) *saemmtl. medizinische Schriften, herausg. v. C. W. GREDING, 1ster Theil.* Greiz. 8.

GRENS (F. A. C.) *systematisches Handbuch der Chemie, 2ter Theil.* Halle. 8.

GRUNDMANN. *vom Scharlachfleber. Zweite Auflage.* Gera. 8.

GRUNDRISS *der Wundarzneikunst in den Zeiten der Römer, oder A. CORN. CELSVS, 7. u. 8tes Buch von der Arzneikunst; a. d. Lat. übers. u. mit wichtigen Anmerk. begleitet v. I. C. JAEGER, nebst Hrn. Hofr. Gruners Vorrede.* Frankf. a. Mayn. 8.

— *der Forstwissenschaft.* Giessen. 8.

GRVNER (Dr. C. G.) *Allmanach für Aerzte u. Nicht-ärzte auf das J. 1790.* Jena. 8.

EUGENMUS (STEPH.) *saemmtliche oekonomische Schriften. Nach seinem Tode gesammelt, herausg. u. mit prakt. Anmerkungen begleitet v. GEORG. STUMPF.* Jena. 8.

GÜNTHERS *kurzer Entwurf der Nervenlehre, übers. von POTTGIESSER, mit Zusaetzen des Verfassers.* Düsseldorf. 8.

HACQUETS (B.) *Oryctographia carniolica, 4ter oder letzter Theil, m. Kupf.* Leipzig u. Wien. 4.

HAEN (ANT. von) *von der Pest.* Basel. 8.

HAGEN (Dr. CAR. G.) *Disquisitio aquae thurenensis in Prussia. Regiomontani.* 4.

— *chemische Zergliederung des thurenischen Wassers in Preussen.* Ebendas. 4.

HALLENS (I. S.) *fortgesetzte Magie, oder Zauberkräfte der Natur, so auf den Nutzen und die Belustigung angewendet werden, 2ter Band oder des ganzen Werks 6ter Band, m. Kupf.* Berlin. 8.

HALLERS (ALBRECHT von) *Tagebuch der medicinischen Literatur der J. 1745 – 1774. gesammelt, herausg. u. mit verschied. Abhandlungen begleitet von Dr. I. I. ROEMER u. Dr. P. VSTERI, 1ster Band. Bern. 8.*

HAMILTONS *Handbuch der militär. Arzneikunde für Feldärzte u. Wundärzte in Garnis. u. Kriegslazarethen. Nach dem Engl. 2 Theile. Leipzig. 8.*

HANDBUCH für Liebhaber der Natur u. Oekonomie, 2 Bände. Grätz. 8.

HAPPIL (A. F.) *Botanica pharmac. exhibens plantas officin. quarum nom. in dispensat. recensentur, cum icon. ab auct. aere inc. et viuo col. expr. adiect. nominib. pharmacev. e syst. Linn. depromtis, Fasc. XVII. et XVIII. seu Tab. CVI – CXXI. Fasc. XIX. et XX. seu Tab. 122 – 137. Berol. et Lips. fol.*
— *plantae selectae et rariores Fasc. II. et IIIus cum VI. Tabulis. ibidem fol.*

HEBERTS (I. PHIL.) *Grundriß des mathemat. u. chemisch-mineralog. Theils der Naturlehre. Berlin. 8.*

HECKERS (Dr. AVG. FR.) *Therapia generalis, oder Handbuch der allgem. Heilkunde. Berlin. 8.*

HEDWIG (D. I.) *de fibrae vegetabilis et animalis ortu. Sectio Ima. Lips. 4.*

— *Stirpes cryptogamicae. Vol. IIdi Fasc. IIIus, cum tab. color. XXI. – XL. Lips. fol.*

DASSELBE *Werk, deutsch, mit illum. Kupf. nebst Titel u. Vorrede zum zweiten Bande. Ebendas. fol.*

HEMMERS (I. I.) *Verhaltensregeln, wenn man sich zur Gewitterzeit in keinem bewafneten Gebäude befindet, mit 1. Kupf. Mannheim u. Leipzig. 8.*

HENSLERS (P. G.) *Geschichte der Luftseuche, 2ten Bandes 1ster Abschnitt. Hamburg. 8.*

HERBSTS (I. FR. WILH.) *Naturgeschichte des Thierreichs, darinn die merkwürdigsten u. nützl. Thiere, in systemat. Ordnung beschrieben u. alle Geschlechter*

ter in *Abbild. nach der Natur vorgestellt werden*,
10ten Bandes 2. u. 3tes Stück, m. einem vollständ.
Register über das ganze Werk. Berlin. 8.

HERBSTS (I. FR. WILH.) *Einleitung zur Kenntniß der*
Gewürme, 2ten Bandes 2. 3tes Stück u. letztes,
m. *Reg. und illum. Kupf. Ebend. 8.*

— *mit schw. Kupf. Ebend. 8.*

— *Versuch einer Naturgeschichte der Krabben und*
Krebse, nebst einer systematischen Beschreib. ihrer
verschiedenen Arten, 8tes Heft mit *Register*, womit
dieser 1ste Band geschlossen ist, nebst *illum. Kupf.*
Berlin u. Stralsund. 4.

HERMANN'S (BENED. FR. IOH.) *Versuch einer mine-*
ralog. Beschreibung des uralischen Erzgebürges,
2. Bände. *Berlin u. Stettin. 8.*

— *Beiträge zur Physik, Oekonomie, Mineralogie,*
Chemie, Technologie u. s.w. besonders der russ. u. an-
gränzenden Länder, 3ter Band. *Ebend. 8.*

HERMANN'S (CHR. G.) *mechanischer verbesserter Wind-*
Regen- und Trockenheitsbeobachter, m. *Kupf. Frei-*
berg u. Leipzig. 8.

HERMSTAEDT'S (DR. S. F.) *Bibliothek der neuesten*
physf. chemisch. metallurg. u. pharmaceutischen Litter-
ratur, 2ten B. 2tes u. 3tes Stück, *Berlin. 8.*

— *chemische Versuche u. Beobachtungen*, 2ter Band.
Berlin. 8.

HERWIG'S (GKORG) *Briefe über die Bergkunde, über*
Eisengruben u. Rohschmelzen m. *Kupf. Frankf. u.*
Leipzig. 8.

HERZ (SIMON) *Obferuationes de febribus neruosis.*
Berolini. 8.

HERZER (XAV.) *Sammlung von Beschreibungen der*
Seidenpflanze u. des syrischen Hundskrautes. Weis-
senburg in Franken. 8.

HILDEBRAND'S (A. F.) *Anatomie des Menschen*, 1ster
u. 2ter Band. *Braunschw. 8.*

HILDENBRANDS (VAL. IOH.) *Buch. für die Wund-
ärzte in den Oesterreichischen Staaten.* Leipzig u.
Warschau. 8.

HIPPOCRATIS aphorismi, notationibus variorum il-
lustrati, edidit I. CHR. RIEGER, 2. Vol. Ienae. 8.

HIRSCHFELDS (C. C. L.) *Handbuch der Fruchtbaum-
kunst, 2ter Theil.* Braunschw. 8.

HOCKS (IOH. IAK.) *Abhandl. von Versteinungen, Be-
schreib. Verzeichnungen u. Beziehungen der Grän-
zen, zum Gebrauch eines Beamten u. Geometers etc.*
Maynz. 8.

HOFERS (F. I.) *Lehrsätze der praktischen Geburts-
hülfe, die Manualoperationen betreffend, zum Ge-
brauch seiner Vorlesungen.* Augsburg. 8.

HOFFMANNS (DR. IOH. MICH.) *Abhandlung über
den Ursprung u. die Heilung der meisten u. gefähr-
lichsten Wassersuchten.* Frankf. am Mayn. 8.

HOFFMANNS (FRID. IOH. MICH.) *Abhandlung von
allen angenehmen u. unangenehmen Leidenschaften
der Menschen.* Ebend. 8.

— *Abhandlung über die Bleichsucht, Jungfernkrank-
heit, Schleimfieber u. wässrige Aufgedunsenheit,*
Frankf. am Mayn. 8.

HOFFMANNS (CHR. LVDW.) *Bestätigung der Noth-
wendigkeit, einem jeden Kranken in einem Hospitale
sein eigenes Zimmer zu geben.* Mainz. 8.

— *Opuscula medica; ex edit. et cum praefatione*
HENR. CHAVET. Monasterii. 8.

HOFFMANNS (C. A.) *erweiterte Tabelle über etliche
vierzig Mineralwasser u. Gesundbrunnen Deutsch-
lands, nach ihren sowohl flüchtigen als festen Bestand-
theilen genauer untersucht.* Weimar. fol.

HOFFMANNI (G. FRANC.) *Plantae lichenosae delinea-
tae et descriptae, Fasc. I. et II. cum figur. colora-
tis.* Lips. fol.

INDEX VOL. XXXI.

A.

Abdominis inflatio 452 seqq.
 tumor ex calculis 117. viscerum in fetu consideratio anatomica 625 seq.

Abcessus pectoris sanatus 327
Absorbentium vsus in quarta-na 144

Acetofellae sal essentialis 497.
 502. eius vsus in aquarum mineralium examine 512

Acetosum acidum purum 519.
 eius vsus in aquarum mineralium examine 511. an eidem acidum sacchari insit 517. 680

Aceti vini partes constitutivae 543.

Achillea odorata 37

Acida, eorum abusus quartanae causſa 144. actio in corpus humanum 329. in bilem 512. cur refrigerent 446. vegetabilia, experimenta cum iis instituta 527. eorum principium num vnum idemque 497. empyreumatica 531.

Acidum aëreum, vid. Aër fixus.
 — acetosum, fluoris mineralis, malorum, nitrosum, sacchari, salis communis, tartari, vitriolicum, vid. has voces.

— vniuersale regni vegetabilis 295

Aconiti vsus in fluore albo 150

Acta Acad. scient. imper. Petropol. pro anno 1781 Tom. V. 197. pro anno 1782. Tom. VI. 387

Aetinia pusilla 583

Adipis porcinae examen chemicum 214

Adstringentia 329

Aër 443. 520. eius vitia morborum causſae 314, 144. alcalinus s. sulphureus 309. atmosphaericus 292. dephlogisticatus ib. eius genesis 514. an Drebbelio cognitus fuerit 643. eius vsus in phthisi 327. efferuescentia genitus 283. fixus 284. 540. eius affinitates 285. formatio 286. pars necessaria corporum 539. in corpore humano 444. principium calculi 636. in metallis 389 seqq. 396, 520, 521. in antris charoniis 526. eius vsus in febribus putridis 322, 505. hepaticus 304. eius ortus via humida 534. inflammabilis s. phlogisticatus 290, 540, 687. nitrosus 307

Aëriformis aqua 293

Aesculus hippocastanum 495

Affinitas chemica 282 seqq.

Agaricus betulinus 41, flabeliformis 42. sepiarius 41

Agarici vsus in sudoribus colliquatiuis venereis 154

Agrostis miliacea 181. montana silesiaca ib. tenacissima 13

Aira caerulea 482. caryophyllea ib. praecox ib.

Alauda obscura 675

Alea pygmaea 668

Alcedo flauicans 665. semicaerulea ib. tuta ib. venerata ib.

Alchemiae futilitas 281. scriptores 282

Alchemilla alpina 487. vulgaris varietas ib.

Aa a 5

Alcyo-

- Alcyonium, zoophytorum genus 70
 Algae, plantarum ordo 90
 Alimenta morborum causa 314. eorum transitus ex ventriculo in duodenum impedimenta 548
 Alkali caustici puri parandi methodus optima 309. vsus in aquarum mineralium examine 513. in hydrophobia 326. fixi non caustici et calcis salitae solutio aquosa 308 sequ. minerale obtinendi methodus optima 308. phlogisticatum vid. sanguinis lixiuim.
 Alkali phosphorati decompositio 530. saccharati vsus in aquarum mineralium examine 513. vegetabile acetosum parandi modus vilissimus 518. volatilis aëratu vsus in aquarum mineralium examine 513. caustici vsus in eodem ib. sicci parandi ratio 531
 Alkalia num acidum salis contineant 529. fixorum similitudo cum absorbentibus 301 sequ.
 Alkalium vsus in quartana 144
 Allium arenarium 493. oleraceum 494. paniculatum ib. roseum 493. rotundum ib. satiuum ib.
 Aloës amarities bile mutatur 299
 Alopecurus agrestis 481. geniculatus ib.
 Alfine segetalis 493
 Alumen Grauenhorstianum s. Brunsvigense 303. romanum s. rubrum ib.
 Aluminis terra 301
 Aluminis vsus in quartana 144
 Amarorum vsus in quartana 144
 Ammoniacus sal 308. eius actio in magnesiā 544. tractatio cum sulphure 399. vsus in aquarum mineralium examine 514
 Ammoniāci gummi vsus 330
 Amputatio in aneurysmate 469 sequ. in gangraena 320
 Anarrhichas pantherinus 226
 Anas cascorola 667. damiatica ib. discors ib. lacquini ib. melanocephala 666. montana 667. olor 666. regia 667. torquata ib.
 Anatomes adminicula 596, 690. studium quatenus medicis necessarium 334 sequ. situs partium in ea necessitas 690
 Anatomicae descriptiones 691. icones ib.
 Anatomicarum denominationum in lingua vernacula pretium 688
 Anatomicorum inuentorum an vsus aliquis in medicina 334
 Anchusā officinalis 488
 Andropogon distachyos 25
 Aneurysma aortae descendens 552. artuum inferiorum 469
 Animae functionum ortus et in corpus efficacitas 46. eius sedes 610
 Animalcula infusoria materiae thermarum 33
 Ankylosis genu a fractura patellae 471
 Annales chemiae conscribendi consilium 707

- Anthelminthica 150, 549
 Antidota 326
 Antilope, pecorum genus 657
 Antimonii sulphuris aurati natura 400
 Antipathes, zoophytorum genus 63
 Antrum charonium Pyrmontanum 526
 Aptenodytes, nouum anserum genus 666. antarctica ib. papua ib.
 Aqua aëriiformis 293. calcarea 285. calcibus metallorum inhaerens 521. regis effectus vnde 309
 Aquae destillatio 293. frigidae vis roborans 131. vsus in febribus 322. in aërem mutatio ib. in terram ib. origo ex aëre dephlogistificato et phlogisto 519 sequ.
 Aqua medicata di Castellamare di Stabbia, Castilionensis, Cirilli, Driburgensis, Meinbergensis, Pisciarelli, Pyrmontana, Recobarii, Verdensis, vid. has voces.
 Aquae destillatae plantarum 296
 Aquarum martialium diuersitas 130
 Aquarum mineralium chemicum examen 511. vsus 330. in morbis neruosis 325. arte parandarum modus 330, 505
 Arabis ouirensis 34
 Arbuthnot, Bened. praemio donatus 361
 Arctomys, nouum glirium genus 653. Gundi 654. pruinosa ib.
 Ardea caledonica 670. cyanocephala 671. erythrocephala ib. Galatea ib. iamaicensis 670. chula 671. sinensis 670. torquata ib.
 Ardentia corpora 288
 Ardor radians ib.
 Arenaria biflora 36. ciliata ib. foliis lineari-subulatis cet. multicaulis ib. polygonoides 35
 Arenulae in vrinis 320
 Argenti fulminantis inuentor quis 519. nitrati vsus in aquarum mineralium examine 513
 Argilla 310
 Arnds prof. hist. nat. Bonnae factus 705
 Arnica doronicum 35. glacialis ib. scorpioides ib.
 Arnicae vires 322, 325, 333
 Arsenici natura 397 seqq. vis in quartana 454. vsus in cancro vteri 151. albi vsus in aquarum mineralium examine 514
 Arsenicale butyrum 399
 Arsenicum artificiale liquidum 401
 Artemisia hispanica 14
 Arteriarum in venas continuatio 136
 Arthritis 327. remedium aduersus eam 493
 Arundo calamagrostis 485
 Asperula laeuigata 486. tinctoria ib.
 Asplenium angustifolium 18
 Assae foetidae vires neruinæ 128
 Astragalus alpinus 40. castrensis ib. incanus ib.
 Astringentia minor 491
 Athamanta Matthioli 34
 Atrophia venerea 154

Auditus

Auditus organi consideratio anatomica 612 seqq.

Avena elatior 485. fulva ib. pratensis ib. pubescens ib. sesquitertia ib. sterilis 14

Aurantiorum corticis vsus in aegritudine vaga neruorum 129

Aurum fulminans 685

B.

Badier mortuus 359

Balaena gibbosa 659. rostrata ib.

Balnea 331. eorum diuersus effectus 506. vsus in arthritide et rheumatismo 327. in febribus 506. in morbis cutaneis 328. in neruorum vaga aegritudine 132. in morbis venereis 152. ante mercurii vsum ib.

Bannier praemium accepit 699

Barbula conuoluta 87. fallax 84. rigida ib. vnguiculata ib.

Barytes, vid. Terra ponderosa.

Begonia minor 13

Beguini spiritus, vid. Sulphuris hepar.

Belladonnae vsus in cancro vteri 151

Berger, Christ. Ioh. mortuus 357

Berlinghieri, Franc. Vacca, saggio intorno alle principali e più frequenti malattie del corpo umano 311

Bernoulli, Dan. vita et scripta 102

Bilis analysi 299. ab acidis mutatio 502

Biliofi morbi, remedium aduersus eos 504

Bismuthi cum sulphure tracta-

rio 395. vsus medicus 589

Blech, Ephr. Phil. physicus Gedanensis factus 357

Bleuland, Ian. de difficili aut impedito alimentorum ex ventriculo in duodenum progressu 547

Bode, Ioh. Elert, soc. reg. sc. Lond. socius factus 700

Boehmer, Phil. Adolph. mortuus 706

Boletus cinnamomeus 17. suberosus 42. subsquamosus ib.

van der Boon Mesch, Adr. Sand. de impedita urinae excretionem 142

Boracis ferreae analysi chemica 542

Boracis sal sedatiuus 310

Boracites 542

Borago officinalis 489

Bouffé praemium accepit 699

de Boyer inter nobiles relatus et artis obstetr. prof. publ. ord. Viennae constitutus 704

Brachionus, zoophytorum genus 61

Brancae urinae vsus nullus 330

Britannica, vid. Oxylapathum.

Briza eragrostis 483. media ib.

Bromus asper 484. inermis ib. mollis ib. pinnatus 485. purgans 484. syluaticus 485. triflorus ib.

Brugmans, Seb. Iustin. orationes duae 139

Bryum apocarpum L. vid. Grimmia ap. carneum L. vid.

Gr. delic. delicatulum 83. extintorium L. vid. **Leersia vulgaris. heteromallum L. vid. Dicranum het. imberbe L. vid. Barbula fallax. nutans**

Schreb.

- Schreb. vid. Webera nut. fetaceum Jacq. vid. Grimmia recurvata. stellatum Schreb. vid. Barbula rigida. trichodes L. vid. Meesia vliginosa. trunculatum L. vid. Gymnostomum truncatum. undulatum L. vid. Polytrichum undulatum. vnguiculatum Schreb. et Linn. vid. Barbula vnguiculata.
- Bubonum idea, distinctio, curatio 151
- Bucco Lathamii 664
- Bupleurum petraeum 34
- C.
- Caenopteris, nouum filicum genus 436
- Caeruleum Berolinense, vid. Sanguinis Lixiuum.
- Cagnoli praemium accepit 702
- Caiaput oleum 531
- Calcarea aqua 285
- Calces metallorum, vid. Metalla.
- Calculi 636 seqq. tumoris abdominis caussa 117. remedia aduersus eos 493, 636, 637. Acipenseris husonis examen chemicum 402 seqq. A. sturionis descriptio 407 sqq. examen chemicum 410
- Calor 445. eius natura et caussa positiua 286. animalis origo 298
- Calx cruda 285. eius aquae virtus antiphthifica nulla 330. in examine aquarum mineralium vsus 512
- Cameloparda, nouum pecorum genus 657
- Campanula barbata 490. ceruicaria 489. medium 490. patula 489. petraea 490. runculus 489
- Camper, Petr. mortuus 357
- Camphorae vires 128. in febribus 322, 329. in vulneribus 471
- Cancer vteri 150 sequ.
- Canis aureus 650
- Cantharides, experimenta cum iis instituta 146
- Capra capricornus 658
- Caprae mercurio inunctae lac remedium antiuenericum 154
- Cardamines vires 325
- Cardia, tumores ad eam 550
- Cardiaca cur calorem excitent 445
- Cardialgia 461
- Carminati, Bassian. opuscula therapeutica Vol. I. 587
- Carolinae thermae, vid. Thermae.
- Carpesium abrotanoides 37
- Cartilaginum structura 596. costarum ossificatio 598
- Cassia chinensis 11. crista 13. multiglandulosa 10. rusci-folia ib. sennoides 13
- di Castellammare della Stabbia aqua medicata 637
- Castilionens. aqua medicata ib.
- Castor 655. huidobrias ib. moschatus 652
- Castorei vis dubia 128
- Catharinaea hercynica vid. Polytrichum herc.
- Catheteres flexiles 639
- Cauia, glirium genus 653
- Cauteriorum vsus 331
- Cellularia, zoophytorum genus 60
- Centaurea rhapontica 35. verutum 14

- Centunculus minimus* 487
Cephalaea rheumatica complicata 115
Cera 295
Cerapterus, nouum coleopterorum genus 584
Ceraforum nigrorum succi partes constitutivae 527. sal ex eo 580
Cerastium latifolium 37
Cerebri consideratio anatomica 607 sequ.
Cerinthae maior 489. minor ib.
Certhia cinnamomea 665. fusca ib. Manillensis ib. omnicolor ib. purpurea ib. faninio ib.
Cervus virginianus 658
Chaerophyllum aureum 491
Charadrius fibiricus 672
Chemiae docendae ordo 282. medicae origo ib.
Chemica actionis medicamentorum explicatio insufficiens 127
Chemicorum inuentorum in medicina vsus limitatus 334
Chenopodium botrys 491
Chlora perfoliata 38
Chocolatae vsus in vaga nervorum aegritudine 531, 644
Cholera 682
Christiani praemium accepit 702
Chrysanthemum montanum 41
Cicutae vires medicae 454, 549, 550. in cancro vteri 151
Cineris lignorum vsus in tumore testiculi 117
Cirilli aqua medicata 130
Cirilliana methodus mercurii sublimatum exhibendi vbi commendanda 152
Citharexylum villosum 13
Citri sal essentialis 501, 527 sequ.
Clariana methodus mercurium exhibendi vbi commendanda 152
Clauculae cum sterno articulatio 598. fractura 470
Clavier praemium accepit 699
Clysteres antivenerei 153. chalybeati 555
Cobalti Rengersdorffensis analysis chemica 536
Coffea, opii corrigens 594. eius vsus in aegritudine vaganervorum 131. in morbis chronicis 324
Colica 462 sequ.
Colius nouum passerum genus 674
Colores 288
Columba corensis 674. melanoptera ib.
Colymborum diuisio 669. lateolus ib. minor ib. subcristatus ib.
Combustio corporum 289, 446
Comparetti, Andr. occurfus medici de vaga aegritudine infirmitatis nervorum 118
Concrementa terrea in genitalibus mulierum 622
Conuoluulus althaeoides 40
Corallina, zoophytorum genus dubium 74
Corcira, nouum grallarum genus 670
Cordis fibrarum muscularium consideratio anatomica 201, 239, 426
Coriandrum satium 492. testiculatum ib.
Cornu cerui sal artificialis quomodo parandus 531
Corpo-

- Corporis vires aduersus causas morbosas 316 sequ.
- Corpora ardentia 288. lucentia s. lucida ib. pellucida ib.
- Corrosio, anatomes adminiculum 596
- Coruus afer 663. australis ib.
- Costarum aberrationes insolitae 698
- Costus arabicus 20
- Cothenius, Chr. Andr. mortuus 356. eius legatum acad. imp. N. C. factum 702
- Cranii laesiones 696
- Crepis albida 13
- Crinium origo 300
- Crisis morborum 317
- Croton glandulosum 18. punctatum 25. tinctorium 39. huius tincturae vsus in aquarum mineralium examine 511
- Crurum ulcera inueterata quomodo tractanda 472
- Cryptogamia Linn. 75
- Cucurbitularum vsus 127
- Culleniani systematis vitia 312
- Cupri amalgama parandi methodus optima 413. color albus quomodo conciliandus 585. cum sulphure tractatio 389. vsus in aquarum mineralium examine 514
- Curcumae tincturae in aquarum mineralium examine vsus 511
- Cuscuta lupuliformis 488
- Cutis morbi chronici 328
- Cynanchum obliquum 21
- Cynoglossum cheirifolium 488 off. succi utilitas 48
- Cynosurus durus 483
- Cyperus compressus 478. flavescens ib. fuscus ib.
- Cyrilla racemiflora 24
- Cytisus tener 9
- D.
- Dais, nouum plantarum genus 21
- Dalbergius comes, elect. Mogunt. coadiut. Acad. Imp. N. C. membrum honorarium factus 701
- Daschkowia princeps acad. imp. N. C. membrum honorarium et soc. scient. Philadelph. membrum facta 705
- Dasytus octocinctus 649
- Daturae hybridae 263
- Daucus muricatus 491
- Decubitus supinus, nephritidis causa 635
- Delius, Henr. Frid. acad. imp. N. C. Director ac praeses 701
- Delphinium elatum 38. staphisagria ib. vrceolatum 22
- Delphinus leucas 659
- Dentium coalitus per tartarum 597
- Destillatio vegetabilium 293
- Detonatio, eius causa 307 sequ. sub metallorum cum sulphure tractatione 388 seq.
- Diaeta in quartana 145
- Dianthus syluestris 35
- Diarrhoea in asthmatico, dysenteria et epinyctidibus levata 116
- Dicquemare Abbas mortuus 359
- Dicranum heteromallum 84. latifolium 87
- Didelphis 651. caneriuora 652
- Didus nazarenus 673
- Digestio ciborum 448
- Digitalis purpureae vsus in cancro vteri 151

Diodia

Diodia virginica 16
Dipsacus laciniatus 486
Dipus, nouum glirium genus 686
Dinreticorum vsus in pulmonum morbis 329
Dolichos acinaciformis 17
Dolores 459 sequ.
Donly, Henr. de vesicantium vsu 145
Dracocephalum austriacum 18
Driburgensis aqua mineralis 532
Dulcamarae vsus in cancro vteri 151
Dulcedinis origo 295
Dysuriae causa singularis 638

E.

Echites domingensis 13
Echium violaceum 489
Eductorum chemicorum a productis differentia 539
Efferuescentia 447
Elaeodendrum orientale, nouum plantarum genus 113
Elatine hydropiper 496
Electricitatis vsus medicus hucusque negatur 331. vsus in paralyfi 518
Elementa 596. chemica corporum 282
Elevatio, phaenomenon 579
Eluela vid. *Ocospora*. cerasina 42. ciliaris ib. lilacea ib.
Elymus europaeus 485
Emberiza maelbyensis 676
Embryonis nutritio 626. situs ib. viscerum abdominalium conditio 625
Enchelis, vid. *Animalcula infusoria*.
Endocarpum pusillum 100
Enema vterinum in fluore albo 150

Epilobium alpestre 495. alpinum ib.
Epinyctides 116
Equi species nouae 659
Erdkobold, vid. *Cobaltum*.
Erica herbacea 495. tetralix ib.
Eriophorum alpinum 480
Eryngium aquaticum 21
Eschara, zoophytorum genus 59
Eudiometrum 307, 328
Euonymus europaeus 491
Eupatorium scandens 16
Euphorbia claua 16. heterophylla 23. linifolia 19
Expectorantia 329

F.

Fabricius, Ioh. Christ. societ. agricult. Paris. socius factus 359
Falconum diuisio 659. australis 660. Buffoni 661. coronatus 660. Forskählii ib. Iacquini 659. iaponensis 660. naeuius ib. nouae Hollandiae ib. orientalis ib. sinensis ib. vespertinoides 661
Faucium consideratio anatomica 616. obturatio in recens natis 53
Febris, difficultas in eius natura stabilienda 319. differentiae 346 sequ. essentielles 319 prognosis 320. curatio ib. biliosa Indiae, vesicantium in eo noxa 146. epidemica Neapoli 1775. grassata 532. putrida 117. quartana 143. arsenico curata 454
Febrifuga 502 seqq. 505
Felis cati varietates nouae 680. manul 229

Fellin

Fellingia, Ian. de febre quarta-
na 143

Fermentatio 449, 539

Fernambuci tincturae ad exa-
minandas aquas minerales
vſus 511

Ferrum, vid. Mars.

Festuca decumbens 484. duriu-
ſcula ib. myurus ib. ouina
483. rubra 484

Fetus et neogeniti vitae dia-
gnosis 50 ſeqq. eius debili-
tatis diiudicatio 53. mon-
ſtroſi deſcriptio 609

Fibrae animalis partes conſti-
tutiuae 300

Fidicularum ſpecies et effectus
50

Flaiani, Giuſ. nuovo metodo
di medicare alcune malattie
ſpettanti alla chirurgia 465

Flatulentia hyſterica et hypo-
chondriaca 325

Flatuoſi morbi 443

Flores fulgurantes 581

Fluoris albi hiſtoria et curatio
150

Fluoris mineralis acidum 309.
phoſphoreſcens qualitas 310

Fomentorum vſus in aegritu-
dine vaga neruorum 132

Fontana, Felix, a Iosepho II.
muneribus affectus 703

Fonticulorum vſus 127, 554

de France praemium accepit
699

Franz, Io. Ge. Frid. obiit. 357

Frictiones mercuriales 152,
331, 332

Friderici II. Imperatoris reliqu.
de arte venandi cum au-
bus 140

Frigoris natura et cauſſa poſi-
tiua 286

Tom. XXXII. Pars IV.

Fringilla aethiops 676. cartha-
ginenſis ib. diuca ib. pſitta-
cea ib.

Fucus concatenatus 43. corni-
culatus ib. foeniculaceus ib.
hypnoides 42. longiſſimus
43. ſelaginoides ib.

Fulgor ſlorum 581

Fulica aethiops 672. leucoryx
ib.

Fulminis effectus, cauſſa mor-
borum 314

Fumaria capnoides 38

Functiones animales 620

G.

Galega ochroleuca 13

Galium aparine, eius vſus me-
dicus 555. glaucum 486.
rotundifolium ib. rubioides
ib. ſaxatile ib. ſpurium ib.
ſyluaticum ib. ſylueſtre ib.
triſidum ib.

Gallarum vſus in quartana 145.
tincturae vſus in aquarum
mineralium examine 512

Galli methodus exhibendi mer-
curium ſublimatum 331

Ganglia, remedium ad ea pro-
poſitum 146

Gangliorum neruorum ſtructur-
a 122. vſus 125

Gangraena 319. eius a ſpha-
celo differentia 452

Gas hepaticum 304. ventofum
Helmontii 292

Gaſtricus ſuccus 298. eius prae-
paratio extra. ventriculum
299

Gaura fruticosa 20

Gehler, Ioh. Car. ordinis me-
dic. Lipſ. Decanus factus 358

Genitalium praeternaturalis
conditio 472 ſequ.

B b b

Geni-

- Genitalia muscorum** 76
Gentiana purpurea 491
Geranium ciconium 39. glutinosum 13. macrorrhizum 37. malacoides ib. nodosum 39. reuolutum 13. tetragonum 14
Geum aleppicum 14
Giavina, Petr. Mar. vita 467
Glaciei origo 292. in spatio vacuo 646. vsus in febris 322. in gangraena 320
Glandularum conglobatarum f. lymphaticarum structura 137
Glareola, nouum grallarum genus 969 seq.
Glaucope, nouum picarum genus 662
Glycine caribaea 12
Gonorrhoeae species et curatio 149
Gorgonia, zoophytorum genus 62
Goulardianae aquae vsus in inflammatione testiculi 149
Gracula carunculata 664
Gren, Friedr. Alb. Car. systematisches Handbuch der gesammten Chemie, I. Theil 281
Grimmia apocarpa 90. recurvata 89,
Guaiaci vires antiuenerae 133
Guattani, Car. vita 466
Guildenstaedt, Ioh. Ant. vita et scripta 197
Guttmann, Ioh. mortuus 705
Gymnastices vsus in aegritudine vaga neruorum 132
Gymnostomum Heimii 86. ouatum 78. pennatum 85. truncatum 78
Gypsum 302
- H.
- Haemorrhagiarum causae** 329
Haemorrhoides, ad eas reuocandas remedia 549
Haemoptysis 118, 327
Hagen, Ioh. Frid. consil. aul. et prof. artis obstetr. Berolini factus 359
Hebenstreit ord. med. Lips. assessor substitutus factus 358
Hedwig, Io. descriptio et adumbratio muscorum frondosorum T. I. Fasc. I. — T. II. Fasc. II. 75
Hedwigia ciliata 90
Heinrich, Placid. praemium accepit 360
Heliotropium europaeum 488
Heliotropii tinctura, vid. Croton tinct.
Hepatis structura 629. morbi 633. obstructio, remedium aduersus eam 587
Heracleum alpinum 492. austriacum ib.
Hepar fetus 625 seqq.
Hernia cruralis repositione curata 601. inguinalis causa 602
Herschelii noua inuenta astronomica 711
Heuclii memoria a Stanislao Augusto honorifice culta 703
van den Heuvel, C. I. tentamen nosologicum sistens morborum a vitio vis vitalis diuisionem et dispositionem practicam 335
Hibiscus virginicus 18
Hieracium saxatile 23
Hirudinum vsus in scirrhoparotidis 117
Holosteum umbellatum 486
Homo

Homo troglodytes inter simias
relatus 647
Humorum mutationes, morbo-
rum causae 313. unde pro-
ficiscantur 314. reuulsio 315
Hydnum papyraceum 42
Hydra, zoophytorum genus 59
Hydrargyrum, vid. Mercurius.
Hydrophobia 326. remedia
aduersus eam 146
Hydrops 327 sequ. remedia ad-
uersus eum 493 587
Hyoscyami effectus unde 315
Hypnum attenuatum Schreb.
vid. Leskia.
Hypochondriaca affectio 120.
remedium aduersus eam 588
Hyphis capitata 15. verticillata
ib.
Hyrax, nouum glirium genus
654. eius species ib.
Hysterica affectio 120

I.

Iacquin, Nic. Ios. collectanea
ad botanicam, chemiam et
historiam naturalem spe-
ctantia, Vol. I. 1
Iahn, Frid. acad. imp. N. C. so-
cius factus 703
Iamaicenses thermae, v. Ther-
mae.

Iansen, W. X. de pelagra, mor-
bo in Mediolanensi ducatu
endemia 552
Iatropa gossypifolia 22
Iconum anatomicarum requisi-
ta 691. pretium 692
Icterus albus 618
Ieiuni ruptura lethalis 583
Ignis quid sit 287, 288. elemen-
tum 520. effectus in corpo-
ra ex affinitate 283
Ileus morbus 463

Impotentia ad coniugium 150
Incensio a magnesia cum aci-
do vitriolico combinatione
347, 682
Inflammationes spontaneae
305
Inhalatio 619
Infani et furiosi, de iis medicos
audiendos esse 46
Instrumentorum physicorum
anglicorum vbi apparatus
vendibilis 740
Intestinorum abscessus sanatus
48. irritabilitas diuersa 453
Iosephi, Guil. prof. med. Rosto-
chii factus 703
Ipecacuanhae vsus in quartana
144

Ipomoea hederacea 18
Iris graminea 477. Gùlden-
staedtiana 236
Ischuria 317, 637, 638
Isis, zoophytorum genus 64
Isnardia palustris 37
Iuncus annuus 494. atratus ib.
bifidus ib. biglumis 495.
compressus 494. cricetorum
ib. filiformis ib. inflexus ib.
lazula s. nemorosus 495. spi-
catus ib. squarrosus 494

K.

Keiseri drageae 153
Kongi. Vetenskaps Academi-
ens Nya Handlingar Tom.
X. 579
Krause, Car. Christ. annum
stipendium accepit 358
Krockeri, Ant. Ioh. flora file-
siaca renouata 474
Kruiger, Ephr. mortuus 357.

L.

Laccae gummi solutionis vsus
640

B b b 2

Lacerta

- Lacerta viuipara** 112
Lacertarum vsus medicus 332, 590 seqq.
Lachenalia tricolor, nouum plantarum genus 114
Lactis diuersitas muliebris 297. vsus 331. in morbis nervosis 335. eiusque feri in aegritudine vaga neruorum 131
de Lamanon eques mortuus 359
Lampe protophyiscus Gedanensis factus 357
Lanae origo 300
Lanius antiquanus 661. melanocephalus 662. Natka ib.
Lapidum analysis chemica, de ea praecepta 537 sequ.
Larus atricilloides 669. crepidatus ib. eburneus ib.
Laserpitium archangelicum 34
Lavoisier annalium chemicorum edendorum consilium cepit 707
Leersia ciliata 83. vulgaris ib.
Lemur indri 648. laniger ib. potto ib.
Lepra asturiensis 553
Leporis cuniculi varietates 657. minimus 656. vescaccius ib.
Leskia attenuata 81
Leskii memoria 363 seqq.
Lethalitas, vid. Vulnera.
Lettieri, Natal. dissertatio de remedio febrifugo nostrate, cortici peruiano pari, vel forsan eo praestantiore 502
Leveling, Henr. prof. med. extr. Argent. factus 359
Leuelingii, Henr. Palmat. observationes anatomicae rariores, Fasc. I. 693
Lichenis chrysophthalmi varietas 18. citrinus 101. cupularis 100. decipiens 91. perforatus 17. proboscideus 91. pulmonarius Mich. et Dill. vid. Endocarpum. sepincola 92
Lien consumtus 551. eius obstructio, remedium aduersus eam 588. vulnerum lethalitas 47
Ligamentum teres 598
Lilium bulbiferum 494
Lindernia pyxidaria 37
a Linné, Car. Systema naturae, Edit. XIII. aucta, reformatata a Ioh. Frid. Gmelin, T. I. P. I. 646. P. II. 666
Linum austriacum 493. tenuifolium ib. viscosum 39
Liquoris anodynus vsus in aegritudine vaga neruorum 129
Lisianthus glaucifolius 12
Lixiuum sanguinis, vid. Sanguis.
Lobelia syphilitica 24
Loder, Iust. Christ. Anatomisches Handbuch, I. Band 687
Lolium perenne 485
Lonicera alpigena 490. nigra ib.
Loranthus europaeus 495
Lorran munere physici in nosodoch. vniuersali Viennensi se abdicauit, Haddickii que sanitatis curam suscepit 704
Loxia erythromelas 675
de Loy abregé chronologique pour servir à l'histoire de la physique jusqu'à nos jours 640
Lucentia s. lucida corpora 288
Ludwig, Christ. Frid. icones cavitatum thoracis et abdominis a tergo apertarum 689. ord.

ord. med. Lips. affessor fa-
ctus 358
Lugdunensis acad. scient. ar-
tiumque bonarum historia
155
Lugduni Batauorum nosoco-
mium clinicum institutum
143
Lux eiusque natura 287 sequ.
Lycoperdon aestiuum 42. epi-
dendrum ib. peculiforme 18
Lycopsis pulla 489. vesicaria
ib.
Lyonnet, Petr. mortuus 356
Lysimachia punctata 489. thyrsi-
flora ib.

M.

Macqui arbor chilensis 706
Madrepora, zoophytorum ge-
nus 65
Magistratus cura circa venena
56
Magnesia alba 300. eius cum
acido vitriolico combinatio,
incensionis causa 547, 682.
vis in salem ammoniacum
544
— vitriariorum, eius vsus ad
dulcificationem acidorum
679 seqq. quomodo ibi agat
680
Magnetis virium mutatio a
terrae motu 644. vires me-
dicæ 333
Magnetismus animalis 325
Maine abbas praemium acce-
pit 699
Malorum acidum 531 sequ.
Malua scoparia 11
Maluae vis lithonriptica 636
Maluaceae plantae hybridæ
438
Mannot praemium accepit 699

Marmorum quorundam russi-
corum analysi chemica 415
seqq.
Martis minerae via humida
examinandæ 583. eius cum
sulphure tractatio 388 sequ.
vsus 525. 533. in aegritudi-
ne vaga nervorum 129 sequ.
in aquarum mineralium
examine 514
Marugi, Giov. Lionard. le ma-
lattie flatuose 442
Mascagni, Paul. vasorum lym-
phaticorum corporis huma-
ni historia 132
Mastichis gummi, tentamina
cum eo 685
Maxilla inferior 597
Mayer medicus regius ord. et
membrum coll. med. et coll.
sanitatis Berolini factus 358
Mechanismus naturalis machi-
nae humanae 317
Medicago carstiensis 13
Medicamentorum notio 328.
diuisio ib.
Medicinae exercendae difficul-
tates 143
Medicorum officium in feбри-
bus epidemicis 323
Medulla spinalis 609
Medusa vnguiculata 583
Meesia longifera 83. vliginosa
77
Meinbergensis aquæ minera-
lis analysi chemica 514.
fontis salini 533. fontis sul-
phurei 534 seqq. pyritae
sulphurei analysi chemica
536
Melica ciliata 482. nutans ib.
Mellin medicus primarius in
nosodochio vniuersali phy-
sicus-
Bbb 3

Heusque in seminario ge-
 nerali Viennensi factus 704
 Menstrui vniuersalis nullitas
 283
 Menstrua suppressa morborum
 causa 314
 Menthae vis carminatiua 549
 Mercurii cum sulphure tracta-
 tio 395. in aqua pura solu-
 bilitas 544. cum stanno amal-
 gamati ab eodem separandi
 ratio 582. fulminantis in-
 ventor quis 519. nitrati so-
 tionis vsus in aquarum mi-
 neralium examine 513 sequ.
 sublimati vsus in eodem 514.
 in gonorrhoea secundaria
 149. methodus Cirilliana
 ubi adhibenda 152. de ea
 iudicium 331
 Mercurii vsus 330 sequ. 549.
 in aegritudine vaga neruo-
 rum 131
 Mercurialium vsus in buboni-
 bus 151. cancro vteri ib.
 hydrophobia 326. sub varia
 forma in lue venerea vni-
 versali 151
 Mergus imperialis 667
 Mesenterii obstructio, remedia
 aduersus eam 588
 Metallorum compositio 520.
 cum sulphure tractatio 387.
 calces 540, 545. num aquam
 contineant 521
 Meteorismus 460
 Meyle artis veterinariae prof.
 Moguntiae constitutus 711
 Miasmatum classificatio 619
 sequ.
 Millepora, zoophytorum ge-
 nus 64
 Mimosa speciosa 10
 Maium crudum 59. osmunda-

ceum Dickson. vid. Gymno-
 stomum pennatum. polytri-
 choides L. vid. Potytrichum
 alcides et nanum. pyriforme
 L. vid. Weber. pyriformis.
 fetaceum L. vid. Barbula
 conuoluta. triquetrum L.
 vid. Meesia longifeta.
 Molybdaenae terram reducen-
 di tentamina 584
 Monas, vid. Animalcula infu-
 soria.
 Montia fontana 485
 Montium origo 388
 Morbi chronici 324. neruosi ib.
 Morborum differentia respectu
 causarum 315. characteris et
 durationis ib. sequ. exitus
 317. eorum prospectus ge-
 neralis 318 sequ. diuisio a
 vitio vis vitalis 336 sequ.
 Mortis causa immediata in
 morbis 320
 Motacilla albicapilla 667. albi-
 da ib. cyana ib. gularis ib.
 longirostris ib. melanoce-
 phala ib. moschita ib.
 Moxae vsus 554
 Mucus 298
 Müller, Ioh. Valent. praktisches
 Handbuch der medicinischen
 Galanteriekrankheiten 146
 Mus pumilio 655
 Muscicapa aëdon 677. albi-
 frons ib. comata ib. nigra
 ib. ochracea ib.
 Muscorum vsus 76. frondoso-
 rum descriptio 75
 Musculares fibrae 599
 Musculorum diuersitas ib. mo-
 tus ib. singulorum conside-
 ratio 600 sequ.

Museum Leskeanum, regnum
animale, Vol. I. 141
Mustela vulgaris 651
Myagrum arborescens 9
Myosotis nana 37
Myoxus, nouum glirium genus
654. eius species ib.

N.

Nannoni, Lor. trattato di ana-
tomia, fisiologia, e zootomia
595
Naphtha salis 679 sequ. eius
parandae difficultas 508 seq.
685. subsidium ad eam pa-
randam 545
Narcissus bicolor 493. pseudo-
narcissus ib.
Nardus stricta 480
Nasi consideratio anatomica
612
Natura 317, 413
Naturae regnorum diuisio no-
ua 58
Neapoli vniuersitas recens con-
stituta 634
Necrosis 453
Nephrotomia 637
Nerium coronarium 20
Nervorum ortus 608. agilitatis
diuersitas vnde 123. cum
vasis communio ib. morbi
324. infirmitatis aegritudo
vaga 119 sequ.
Nitri cum arsenico tractatio
398. vsus in febribus inflam-
matoriis 322, 330
Nitrosum acidum 519 sequ.
eius separatio vnde 306. a
vitriolico purgati ib. vsus in
aquarum mineralium exami-
ne 511. an phlogiston pars
eiusdem necessaria 130. de-
phlogisticatum 307

Niuis vsus in febribus 322
Noua acta heluetica Vol. I. 101
Nudow, Henr. prof. ord. phy-
siol. pathol. et therap. in in-
stit. medicochirurg. Petro-
poli factus 360
Numida cristata 673. mitrata
ib.
Nutritio 620

O.

Ostospora, fungorum genus
91. albidula 97. applanata
94. bulbosa 98. carnea 95.
citrina 96. craterella 100.
elastica 95. fasciculata 93.
fungoidaster 99. haemo-
stigma 93. hirta 92. leuco-
loma ib. lutescens 97. mi-
nuta 94. nana 96. porphy-
rophora 95. pustulata 94.
pyriformis 97. rhizophora
93. scutellata 92. tuberosa
98. varia 95. villosa 100.
violacea 96. viridans 94
Oculi consideratio anatomica
610
Oedema pedum, remedium ad-
versus illud 588
Oleorum phosphorescentia
295. vsus 330. in motibus
spasmodicis 127. externus
322, 328, 330, 331. aethe-
reorum obtinendorum ratio
296
Oleum vitrioli, vid. Vitriolum
Olivari Genuae medicinam cli-
nicam docere iussus 710
Oliuarum olei sal 685
Oosterdyk, Nic. Georg. de ar-
dua medicinae exercendae
provincia 142
Opium 127, 321 seq. 325, 327,
328 sequ. aduersus morbos
Bbb 4 vnc.

- venereos 593 seq. corrigentia eius 594
- Orchis morauica 11
- Oriolus aunalaschkenfis 664. fuscus 663. viridis ib.
- Oris consideratio anatomica 614 sequ.
- Ornithogalum narbonense 694
- Osburg, prof. chem. et mat. med. Petropoli factus 360
- Ossium C. H. numerus 596. ossa metacarpi 598. sesamoidea 599. sincipitis 597. sphenoideum ib. tarsi 599. vomeris 597. ossicula Wormiana ib.
- Osteospermum caeruleum 13
- Quis pudu 658
- Oxylapathi vsus in fluore albo 150. in quartana 145
- P.
- Pallas, P. S. Charakteristik der Thierpflanzen, aus dem Lat. übersetzt von Ch. Fr. Wilkens, herausgeg. von Joh. Fr. Wilh. Herbst 56*
- Panicum filiforme 480. hirtellum 37. italicum 480. lineare ib. maximum 13. sanguinale 480. verticillatum ib. viride ib.
- Paracentesis 328
- Paralysis electricitate sanata 518
- Paraplegia in sene asthmatico saluatione spontanea curata 115
- Parotidis scirrhus 117
- Parra chilensis 672. luzonensis ib. sinensis ib.
- Partus bicipitis descriptio 117. serotinus valde dubius 45. tredecimestris pro legitimo habitus 44
- Parus knjaescik 678
- Paspalum virgatum 17
- Pasquier praemium accepit 699
- Passiflora rubra 19
- Patellae fractura 470
- Pectoris morbus singularis descriptus 116
- Pelagra, Mediolanensium morbus endemius 355, 553, 592
- Pelecanus erythrorhynchus 668. manillensis ib. roseus ib. thagus ib.
- Pellucida corpora 288
- Penelope, nouum gallinarum genus 673. cumanensis ib. pipelen ib.
- Pennatula, zoophytorum genus 71
- Peplis portula 38
- Perigonium, muscorum pars 76
- Peruiani corticis connubium cum magnesia 589. vsus 332 sequ. in febribus intermittentibus 323. putridis 322. quartana 144 seq. gangraena 320. morbis neruosis 325. vaga aegritudine neruorum 129
- Peucedanum alsaticum 491
- Peziza, fungorum genus 91. scutellata L. vid. Octospora scutell.
- Phaëtontis species 668
- Phalaris bryzoides 480
- Phascum crispum 80. curuicolum ib. nitidum 88. patens 80. pedunculatum L. vid. Splachnum mnioides. subulatum 88. Philtra 55
- Phleum alpinum 481. asperum 17. nodosum 481. schoenoides 17
- Phlomis caribaea 22
- Phlogiston 259 seqq. 446, 520. an

an pars necessaria acidi nitrosi 530. defectus an augmenti ponderis causa 540, 545. arsenici 397. metallorum ib.

Phocae vitulinae varietates nouae 650

Phosphorescentia corporum 288. unde 305. oleorum 295

Phosphorus Cantonianus 305

Phthisis pulmonalis 326 sequ. calor in ea unde 445. venerea curata 331

Physalis alkekengi 490. prostrata 15

Physices inuentorum chronologicus conspectus 640. vsus in medicina nullus 334. studium quatenus medico necessarium ib.

Physiologia an ab anatome separanda 688

Phyteuma orbicularis 490

Phytotoma, nouum passerum genus 674

Picus cafer 664. lignarius ib. pitui ib.

Piper. medium 20. obtusifolium ib.

Pisciarelli aqua medicata 502 sequ.

Pizorno mortuus 706

Planer, Ioh. Iac. acad. imp. N. C. socius factus 359

Plantae carinthiacae rariores 34. hybridae 220, 263, 438

Plantarum destillatio 296. spiritus rector 297

Plantago aegyptiaca 10. altissima 487. maxima 13. pumila 487. ferraria ib. subulata ib.

Plenkii mercurius gummosus 153

Pleuritidis biliosae origo 321

Plumbi tractatio cum sulphure

390 sequ. nitrati vsus in aquarum mineralium examine 513, 514. saccharum vid. Saturnus. minerae albae Hercyniae superioris analysi chemica 545. minerae spatiosae Carinthiacae 1 sequ. splendentis cubici minerae analysi chemica 546

Poa angustifolia 482. annua 483. bulbosa 482. cristata ib. palustris ib. rigida 483. salina 482. syluatica ib.

Pock, Phil. Iac. mortuus 705

Poculum sterilitatis, amoris, odii, furoris cet. 55

Podagra, vesicantium in ea effectus 146. vid. etiam Arthritis.

Pohl, Ioh. Ehrenfr. pathol. prof. ord. in acad. Lips. factus 358

Pohlia elongata, nouum muscorum genus 88

Polemonium caeruleum 489

Polletrorum species et effectus 49

Polygonum fagopyrum 496. orientale ib.

Polypi vteri 621 sequ.

Polytrichum aloides 82. hercynicum ib. nanum 81. undulatum 83

Pondus hominis adulti 696. corporum, augmentum eius an a phlogisti iactura 540

Portulacaria afra 24

Potamogeton densum 488

Praemia a soc. agricult. et artium Cassellana ad annum 1791. constituta 700. a soc. reg. scient. Hafniensi distributa 702. noua constituta

- ad annum 1790. ib. a soc. scient. Harlemensi ad annum 1790. 701. ad 1791. 700. ad 1793. 701. annorum 1781. et 1783. repetitum 709. a soc. med. Londinensi ad annum 1790. 698. ab acad. reg. Nanceiana distributa 699. ab acad. reg. scient. Parisina ad annum 1789. distributum 699. ad eundem annum repetitum ib. sequ. ad annum 1790. proposita 361. ad annum 1791. ib. 699
- Pragae domus obstetricia aperta 705
- Procellaria pacifica 668
- Productorum chemicorum ab eductis differentia 539
- Psittacus choraesus 662. cyanolyseos 663. iaguilma 662. leuerianus ib. lineatus ib. plumbeus ib. vlietanus ib.
- Psophia undulata 673
- Puerpera, signa vitae fetus ex ea petenda 51
- Pulex penetrans 581
- Pulmonaria maritima 488
- Pulmonum docimasia 52, 54
- Purgantia in morbis inflammatoriis quando locum habeant 321. in vaga aegritudine nervorum 126
- Purpura Basileae 1756. observata 115
- Pus ex umbilico puellae emissum 117, 118
- Putredo, eius effectus in recens natis 53. humorum 313
- Pylori callositas 552. tumor ad eum 550
- Pyritae sulphurei meinbergensis analysis chemica 516
- Pyrmontani fontis noui analysis chemica 516. reliquorum 540 seqq.
- Pyrophorus 305
- Q.
- Quassia excelsa 585
- Quassiae infusum in cephalaea rheumatica 115
- Quercus corticis decoctum in quartana 145
- R.
- Radix muscorum 76
- Rallus sandwichensis 672
- Recobarii aqua medicata 130
- Recuruirostra americana 672
- Renes in cauitate peluis 52. eorum morbi 635 seqq. sinister consumtus 552
- Resina elastica 294, 639 sequ.
- Respiratio 618
- Reuellentia 315
- Rhamnus alaternus 491. alpinus 490. saxatilis ib.
- Rhamphastos albus 663. dubius ib.
- Rheumatismus 327
- Rhinocerotis noua species 649
- Rhus typhinum 492
- Ribes grossularia 491
- Ribesiorum rubrorum succi partes constitutivae 527
- Richter prof. med. ord. Halae factus 704
- Robinia vesicaria 16
- Rougnon, N. F. considerationes pathologico-semeioticae Fasc. II. 617
- Rubia fruticosa 13
- Rumex scutatus 495

Rupium

Rupium terrae superficiem te-
gentium diuifio 425
Ruta legitima 13

S.

Saccharum 295. eius abufus
noxius 590. effectus in ani-
malia 589. in lac 297. eius
acidum 517. vegetabilium
pars conftitutiuā 517, 681,
686. illius vfus in aquarum
mineralium examine 512.
faterni, vid. Saturnus.

Sales acidi vid. Acidum. alka-
lini vegetabiles non vnus
indolis 284. vid. etiam Alka-
li. ammoniacalis, naturalis
fanguinis 327. ammoniacus
vid. Ammoniacus. commu-
nis f. culinaris decompositio
per calces 686. effectus in
animalibus 589. acidum eius
num in alkalibus contineat-
tur 529. ipfius dulcificatio
508, 538 fequ. 679 fequ. cry-
ftallorum fatifcentia vnde
284. digeftiui decompositio
530. effentiales vegetabi-
lium 490 feqq. citri et tar-
tari depuratio 518. mirabilis
Glauberi 302

Salicis albae inefficacia in quar-
tana 145

Salicornia herbacea 476

Saluiae indoles faponacea ne-
gatur 298

Saluatio 332. fpontanea para-
plegiam tollens 115

Saluia verticillata 447

Sanguis ab infufione canthari-
dum coagulatus 146. eius
rubedo vnde 297. fputum
vid. Haemoptifis. miffio vid.
Venaefectio.

Sanguinis lixiuium 686. eius
hifloria 522 partes conftitu-
tiuae 682. materiam tingen-
tem conftituentes 538. pars
acida materiae tingentis
518. ferri quantitas 522.
vtriusque relatio ad fe inui-
cem 683. illius vfus in aqua-
rum mineralium examine
512. in minerarum ferri 583

Sanguiforba officinalis 487

Saponaceae fubftantiae 295

Saponis vfus medicus 320. aci-
di praeparatio et vfus 587,
637. fpiritus vfus in exami-
ne aquarum mineralium
509

Sarcoma in abdomine fectione
detectum 473

Sarfaparillae vires antiuene-
reae 331

Saturni facchari vfus in aqua-
rum mineralium examine
514

Saturni fatellites noui detecti
711

Saxi incani Hercyniae analyfis
chemica 529, 546. rubrofu-
fci Ilfeldenfis 537

Saxifraga caefpitofa 38. hyp-
noides 39. mutata 38. oppo-
fitifolia ib. petraea 34

Scabies, remedia aduerfus eam
153, 591

Scabiofa fyluatica 486

Scarpa, Ant. difquifitiones de
auditu et olfactu edendas
annunciat 362 fequ.

Schlegel, Ioh. Ch. Traug. Col-
lectio opufculorum felecto-
rum ad med. for. fpectan-
tium Vol. II. 43

Schneider, Leber. E. mortuus
706

Schoen-

- Schoenbauer prof. hist. nat. in acad. Pestienfi factus 703
 Schoenus albus 478. compref-
 fus 477. ferrugineus ib. vm-
 bellatus 17
 Schotia speciosa, nouum plan-
 tarum genus 14
 Scillae vſus in quartana 144.
 in calculo renum 637
 Scirpus acicularis 479. caeſpi-
 toſus ib. capitatus fileſiacus
 ib. holoschoenus ib. mari-
 timus ib. ſetaceus ib.
 Sciurus abyſſinicus 656. carol-
 inenſis 655. dſchinchicus
 656. hudsonius ib. madaga-
 ſcarienſis ib. vulpinus 655
 Sclerodendrum africanum, no-
 vum plantarum genus 113
 Scolopax belgica 67. obſcura
 ib.
 Scopoli, Ioh. Ant. vita et ſcri-
 pta 161
 Scopus, nouum grallarum ge-
 nus 670
 Scorbutus 327
 Scrophulae ib.
 Secretiones 618, 622
 Sedum rubens 39
 Selinum ſylueſtre 491
 Seminis virilis indoles 148
 Senecio roſmarinifolius 19
 Sennae vſus in quartana 144
 Serici origo 300
 Serpentariae virtus negatur 330
 Serratula alpina 40
 Sertularia, zoophytorum genus
 62
 Sefeli glaucum 492. hippoma-
 rathrum ib. tortuoſum 41
 Sherardia aruenſis 486
 Sibbaldia procumbens 40
 Sida atrofanguinea 11. carpi-
 nifolia 9
 Simaruba 320, 333
 Simia lap 648. maura ib. mona
 ib. petauriſta ib. roloway
 ib. rubra ib. talapoin ib.
 Sinus durae matris 597. fron-
 tales 596
 Siphon anatomicus 596
 Siſymbrium pannonicum 13
 Situs partium in adminiſtratio-
 ne anatomica 690
 Sium anguſtifolium 492
 Societatis correfpondentis me-
 dicorum chirurgorumque
 Helueticorum ſciagraphia
 707
 Solanaceae plantae hybridae
 263
 Solanum aculeatiſſimum 15.
 corymbolum 13
 Solutio chemica corporum 283
 Sommer phyſ. in noſodochio
 vniuerſali Vienneni factus
 704
 Sonchus frutiſoſus 13
 Sorex 652. exilis ib. fodiens
 586. marinus 652. moſcha-
 tus 265. myofurus ſ. muri-
 nus Linn. 275. ſurinamenſis
 652
 Spafmi abdominales 463 ſeqq.
 Spatum ponderoſum 303
 Specifica remedia 315, 317,
 328, 329, 331
 Spectrum marinum, phaeno-
 menon 579
 Sphaceli a gangraena diſeri-
 men 452
 Spiritus Beguini, vid. Sulphu-
 ris hepar. vini, vid. Vinum.
 Splachnum ampullaceum 99.
 anguſtatum 98. luteum 99.
 mnioides 98. rubrum 99.
 ſphaericum ib. vaſculoſum
 ib. vrceolatum 98
 Spongia

- Spongia 200. phytorum genus 72
- Stachys canariensis 9
- Stannum cum mercurio amalgamatum quomodo separandum 592. eiusdem cum sulphure tractatio 393 sequ.
- Staphylea pinnata 493
- Statice Cimonium ib.
- Stebler, Franc. Ant. Ferd. mortuus 706
- Stellaria biflora 36. cerastioides ib. fontana 41
- Stellera passerina 12
- Sterculiae noua species 114
- Sterni articulatio cum clauicula 598. foramen ib.
- Sternutatio 612
- Stipa iunceae 485. pennata ib. van Stipriaan, Abr. observationes chemicae de quibusdam salibus essentialibus vegetabilium 496
- Stranguria a vesicantibus 146
- Strasgy, Ad. mortuus 704
- Strix acadica 661. nouae Seelandiae ib. Tengmalmi ib. wapacanthu ib.
- Sturnus loyca 675
- Sulphur, an verum in aquis hepaticis 304. eius tractatio cum metallis 387. cum sale ammoniaco 399. aëratum 304. eiusdem hepatis volatilis vsus in aquarum mineralium examine 514
- Sulphureorum fontium diuersitas 535
- Supprian, Frid. Leber. mortuus 706
- Sutura lambdoidea 597
- Symphytum tuberosum 488
- T.
- Taedae aqua, resinae elasticae menstruum 640. eius vsus medicus 555
- Taenia, zoophytorum genus dubium 73
- Tamarindorum sal essentialis 501, 527
- Tanagra tibirica 676
- Tantalus pillus 671
- Tapir, nouum belluarum genus 658
- Tartarus, acidi essentialis eius inuentor quis 519. antimoniati emetici parandi ratio 686. vires diaphoreticae negantur 323
- Terebinthinae spiritus, resinae elasticae menstruum 640
- Terminalia catappa 19
- Terra aluminis 301. animalis 299. calcarea 300. eius effectus in crystallisatione sacchari 497. ponderosa 301. ponderosae acetatae et salitae vsus in aquarum mineralium examine 513. ponderosa vitriolata 303. filicea ib. zeolithica 394
- Terrae motuum ortus 425. superficies, rupium et stratorum eam tegentium antiquitas 424
- Terrarum analysi chemica, praecepta de ea 537 sequ.
- Testiculi inflammatio 149. tumor 117
- Tetrao canus 673. capensis ib. gibraltarius 674. kakelik ib. namaqua 673. viridis ib.
- Teucrium betonicaefolium 21
- Thermarum vsus 330. Carolinarum et Toeplizenium materia viridis, observationes

- nes et experimenta super ea
26. Iamaicenses 582
Thesium alpinum 491. lino-
phyllum ib.
Thiery praemium accepit 699
Thymelaeae corticis vsus in
scirrho parotidis 117
Timmia megapolitana, nouum
muscorum genus 87
Timoris effectus 313
Toeplizenses thermae, vid.
Thermae.
Tormentorum aestimatio me-
dica 48
Tournefortia cymosa 14
Tragallino, planta noxia 314
Tragopogon porrifolius 15
Tremella filamentosa 27. ther-
malis 26
Trichechus Dugony 649. ma-
nati varietates ib.
Trichiuri species noua 581
Trichostomum pallidum 85.
pusillum ib.
Trifolium pratense, experi-
menta chemica cum eodem
instituta 683
Trigla rubicunda 581
Tringa keptuschica 671 sequ.
Trochilus cyanocephalus 666.
flauescens ib. margaritaceus
ib. multicolor ib. purpura-
tus ib.
Troia, Mich. Lezioni intorno
ai mali della vescica orina-
ria, e delle sue appartenen-
ze T.I. 634
Tubipora, zoophytorum genus
69
Tubularia, zoophytorum ge-
nus 61
Tumor in abdomine 551. ad
articulos a variolis relictus,
ad eum praeuertendum re-
medium propositum 146. ad
cardiam et pylorum 551. cy-
stici, ad eos remedium pro-
positum 146. hypochondrii
sinistri curatus 549
Turdus africanus 675. leucu-
rus ib. vlietensis ib.
Turraea pubescens 586. virens
ib.
Tympanites 464
- V.
- Vagina vteri vid. Vterus.
Vaginalis, nouum grallarum
genus 670
Valeriana celtica 4. eius ana-
lysis chemica 7. vsus 8. vires
cum syluestri comparatae
593. syluestris vsus in ae-
gritudine vaga neruorum
129
Vapores, neruorum morbus
120
Vasorum maiorum disquisitio
ad vitam fetus determinan-
dam 52. lymphaticorum hi-
storia 132 seqq.
Vegetabilium vsus in morbis
neruosis 125
Venaesectio in infirmitate ner-
uorum 126. eius necessitas
in morbis inflammatoriis
321
Veneficium culposum 55. do-
losum 54
Veneni idea ac diuisio 54
Venerei morbi 148 seqq. 326,
591 sequ. 593 sequ. miasma
an polypi vteri causa 621
Venetiaram insalubritatis caus-
sae 120 sequ.
Ventriculi callositas 550. cor-
tractio 48, 551. debilitas
324. remedia aduersus eam
549.

- 549, 589. ruptura 583. tunica nervea 548. vulnerum lethalitas 48
- Verbascum** phlomoides 490. phoeniceum ib. hybrida 220
- Verbena** gigantea 11
- Verdana** aqua mineralis 528
- Vermes** in febribus 522. in ventriculo, remedium aduersus eos 549
- Veronica** bellidioides 476. fruticulosa ib. latifolia ib. montana ib. peregrina 477. pilosa 476. prostrata ib.
- Vertebrarum** dorsii aberrationes insolitae 697 sequ.
- Vesicae** urinae disquisitione ad vitam fetus determinandam 52. punctura 142. corpora peregrina in ea inuenta 173 seq.
- Vesicantium** effectus 146. vsus 127, 321, 329
- Vesicula** fellea 627. eius morbi 628 seq.
- Vespertilio** ferrum equinum 649. noueboracensis ib.
- Vibrio**, vid. Animalcula infusoria.
- Viburnum** lantana 493
- Vinum** quibus concedendum sit 131. remedium neruinum 324. eius acetum, vid. Acetum. spiritus vsus in aquarum mineralium examine 514
- Viola** pinnata 40
- Viperarum** vsus medicus 590 seqq.
- Vitae** fetus signa externa 50. interna 51. putridi 53
- Vitis** vinifera 23
- Vitrioli** origo 388. acidi cum magnesia combinatio, incen-
- sionis causa 547, 682. separatio ex acido salis communis 308. vsus in bilis vitis 329. in febribus putridis 322. in examine aquarum mineralium 511. acidum phlogisticatum 303. olei diuersitas 308. oleum glaciale 302. veneris solutionis vsus in aquarum mineralium examine 513
- Viueria** conepati 651. fasciata ib. malaccensis ib. mapurito ib. zenik 650
- Vlcera** inueterata erurum 472
- Vlua** stellata 42
- Voluox** vid. Animalcula infusoria. zoophytorum genus dubium 74
- Vomicae** ruptae et sanatae exemplum 327
- Vomitoria** in aegritudine vagarum neruorum 126. ante mercurii vsum 152
- Vomitum** ab angustia pylori, mercurio sublimato curatum 131
- Urinarum** viarum morbi 635 seqq.
- Vropoeorum** viscerum conditio praeternaturalis 472
- Vterus** bicornis 694 sequ. bifidus 695. duplex an vere existat 696. eius polypi vid. Polypi. substantia 622 sequ. vaginae singularis structura 694
- Vulcanorum** ortus 425
- Vulnerum** lethalitas 47, 48
- Vultur** barbatus 659. bengalensis ib. leucocephalus ib.

W.

Wacke, vid. Saxum.

Walter,

| | |
|---|---|
| Walter, Frid. Aug. annotationes academicae 621 | besserungen und Anmerkungen herausgegeben 678 |
| Webera nutans 77. pyriformis ib. | Willemet Indorum principis Tippoo Saib archiater factus 359 |
| Wegeler prof. med. Bonnae factus 705 | Withof, Ioh. Phil. Laur. mortuus 705 |
| Weisia heteromalla 79. recurvirostra ib. | |
| | X. |
| Westrumb, Ioh. Fr. kleine physikalisch - chemische Abhandlungen, I. Bandes, II. Heft 508. II. Bandes I. Heft 519. II. Heft 532. III. Bandes I. Heft 540. kleine physikalisch-chemische Abhandlungen, aus den chemischen Journalen gesammelt, und mit einigen Ver- | Xanthium spinosum 41 |
| | Z. |
| | Zachini stipendium annuum accepit 360 |
| | Zeolithi in acidis solutio vnde 217. terra 394 |
| | Zinci similitudo cum stanno 394. florum vires 325, 588 |

Contenta in hac parte.

| | |
|---|----------|
| I. Giornale per servire alla storia etc. to. III. | pag. 575 |
| II. KORTVM comment. de vitio scrophuloso to. I. | 607 |
| III. LENTIN <i>Beitraege zur ausübenden Arzneiw.</i> | 621 |
| IV. HERZ obseruat. de febrib. neruosis | 629 |
| V. THILENIVS <i>medizinische und chirurg. Bemerkungen</i> | 634 |
| VI. BATTISTI obseruat. de puerper. morbis | 645 |
| VII. EVEREL comment. in Stoll. aphor. to. III. | 647 |
| VIII. HOFMANN'S <i>vermischte Schriften Tb. I.</i> | 653 |
| IX. EBENDERSELBE <i>von den Pocken Tb. II.</i> | 659 |
| X. Instruzione intorno alle — tetanos | 672 |
| XI. CAMPER de structura patellae et olecrani | 681 |
| XII. VAN DOEVEREN obseruat. pathol. anat. | 685 |
| XIII. TURRA osservazione mediche | 688 |
| XIV. BALDINGERS <i>neues Magazin, B. X.</i> | 693 |
| XV. Catalogus librorum, qui 1789. prodierunt | 717 |
| XVI. Index in volumen XXXI. | |



